Intranasal mite allergen induces allergic asthma-like responses in NC/Nga mice

著者	Shibamori Masafumi
著者別名	柴森, 雅文
journal or publication title	博士学位論文要旨 論文内容の要旨および論文審査結果の要旨 / 金沢大学大学院医学研究科
volume	平成18年7月
page range	39-39
year	2006-07-01
URL	http://hdl.handle.net/2297/14718

学位授与番号	甲第 1751 号
学位授与年月日	平成 18 年 3 月 22 日
氏 名	柴森 雅文
学位論文題目	Intranasal mite allergen induces allergic asthma-like responses in NC/Nga mice (NC/Nga マウスを用いたダニ抗原点鼻投与による喘息様モデルの作製に関する研究)
論文審査委員	主 査 教 授 市村 宏 副 査 教 授 中尾 眞二 古川 侑

内容の要旨及び審査の結果の要旨

【背景および目的】喘息，アトピー性皮膚炎を始めとするアレルギー性疾患は増加傾向にあり，その予防対策は重要な課題である。なかでもハウスダスト・ダニアレルゲンはアレルギー発症に関わる重要な環境因子の一つであり，その発症機序の解明は予防医学的に重要である。一般的に実験的喘息モデルでは水酸化アルミニウム等のアジュバントと共に OVA(卵白アルブミン)を全身感作(IP or SC)し，その後 OVA を吸入あるいは気道内暴露することにより喘息病態が惹起される。しかしながら，OVA はヒトの吸入アレルゲンではなく，また，ヒトの場合多くは抗原の吸入で感作され，喘息病態が惹起されると考えられる。ところが，マウスではヒトのように抗原の吸入感作のみによる喘息モデルはほとんど報告されていない。NC/Nga マウスはコンベンショナル環境下でヒトのアトピー性皮膚炎様の症状を発症することが知られている。その機序の一つとして，ダニ抗原に反応しやすいことが推察されている。そこで，今回我々はヒトでの抗原感作，発症機序に類似した喘息様モデルの作製を目的として，NC/Nga マウスを用いてダニ抗原の点鼻投与のみによるアレルギー性喘息様モデルの作製を試みた。

【方法】NC/Nga マウスに *Dermatophagoides farinae* (コナヒョウヒダニ, Df), *Dermatophagoides pteronyssinus* (ヤケヒョウヒダニ, Dp) 粗抽出物あるいは OVA を麻酔下に 5 日間点鼻投与し(感作)，1 週間後さらに Df, Dp 粗抽出物あるいは OVA を 1 回点鼻投与(チャレンジ)した。チャレンジの 24 時間後，気道抵抗，肺胞洗浄液中の細胞数，サイトカイン，ケモカイン，肺の組織学的検討，血中 Total IgE，ダニ抗原特異的 IgG1 を測定した。さらに，NC/Nga マウスと C57BL/6, A/J, BALB/c, CBA/JN マウスとの喘息病態を比較した。

【結果】

1. 気道内に強い好酸球の浸潤と気道過敏性の亢進が認められた。しかし，これらの反応は OVA では起こらなかった。
2. 組織学的に気管支および血管周囲に強い好酸球の浸潤が認められ，喘息に特有の気管支上皮の杯細胞化が確認された。
3. 血中に Total IgE およびダニ抗原特異的な IgG1 の上昇が認められた。
4. NC/Nga マウスが最も強い気道内の好酸球浸潤，気道過敏性の亢進を示し，喘息病態の強さは NC/Nga > C57BL/6 > A/J > BALB/c > CBA/JN マウスであった。
5. NC/Nga, C57BL/6 マウスの肺胞洗浄液中には Th2 サイトカインである IL-5, IL-13 が検出されたが，Th1 サイトカインである IFN- γ は検出されなかった。
6. NC/Nga, C57BL/6, A/J マウスの肺胞洗浄液中に好酸球の遊走因子である Eotaxin-1 あるいは Eotaxin-2 が検出された。

【結語】NC/Nga マウスにダニ抗原を点鼻投与することにより，アレルギー性の喘息様症状が惹起されることが明らかになった。本モデルはヒトの喘息における吸入アレルゲンを用い，またヒトの抗原感作経路に類似した投与を行うことでマウスに喘息様症状が惹起でき，ヒトでのダニ抗原の吸入感作によって引き起こされる喘息の発症機序の解明に役立つものと考えられる。以上より，本論文は予防医学および環境アレルギー学に貢献する内容であり，学位論文に値すると考える。