Hypermethylation of the CDKN2A gene in colorectal cancer is associated with shorter survival

著者	Maeda Kazuya
著者別名	前田, 一也
journal or publication title	博士学位論文要旨 論文内容の要旨および論文審査結果の要旨 / 金沢大学大学院医学研究科
volume	平成16年7月
page range	17-17
year	2004-07-01
URL	http://hdl.handle.net/2297/15821

学位授与番号	甲第 1597 号
学位授与年月日	平成 15 年 6 月 30 日
氏 名	前 田 一 也
学位論文題目	Hypermethylation of the CDKN2A gene in colorectal cancer is associated with shorter survival (大腸癌における CDKN2A の hypermethylation は予後と相関する)
論文審査委員	主 査 教 授 三 輪 晃 一 副 査 教 授 磨 伊 正 義 教 授 源 利 成

内容の要旨及び審査の結果の要旨

癌患者の予後を判定することは、治療法の選択に不可欠である。近年、予後因子として癌遺伝子・癌抑制遺伝子の発現性などが報告されているが、未だ臨床応用には至っていない。細胞周期調節遺伝子である CDKN2A は多くの癌において発現が減弱している癌抑制遺伝子で、その mRNA や蛋白発現性と患者の予後との相関関係が報告されている。一方、CDKN2A の発現は Promoter hyper-methylation (PHM) により抑制されることが知られており、PHM の検出は CDKN2A 発現量の測定に代わり得る方法である。今回、大腸癌症例を対象として、CDKN2A の PHM と癌の臨床病理学的因子および患者予後との相関を解析した。

病理組織学的に原発性大腸癌と診断され、外科的根治手術を受けた 90 症例を対象とした。抽出された DNA を bisulfite 処理し、methylation specific real-time PCR 法にて methylation level を定量した。算出値の単位には PMR (percentage of methylated reference) を使用した。PMR 値と臨床病理学的因子、予後との関連を統計学的に解析した。

得られた成績は、以下のとおりである。

- 1) CDKN2A の PMR と腫瘍の分化度 ($p=0.018$)、および Dukes stage ($p=0.016$) との間に統計学的有意差を認めた。
- 2) PMR と患者予後の相関を解析すると、methylation level が高い症例で予後不良であった ($p=0.014$; 95%CI, 1.003~1.023)。また、Dukes C の患者においても methylation level は有意な予後因子であった ($p=0.004$; 95%CI, 1.006~1.028)。
- 3) PMR が 4 以上のものを PHM(+) と定義し、CDKN2A の PHM と患者の予後との相関では、PHM(+) の患者は PHM(-) の患者と比較して有意に予後不良であった ($p=0.022$)。Dukes C の患者においても、統計学的有意差はなかったが同様の結果であった ($p=0.057$)。

以上の成績より、CDKN2A のメチル化は、患者の予後と関係することが明らかとなった。

本研究は、大腸癌の予後が、分子生物学的検索で推測し得ることを示しており、がん治療の個別化に向けての方向性を示唆する価値ある研究と評価された。