Protective effect of ischemic preconditioning on hepatic ischemia-reperfusion injury in mice

著者	Tsuyama Hiroshi
著者別名	津山, 博
journal or publication title	博士学位論文要旨 論文内容の要旨および論文審査結果の要旨 / 金沢大学大学院医学研究科
volume	平成15年7月
page range	12-12
year	2003-07-01
URL	http://hdl.handle.net/2297/15759

学位授与番号	甲第1551号
学位授与年月日	平成14年12月31日
氏 名	津 山 博
学位論文題目	Protective Effect of Ischemic Preconditioning on Hepatic Ischemia-Reperfusion Injury in Mice (肝阻血再灌流障害に対する Ischemic Preconditioning による効果)
論文審査委員	主 査 教 授 渡 邊 剛 副 査 教 授 中 沼 安 二 教 授 向 田 直 史

内容の要旨及び審査の結果の要旨

肝移植は末期肝疾患に対する確立した治療手段となりつつあるが、肝グラフトの阻血再灌流障害は、移植後の生着に関わる重要な問題の一つである。最近、短時間の阻血と再灌流によって、その後の長時間の阻血および再灌流障害に対する耐性を誘導することがいくつかの臓器や組織で報告され、注目されている。この一見逆説的な、短時間の阻血再灌流による保護作用は Ischemic Preconditioning (IP)といわれている。本稿では肝阻血再灌流障害に対する IP の保護効果について、その障害過程におけるサイトカインに注目して検討した。肝十二指腸間膜一括遮断によるマウス肝阻血再灌流モデル(脾皮下移植後の 70 分全肝阻血)で検討した。

得られた結果は以下のように要約される。

1) 生存率

IP の時間設定により対照群、10 分阻血-20 分再灌流群 (IP-10)、15 分阻血-20 分再灌流群 (IP-15)、20 分阻血-20 分再灌流群 (IP-20) の 4 群を設定して (各群 $n = 12$)。肝阻血再灌流後の生存を一週間観察したところ IP-10 群、IP-15 群の生存率が対照群より有意に良好であった。そこで最も生存率が良好であった IP-15 群を対照群と比較した。

2) 血清 ALT

IP-15 群の再灌流 1 および 2 時間後の値は対照群に比べ有意に低値を示した。

3) 血清中腫瘍壊死因子 (tumor necrosis factor, TNF)、インターロイキン 6 (interleukin-6, IL-6)

TNF の IP-15 群の再灌流 1 時間後の値は対照群に比べて有意に低値であった。IL-6 においては IP-15 群では再灌流 2 時間後および 5 時間後の上昇は有意に抑制された。

4) 肝壊死範囲の病理組織学的検討

再灌流 1, 5 および 48 時間後の肝組織検体からパラフィン切片を作成し、肝壊死範囲を観察した。再灌流 48 時間後には IP-15 群では対照群に比して壊死範囲が有意に軽度であった。

これらの結果より IP は肝阻血再灌流障害に対する有効な予防手段となることが示された。本研究は、肝阻血再灌流障害を抑制し肝移植時のグラフト生着率の向上に寄与する価値のある研究であると評価された。