實驗雜俎

◎淋疾ノ療法ニ就テ

會員　松山五七郎

淋疾ノ注入藥ニ就テハ是迄稱用シ來リシ者一ニノ足ラスト雖モ之レヲ要スルニ收斂及防腐ノ二藥ニ他ナラス余ハ近來頑固ノ六症ニ沃度仿謨ヲ應用シテ好成績ヲ得タレハ今其概略ヲ報告スヘシ

沃度仿謨ヲ淋疾ニ應用セシハLazansky氏(Archv. f. Derm. u. Syph. 1875. No 2-3 — Prager aerztl. Correspondenzll. No. 27)ヲ初メトシMandelel及ヒDittel.ノ諸氏ナリト雖モ其法ハ多ク「カヽオ」酪等ニ混シテ坐藥トノ用エタリ然レモ此法ハ單ニ調劑上ニ困難ナルノミナラス使用スルニ巧拙アルヲ以テ毎常充分ナル効果ヲ收ムルヿ能ハス故ニ余ハ3乃至5%ノ沃度仿謨虞里斯淋液ヲ造リ尿道ニ注射セリ

其法ハ右「グリスリン」混合液ヲ通常ノ注入器ヲ以テ排尿後ニ尿道內ニ注入シ暫時間(五—十分)尿道外口ヲ指間ニ閉塞スルヿハ沃度仿謨ハ自個ノ重量ニ由リテ沈澱シ指ヲ離スヿハ「グリスリン」ノミヲ漏シ沃仿粉抹ハ尿道內ニ殘留シテ局處ニ永ク其作用ヲ及ホスヘシ

余カ之レヲ使用セシ患者ハ僅ニ六名ノ少數ニ止リシト雖モ中ニハ硫亞、硝酸銀等ノ諸藥ヲ用エテ寸効ヲ見サリシ者モアリキ而ノ此沃度仿謨注入ヲ行ヒテ悉ク好成績ヲ得タリ

治癒日數ハ固ヨリ玆ニ明言スルヿ能ハサレモ大凡七乃至九日間ニノ治スルヲ常トス、注入ノ度數ハ病ノ輕重ニ從テ差異アルヘケレモ二—三回ヲ以テ可トス其他內用トノ稀鹽酸里沒奈垤、水曹ヲ與フルカ如キ患者ニ安靜ノ位置ヲ取ラシムルカ如キハ無論從來ノ法ト異ナルヿナシ

余カ六名ノ經驗決シテ多シト云フヘカラス故ニ之レヲ以テ其判斷ヲ降カ如キハ大早計モ又甚シト雖モ余ハ余ノ頑固ナル患者ニ之レヲ應用シテ好成績ヲ得タレハ爾

後尚ホ此研究ニ怠ラサルヘシ諸君若シ時アラハ此藥液ヲ試ミテ其成績ヲ報スルノ榮ヲ賜ラハ獨リ余ノミノ幸ニ非ラサルナリ