

ラザルキハ遂ニ稍々高度ノ關節彎屈及攣縮ヲモ治ニ就カシムルヲ得可シ而シテ之ニ施ス按摩術ハ癩痕組織部ノ按撫法及拍打法ニシテ此法ハ通常屢々反覆施行セサルベカラズ殊ニ癩痕ノ皮下ニ近接スル者ニ在テハ強劇ナル按摩法及揉捏法ヲ稱用ス而シテ是等ノ施術ノ間ニハ亦強劇ナル他働運動及亢抗運動ヲ行フヲ必要トス

以上述ハタル所ノ按摩術ノ外科的疾患ニ於ケル應用ハ實ニ只其一班ニ過キザルノミ此他神經系統血管系統、消化器系統等ニ於ケル外科的疾患ニ對スル本術ノ應用ヲ舉グルキハ尙ホ頗ル廣且大ナル者アリ殊ニ軌近耳科、皮膚諸病等亦至ルマテ按摩術ヲ應用スルヲ益々多ク從テ之ガ適應症施術法等ヲ茲ニ説述センコトハ蓋シ亦企要ノ業ニ非サル可シト雖モ所説ノ濫リニ冗長ニ亘ルヲ慮カルヲ以テ一ト先ツ爰ニ擱手スルコトハナシヌ又讀者諸君之ヲ諒セヨ

(完結)

●子宮外(腹腔)妊娠ノ一例

贊助會員 關屋林之助 述

特別會員 小川 勝 陳 閱

閱者云斯稿故アリテ上梓甚タ遅ル多クハ予カ罪ナリ又云載籍ヲ涉獵シテ類例ヲ較シ細大ヲ詳

悉シテ講演ノ脱漏ヲ補綴セムト期シタルニ楮公容ルサス己ムナク鼈頭ヲ斷チ跋尾ヲ殺ク麗カニ事實ヲ述フルニ止ム述者及ヒ讀着之ヲ諒トセヨ

竹内ツユ 石川縣石川郡安原村ノ農昨卅二年四月十三日與シテ金澤病院ニ來ル、當時廿九年二月月既往證 稟賦強健麻疹及ヒ種痘三回ノ外大患ヲ知ラス、父六十才母五十六才一兄一妹皆健存ス。病婦二十歳ノ十二月當時二十五才ノ從兄ト婚シ二十四歳初テ一男ヲ舉ケ二十六才又一男ヲ舉ケ共ニ健存ス。第一兒妊娠ノ初月食思不振惡阻症月餘ニ亘ル而カモ爾後他異ナク、分娩輕易產褥平滑自ラ哺乳スルコト又三年。病婦月信甚遅ク二一〇〇〇〇〇〇冬初テ通ス、爾來整然序ヲ乱サス三乃至四日血量中等困難ヲ覺エス、最終月經昨年(三十一年)九月七日ヨリ三日間、常ノ如シ。其十二月三日午後十時勞働(米ヲ粉ニス)後就褥セムトシタルニ突然劇シキ腹痛ヲ發ス直ニ賣藥(熊膽ト虫藥)ヲ服用セシモ効ナク、翌日醫ヲ招キ皮下注射ニヨリテ稍輕快シタリト云、爾後一日數回腹痛ヲ來シ食欲減シ安眠難ク大便結シ漸々衰弱ノ感アリキ當時腹部過敏手ヲ觸ル容ラス、本年(三十二年)一月初旬ヨリ二十日間輕快、下旬ニ至リ腹痛復々甚シク一日三四回發作シ晝夜夜具ニ倚レリ、三月頃ヨリ疼痛發作時ニ於テ腹壁ヨリ小隆起物ヲ觸レ得(胎動!)胸部ニ放散痛ヲ覺エ、本月ニ至リ毎日腹痛ヲ來シ堪エ難シ依テ診ヲ乞フ云々

現證 患婦介者ニ輔ケラレ辛フシテ診察臺ニ上ル、体格中等榮養不給、貧血高度筋肉發育中等ナ

レヒ皮下脂肪甚少シ、顔貌苦痛ヲ表シ言語叱咤スルニ似タリ脉細數、一百至、体温三十七度
 腹部大サ凡ソ妊娠第九月ニ相應シ過敏ニシテ容易ク手ヲ觸レ難シト雖ヒ腹壁非薄ニシテ少ク弛緩
 シ左右ニ擴張セラレ時々大小ノ膨隆ヲ認ム(所謂胎動)叫喚マ、傍人ヲ驚カス辛フシテ兒頭ヲ左中
 腹部ニ觸レ小部分ヲ右中腹部ニ觸ル乃チ知ル胎兒ハ恰モ第一橫位ヲ占ムルヲ、心音ハ臍下一橫指
 左側ノ乳腺ト副胸骨線トノ間ニ最モ明ニ一分時一百四十乃至一百五十ヲ算ス臀部ニ接シテ右下腹
 部ニ半軟彈力性手掌大ノ腫物様ヲ觸ル一分時九十乃至一百許ノ血管音ヲ聽取ス(胎盤!)
 胸部 乳房發育色澤等ハ甚タ著シカラスト雖ヒ妊娠ノ徵候ハ疑ヲ容レズ

内診 外陰及ヒ膺ノ状態ハ妊娠時ニ相應シ特異ナシ唯子宮膺部短縮著シカラス双合診スルモ明カ
 ニ基底ヲ劃スル能ハス、胎兒体部亦少シク高位ニ在ルモノ、如シ、骨盤異常ヲ認メス(計測數逸ス)
 經過 四〇〇〇日即日入院後主トシテ安靜ヲ命シ強壯劑ヲ處シ兩便ヲ通利セシメタルニ漸々疼痛
 發作ヲ減シ食欲稍進ミ夜々安眠シ白ラ臥位ヲ轉換シ得ルニ至リ一週日ニシテ始テ徐步ヲ試ム体温
 三十六度三分ヨリ三十七度二分ノ間ヲ昇降シ脉搏九十至内外ヲ算ズ、是ニ於テ胎兒ノ橫位ヲ縱位
 ニ廻轉セント欲シ徐ニ之ヲ試ムルヲ數回術後目的ヲ達セリト認メ腹帶ヲ處シテ可及的動搖ヲ避ケ
 シメタルニ翌日ニ至リ依然復舊スルヲ數次而レヒ全身ノ状態益々佳良トナリ既ニ退院ヲ乞フニ至
 リタレヒ家人ニ諭シテ妊娠ノ常ニ非ルヲ告グ以テ家ニ還ルヲナカラシム家人ヨク其旨ヲ諒ス

五月十四日 午前二時半頃左季肋部及ヒ心窩部ニ疼痛ヲ覺ヘ漸次増劇シ遂ニ腹部一般ニ彌ル顔貌不安苦惱ノ狀ヲ呈シ視線一處ニ凝リ全身冷汗ヲ流ス間々切齒ヲ雜ユ五時頃ニ至リ疼痛益甚ク九時頃ニ至リ恰モ陣痛様ノ發作ヲナセリ(發作持續二十秒乃至二十秒間歇七分乃至十分)其間少量ノ白帶下様液ヲ漏セリ(所謂 Falsche Geburt) 此ノ時体温三十七度一分脈九十四胎兒ノ心音百二十乃至百五十。内診スルニ臍部ハ全ク消失セザレモ著シク短縮シ陣痛發作コトニ子宮外口ノ漸次開大スルヲ認ム。十一時半頃ヨリ諸症輕快疼痛ノ間歇一時間以上ニ及ヒタリシガ午後四時ヨリ七時ノ間ニ於テ劇痛再ヒ起リ夜九時半頃放尿二百立方仙迷ヲ獲、十二時ニ至リ尙ホ一百二十立方仙迷ヲ獲テ後安靜ニ就眠スルヲ得タリ

該尿ハ透明淡黃色ニシテ弱酸性ヲ呈シ蛋白及ヒ糖分ヲ認メズ

五月十五日ヨリ十九日ニ彌リテ前記ノ症狀時々反覆スルヲ以テ鎮痛及催眠劑ヲ投スルヲ亦數回ス此間熱發ナク兩便常ノ如シ只食氣減損シ全身疲勞ヲ覺ユルノミ

五月廿日 是ヨリ先キ胎兒ノ迴轉ヲ試ムルヲ數次毎ニ疼痛ノ爲ニ沮マル此日始テ縱位(頭位)ニ轉シ得タルニ翌朝ニ至リマタ原位ニ復セリ。

廿一日 上下肢末梢部ニ於テ始メテ輕度ノ浮腫ヲ認ム、尿濃黃色酸性ニシテ蛋白ヲ認メズ。

五月廿三日 突然惡寒戰慄ヲ前驅シ体温昇騰ス午前九時三十九度八分、十二時四十分五分ニ達ス

脈數一百二十乃至三十顏貌蒼白悲哀苦悶ノ狀ヲ呈シ腹部劇痛ヲ訴フ。此日大便三回尿量六百立方
仙迷比重千〇十、弱酸性。解熱劑ヲ用井ズ

廿四日 午前六時体温三十七度ニ下降シタルモ漸次昇騰シテ午后三時ニ至リテ四十度四分ニ達ス
胎兒ノ心音稍微弱ノ感アリ。此日大便亦三回尿量千二百十立方仙迷比重千〇十、酸性。此日鹽規
ヲ投ス

廿五日 午前六時体温三十五度二分十一時半頃ヨリ惡寒ス(但シ熱發ナシ)劇痛數回殊ニ左右季肋
部ニ著シ腹部ヲ按ズルニ胎位殆ント第一斜位トナレリ兒頭ハ左上方季肋下部ニ竄入シ不明トナリ
臀部ハ臍部及ヒ臍下部ニ位ス而シテ腹部一般ニ膨大稍弛緩ノ感アリキ(コレ卵膜破裂ノ故ナラム)
此日熱ナク胎動ヲ自覺セス大便一回尿千百立仙、比重千十、中性

廿六日 午前六時体温四十度二分惡寒ヲ伴ハズ脈一百十八呼吸四十二季肋部ニ疼痛アリ渴甚シ。
此日大便一回尿千四百立仙比重千七強亞爾加里

廿七日 体温稍下降午前六時三十七度六分ナリシガ午後三時ニ至リ三十九度二分ニ達シ脈百十二
至呼吸四十二。此日頓挫ノ目的ヲ以テ試ニ復タ鹽規ヲ投ス夜十二時ニ至リ三十七度五分ニ降り漸
々下降シテ爾後全ク熱候ヲ見ズ。尿量増加シテ二千トナリ比重ハ減少シテ千〇〇五トナル強アル
カリノ反應ヲ呈ス

廿八日 体温三十五度乃至三十六度ノ間ヲ昇降シ自覺症候大ニ輕快セリト雖モ脈尙疾數九十至ヲ算シ呼吸三十八ヲ數フ。前日ヨリ大便未通尿量減シテ六百トナリ比重増加シテ千〇十七トナル反應中性

廿九日 一般狀態昨日ト大差ナキモ顔貌愈蒼白眼窩陷沒心尖部及ヒ鎖骨上窩ニ貧血性雜音ヲ聽キ下脚ニ輕度ノ浮腫ヲ認ム。腹部三四日前ニ比シ膨滿ノ度ヲ減シ稍弛緩ス。胎兒臀部ハ臍部ニ於テ右副胸骨線ト右乳線トノ間ニ位シ体部ハ斜ニ正中線ヨリ上方ニ左前腋窩線ニ向ヒ左季肋部ニ移行シテ頭部ヲ按スル能ハス心音ハ臍上五指橫徑左副胸骨線ト左乳線トノ間ニ一分間一百三十二至ヲ算ス甚微弱ナリ胎動ハ午前九時頃ニ回午後五時頃三四回。大便一回軟、尿量七百比重千十、中性、蛋白糖分共ニ認メス。外陰部一汎ニ浮腫狀ヲ呈シ膾及子宮膾部ノ溫度少シク下降ス膾部ハ以前ニ比シ短ク宮口ハ稍開大ス。体温最低卅四度八分呼吸廿四、脈搏八十至

三十日 能ク安眠ス

三十一日 顔貌稍怡色アリ精神少ク活潑トナレリ午後十二時ハ胎動一回甚微コレヲ最終トス時ニ心音百廿〇至ヲ數ヘ得タリ

六月一日 晝夜熟睡嗜眠ノ狀アリ

二日 亦多クハ熟睡ス胎兒心音益々幽微トナリ臛ヨリ帶下様ノ排泄アリ

三日 心音全ク聴取シ得ス。右下腹部ノ腫物(胎盤)ヲ壓スレハ内陰ニ相應スル痛感アリトイフ
四日 前數日便通一二回尿量七〇九〇。本日増加ノ千三百ニ達ス他異ナシ

五日 特異ナシ

六日 午前六時半軽度ノ陣痛アリ長經十二仙迷口徑一、二仙迷ノ膜管ヲ排出セリ、所謂脱落膜ナリ
形狀子宮腔ニ應シ明カニ子宮口ト喇叭管口トニ相應スル處ヲ見ルヲ得ベシ左圖ハ其眞ヲ摸スルモ
ノ通常會員岡島敬治氏ノ寫ス所ニ係ル、此日食欲漸ク進ミ下腿ノ浮腫稍退ク、胎兒ノ体部益々不
明トナル

七日 心窩部ニ疼痛ヲ訴フルノ外特異ナシ

八日、九日 少許ノ惡露様物ヲ排泄セルノ後尙下腹緊滿ノ感アリ体温最高午前ニ於テ三十八度五分ヲ示ス

十日、十一日 平温無事、心身共ニ宜シ

十二日 短時間ノ全身浴ヲ行フ浴後体温ヲ檢スルニ三十七度五分ヲ示ス浴前ヨリ昇ルコト九分

十三日 又全身浴ヲ施ス異狀ナシ

十四日 三タヒ全身浴ヲ行ハシム顔兒益良氣力亦加ル時々笑容アリ腹部ニハ只異物ノ感アルヲ覺
ツト言フ、胸部ニハ心ニ貧血性雜音ヲ聽クノ外異常ヲ認メス、腹壁ハ僅カニ靜脈ヲ透見シ得ベク胸

Beim Examen :

Professor der Anatomie : „ Ja, wenn Sie die Eingeweide nicht im Kopfe haben, koennen Sie kein Examen bestehen.

Der erste Patient.

Herr (im Wartezimmer, ungeduldig) : „Wann kommt denn endlich der Herr Doctor ? Jch warte ja schon beinahe eine halbe Stunde!“

Diener : „Na, was ist das ?! auf Sie haben wir mindestens vier Monate gewartet!“

Eine neue Krankheit ist leichter entdeckt als ein neues Heilmittel.

板ヨリ稍高ク大鼓ノ狀アリ、測診スルニ臍部周圍八十二仙迷臍ト耻骨縫際上縁トノ距離十七仙迷臍ト劍狀突起トノ距離十五仙迷半ナリ内診スルニ腔内温度低ク腔部軟ニシ浮腫様ヲ呈シ移動充分ナラス外口一指ヲ通シ得ヘシ

(以下次號)



脱落膜自然大ノ摸圖

