

A List of the Plants Distributed in Mt. Hakusan (2)

メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2017-10-05 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: メールアドレス: 所属:
URL	http://hdl.handle.net/2297/29586

白山の植物目録(二)

橋本光政*・里見信生**

Mitsumasa HASHIMOTO* & Nobuo SATOMI**

A List of the Plants Distributed in Mt. Hakusan (2)

Spermatophyta 種子植物***Gymnospermae*** 裸子植物

Taxaceae イチイ科

Taxus cuspidata SIEB. et ZUCC. var. *nana* REHDER キャラボク [尾] シナノキ小屋
 ~ゴマ平 G.M., K [白峰] 別当出合~甚之助ヒュッテ V.3, M.H. 2148 [白川] 御
 母衣 A. NITTA 12179 Kyo [白鳥] 石徹白村 石徹白岩右エ門 Jun. 1933, Kyo [大]
 三の峰~銚子ヶ峰 V.3, M.H. 5974 主に亜高山帯の尾根に点在するが、三方崩山では一部
 群生状となっている。

Torreya nucifera (LINN.) SIEB. et ZUCC. var. *radicans* NAKAI チャボガヤ [吉] 親
 谷の湯 V.2, M.H. 5398 [白峰] 市瀬 G.M., K [白川] 平瀬 V.1, M.H. C-1

Cephalotaxaceae イヌガヤ科

Cephalotaxus harringtonia (KNIGHT) K. KOCH var. *nana* (NAKAI) REHDER ハイイヌガ
 ヤ [白峰] 別当出合~甚之助ヒュッテ V.2, M.H. 2147 [白川] 平瀬 V.1, M.H.
 C-2; 平瀬~三方崩山 M.H. C-371 [高] 大日岳 Y. MORI, K

Pinaceae マツ科

Abies homolepis SIEB. et ZUCC. ウラジロモミ [荘] 荘川村 Z.T. Jun. 14, 1928 Kyo
 奥山春季氏 [Journ. Jap. Bot. 36-5, p.192 (1961)] は白山の存在を記している。又、林弥栄氏
 は白峰村に産するとしているが〔日本産重要樹種の天然分布, p. 62 (1951)] 筆者等は実見してい
 ないので今後注意してみたい。

A. mariesii MASTERS アオモリトドマツ, オオシラビン 白山 G.K. Jul. 10, 1921 Kyo
 [白峰] 釈迦新道 V.3 M.H. 3961 [白川] 三方崩山 V.3 M.H. C-691 日本海側
 では針葉樹林の発達が貧弱であると言われている。白山でも同様であり、雪の影響などで良好な
 生育状態とは言えないが、広範囲に分布している。

* 兵庫県立姫路城北高等学校 Jōhoku Senior High-school, Himeje, Hyōgo Prefecture

** 金沢大学理学部生物学教室 Department of Biology, Faculty of Science, Kanazawa University

Picea jezoensis (SIEB. et ZUCC.) CARR. var. *hondoensis* (MAYR) REHDER トウヒ, トラノオモミ [荘] 海上谷国有林 Z.T. Jul. 5, 1928 Kyo; 野々俣~新淵~三谷 V.1, M.H. c-778 後者は山道に沿って二本みられたが植栽されたものかも知れない。然し林弥栄氏は白峰村と尾口村で実視したと著書〔前出, p.69 (1952)〕に記している。

Pinus densiflora SIEB. et ZUCC. アカマツ [白峰] 砂防新道 V.2 M.H. 2146

P. parviflora SIEB. et ZUCC. var. *pentaphylla* (MAYR) HENRY キタゴヨウマツ [吉] 蛇谷, 親谷の湯 V.2, M.H. 5377; 中宮温泉~シナノキ小屋 G.M. K [白川] 三方崩山 M.H. c-690 急勾配の山腹や痩せ尾根に多いが, 平坦な山腹では直径1メートル以上の大木も見られる。

P. pumila (PALLAS) REGEL ハイマツ 白山 T. MAKINO 1935年 11917 Kyo [白峰] 南竜ヶ馬場~天池 V.4 M.H. 2713; 大汝峰 G.M. K [白川] 三方崩山 V.3 M.H. c-941

Tsuga diversifolia (MAXIM.) MASTERS コメツガ 白山 Z.T. Jul. 18, 1929 Kyo; T. SHIMIZU 4555 Kyo [尾] コエト小屋付近 V.3 M.H. 4377 [白川] 三方岩岳 G.M. K

Taxodiaceae スギ科

Cryptomeria japonica (LINN. fil.) D. DON スギ [白峰] ミツ谷~杉峠 V.2 M.H. 5263 [大] 刈込池 V.2 M.H. 3439

Cupressaceae ヒノキ科

Chamaecyparis obtusa (SIEB. et ZUCC.) SIEB. et ZUCC. ap. ENDL. ヒノキ [白峰] 三ツ谷~杉峠 V.2 M.H. 5262 [白川] 三方崩山 M.H. c-687; 大白川 G.M. K

Juniperus communis LINN. var. *hondoensis* SATAKE ホンドミヤマネズ [尾] 岩間~清浄ヶ原 V.3 M.H. 6580 [白峰] 白山 Ca. Gozen G.M. 8738, K; 別山道 G.M. 11814, K; 室堂 G.M. 13781, K [大] ニノ峰 石徹白岩右エ門 Oct. 11, 1933 Kyo; 三ノ峰 Z.T. Jul. 5, 1933 Kyo

J. rigida SIEB. et ZUCC. ネズ, ネズミサシ, ムロノキ [吉] 蛇谷 800~1300m Alt. V.2 M.H. 6474 V字狭谷の痩せ尾根にわずかに存在する。

Thuja standishii (GORDON) CARR. ネズコ, クロベ 白山 Z.T. Jul. 18, 1929 Kyo [吉] 親谷の湯~国見山 V.2 M.H. 5442 [尾] コエト小屋 V.3 M.H. 4378 [白川] 福島谷 V.1 M.H. c-561; 大白川 G.M. K [高] 大日岳 Y. HORI Jul. 2, 1933 Kyo; 石徹白岩右エ門 Oct. 4, 1933 Kyo

Thujopsis dolabrata (LINN. fil.) SIEB. et ZUCC. アスナロ [白峰] 白峰 V.1 M.H. 1797

追 記

次の種類は白山に産することが報ぜられているが、筆者等は未だ標本を見ることが出来ないの
で、今後の調査において確認したいと思っている。

Pinaceae マ ツ 科

Abies veitchii LINDLEY シラベ 奥山春季氏〔前出〕、林弥栄氏〔前出, p.84 (1951)〕の報
告にみられる。国立科学博物館には越前三の峰(堀芳孝; Aug. 2, 1953; No.103)の標本がある
が、アオモリトドマツのようにも思われるので再検討したい。

Larix leptolepis (SIEB. et ZUCC.) GORDON カラマツ 奥山春季氏〔前出〕は白山に存在と
ある。また、林弥栄氏〔前出, p.95 (1951)〕は著者実視と書かれている。岐阜県側には植栽され
ているものがあるが、筆者等は未だ天然状態のものをみることが出来ない。

Tsuga sieboldii CARR. ツガ 林弥栄氏〔前出, p.128 (1951)〕は白峰で実視したという。

Cupressaceae ヒ ノ キ 科

Chamaecyparis pisifera (SIEB. et ZUCC.) SIEB. et ZUCC. ap. ENDLICHER サワラ 林弥栄
氏〔前出, p.220 (1951)〕は白峰で実現したという。