

テ洗ヒ(六)「ヘマトキシリン」着色ニ分間(七)酸性「アルコール」ニテ脱色シ(八)水ニテ洗ヒ(九)「エオジン」重染二十秒(十)九十五「プロ」アルコール「次ニ無水」アルコール「次ニ丁子油次ニ「バルサム」ニテ封鎖ス

右ノ順序ヲ以テスレハ僅ニ十五分間ニシテ新組織ヨリ標本ヲ仕上ケ得ヘシ而シテ其小不利トスルハ血液ヲ保存スル能ハス若シ豫メ「フォルマリン」ニテ硬化スレハ此不利ヲ除キ得ヘシ其法

(一)「十」プロノ「フォルマリン」ニ時間(二)水凍截切(三)五十「プロ」アルコール「三分間(四)無水」アルコール「一分間(五)水洗(六)ヘマトキシリン」ニ分間(七)酸性「アルコール」洗(八)「エオジン」(九)九十五「プロ」アルコール「次ニ丁子油或ハ「クレオソウト」「バルサム」則ニ時乃至ニ時半ヲ要ス

本日ハ標本ヲ陳列シ且諸君ノ目前ニ於テ此速成法ヲ實驗スル考ナリシカ故アリテ果サ、リシハ余ノ大ニ遺憾トスル所ナリ

●神戸ニ於ケルベスト患者ニ就イテ (第十三回講話會口演)

森 島 彦 夫 述

今日私ハ此問題ニ就イテ御話申上ケマスルハ先達テ警察署ノ用向ヲ帶ヒテ神戸ニ出張シ聊カベス

ト病ニ就イテハ實驗スルノ機會ヲ得タリト雖ヒ該地ニ達セシ頃ハ己ニ悉ク死亡シ只々一人ノ疑似患者ヲ診斷シタル而已

今回ノ神戸地方ニペスト病ノ輸入セシハ何レヨリ來リシヤハ確實ナラサレヒ孟買地方ヨリ來リタル者ノ如シ即チ初發ノ患者ハ孟買ヨリ香港ヲ經テ神戸ニ入港セシ鹿兒島丸ニ荷積タル古綿襪等ヲ取扱フタル者ニシテ之レヨリ蔓延シテ九名ノ患者ヲ出スニ至レリ其中三名ハ疑似症トシテ取扱ヒ六名ハ眞ノペスト病ナリ疑似症中二名ハ尤モ最初ニ發セシモノニシテ不明ニ屬スト雖ヒ其傳搬ノ摸樣ヲ考フルニ多クハ此者ノ系路ニ歸因ス恐クハ眞性ノペスト病ナラン他ノ一名ハ眞ノ疑似症ニシテ臨床上症候ハ殆ント類似スト雖ヒ病原ヲ發見セサル者ニシテ傳染病院ニ送ラレ治療中ナリシ眞性ノペスト病六名中三名ハ死后ノ發見ニシテ三名ハ傳染病院ニテ治療セシ者ナリ今此二名ノ病床日誌ヲ寫シ取りタルヲ以テ專ラ諸君ニ示サントス其前ニ當リテ聊カ本病ノ原因並ニ症狀ニ就キ一言セント欲ス

ペスト病 Bubonepest ハ往古歐洲及亞細亞ニ流行セシ傳染病ナリ凡テ傳染病ト云ヘハ殆ント此病而已ヲ稱スル位ニシテ數多ノ死亡數ヲ出セリ他ノ傳染病ニ比シテ非常ニ猖獗ヲ極メシ然ルニ歐洲ニテハ一般ノ公衆衛生進歩スルニ從テ絶テ此病ヲ見サルニ至ル然レヒ歐洲ノ學者特ニ「ヒルシュ」氏ノ如キハ尙ホ亞細亞ニハ存スルナノ考ヲ抱ケリ果シテ支那ノ南方ニ潜伏シ交通スルニ從ヒ

廣東ニ來リ明治二十七年香港ニ達シ多クノ支那人及二三ノ歐州人ヲ犯セリ其后孟買ニ入りテ殆ソトベストノ巢窟ト成レリ日本ニテハ今回ノ神戸輸入セシテ初メトスレモ新領土臺灣ニハ明治二十九年大ニ流行ヲ來セリ

本病ノ病原ハ所謂ベスト菌ニ由テ起ル該菌ハ千八百九十四年(明治二十七年)佛國ノ醫「イエルザン」氏香港ニ於テ一種ノ細菌ヲ發見シテ之レヲ「ベスト」病ノ病原トセリ然ルニ同時ニ北里博士モ一種ノ細菌ヲ發見シテ本病ノ病原トセリ而シテ一般ノ關係ニ於テ全ク「イエルザン」氏菌ト異ナル所ノ細菌ナリ如此異種ノ細菌ヲ同一疾病ニ罹ル患者ヨリ發見シタルニ依リ何レガ眞性ノ「ベスト」病ヲ起ス者ナルヤ否ヤハ大ニ學者間ノ爭ヒト成リ久シク決定スル丁克ハサリシカ今度ノ神戸地方ニ發生シタル患者ニ由リ中濱緒方北里ノ博士研究ノ末本病ノ病原ハ「イエルザン」氏菌ニ歸スルヲ殆ソト確定スルニ至レリ實ニ神戸ニ惡疫ノ輸入セシハ不幸ノ極ナリト雖モ又以テ諸家研究ノ結果其病原ヲ確定スルニ至リシハ大ニ我醫學上進歩ヲ與ヘタル者ト云ハサル可ラス

「イエルザン」氏菌ハ兩端鈍圓ナル短杆狀菌ニシテ鹽基性「アニン」色素液ニテ着色スレハ兩端ハ中央ニ於ケルヨリモ著シク染色ス「グラーム」氏方法ニテハ脫色ス北里氏菌ハ其狀態稍々小ニシテ包囊ヲ有シ「グラーム」氏方法ニテ染色スルヲ以テ異ナリトス

「イエルザン」氏菌ハ主トシテ腫脹セル淋巴腺中ニ存スト雖モ時トシテハ血中ニ存シ甚タ重症ニシ

テ速ニ死セル者ハ血中ニモ多ク存ス「Winn」氏ニ由レハ殆ント常ニ尿中ニモ存スト云フ

「ペスト」菌ハ如何ナル系路ヨリ感染スルヤト云フニ主トシテ皮傷ヨリ入りテ一定ノ場所ニ寄生ス屢々見得ヘカラサル創傷ヨリ進入スルコアリ尙ホ膿胞「フロンケル」其他種々ノ潰瘍面ヨリ進入シタルノ報告アリ如此主トシテ創面ヨリ感染スルモ又呼吸器ヨリ入りテ肺炎ヲ起シ咯痰中細菌ヲ認ムルコ希ナラスト雖モ「Winn」氏ハ腸ヨリ感染スト云ヒ而シテ吐物並ニ糞便中ニ甚タ屢「ペスト」菌ヲ發見セリト云フ

「ペスト」病ハ非常ニ豫防撲滅シ難ク容易ニ去ラサル者ナルコトハ常ニ念慮ニ置カサルヘカラス又一タヒ發生スレハ何故ニ消毒撲滅上困難ナルハ種々ノ原因アリ

(第一)病原ハ多クハ荷物ニ附着シテ新地ニ輸入スルニ在リ傳染病研究所部長志賀氏ノ談話ヲ聞クニ本年六月「ポルチガール」國「オポルト」ニ流行セリト其地ニ病毒ノ輸入セシニ二説アリ一説ハ孟買ヨリ米ヲ荷積シ來リタル漁船ヨリ輸入セリト即チ病毒ヲ持チシ者ナリト一説ハ「アレキサンドル」地方ヨリ輸入セリト兎ニ角初發ノ患者ハ六月四日船ニ關係アル勞働者西班牙人五人ヲ犯セリ次テ數多ノ人間ニ傳搬スルニ至レリ若シ船員該地方ニテ感染シテ然シテ后「オポルト」ニ來リ傳搬ノ媒介ヲ成シタル者トスルカ適當セサルコトアリ何トナレハ「ペスト」病ノ發生ハ十日以上ノ潜伏期ヲ有セス然ルニ十日以上ヲ經サレハ到着スル能ハサル地方ニ來リテ發病スルノ理ナシ之レヲ以テ考

フレハ其傳搬ハ人体ニ在ラスシテ輸入セル品物ニ病毒ノ附着セシニ相違ナシ今回ノ神戸地方ニ發
生セシモ之レト一致シテ矢張り輸入物品ニ病毒ノ附着セシニ相違ナシト云ヘリ

以上ノ如ク物品ニ附着シテ病毒ノ輸入セル上ハ夫ヨリ何レノ道ヘ進入スルヤ不明ナリ之レ豫防撲
滅上困難トスル原因ナリ

〔第二〕ハ一タヒ或ル地方ニ輸入スレハ獨リ人間ヲ犯スノミナラス鼠ハ非常ニ懼リ易ク或ル學者ハ
鼠疫 *Rattenseuche* ト稱スル如ク元來鼠ヨリ感染スト云ヘリ若シ鼠ニ發生スレハ交通遮斷等ノ方法
ヲ行フコトハス之レ又豫防撲滅上困難ナル原因ナリ

〔第三〕「ベスト」菌ノ發育繁殖スルニハ一定ノ温度ト營養及濕氣ヲ有セサルヘカラス元來細菌ハ生
物ニ寄生スル時機ト死物ニ寄生スル時機アリテ動物体内ニ在ルキハ生物寄生ニシテ人工培養基或
ハ襪襪塵埃ニ存スルキハ死物寄生ノキナリ而シテ初メ生物寄生ノ時ハ容易ニ發育繁殖セサル者モ
死物寄生ノ時ニ至リテ容易ニ發育繁殖スルニ至ル又ベスト菌ハ直接ノ日光或ハ非常ナル乾燥ヲ受
クルニ非ラサレハ數ヶ月間モ生命ヲ保續セルヲ以テ氣候等ノ關係ニテハ撲滅スルコトハ故ニ一
旦ハ患者ヲ生セサルモ翌年ニ至リテ一定ノ温度温氣等凡テ發育ニ適當スルニ至レハ再ヒ發育繁殖
ス之レ豫防撲滅上困難ナル原因ナリ

症狀ニ就イテハ「ベスト」病ハ急性傳染病ノ一ニシテ外部及ヒ内部ノ淋巴腺炎ヲ起シ化膿ニ陥ルノ

傾チ有ス潜伏期ハ二日至七日ナリ

最初ハ前驅期アリ之レ普通ノ熱性病ト同シク全身倦怠嘔氣頭痛等ノ症候ヲ發シ一二日間持續ス發病ノ初期ハ多クハ熱發ヲ以テ初マル熱ハ惡寒戰慄ニ伴ヒ突然高温ニ達スル者アリ或ハ三十八度位ノ熱ヨリ初マル者アリ次テ腺ノ疼痛ヲ感ス此初期ノ徵候ハ各人ノ性質体格感受ノ銳鈍ニ由テ異ナル或ハ腺ノ疼痛ヲ以テ初マリ后熱發スル者アリ或ハ熱度スルコト一二日ノ后腺ノ疼痛ヲ來スアリ

極メテ輕症ノ者ハ前驅期ナクシテ只々一回ノ惡寒戰慄ヲ來シ頭痛嘔吐及便秘之レト同時ニ淋巴腺ノ疼痛腫脹ヲ來スニハ特ニ鼠蹊腺股腺ヲ多シトス次テ腋窩腺顎下腺頸腺ヲ犯ス稀レニ兩側ノ腺同様ニ犯サル、トアリ而シテ三日至六日ノ后淋巴腺ハ破開シ膿ヲ排泄シ強キ發汗ノ后恢復期ニ移ル中等ノ症ハ凡テノ症狀一層強クシテ結膜ハ充血シ時トシテ結膜下ニ出血ヲ見ルトアリ屢々譫語ヲ發シ人事不肖ト成ル体温ハ非常ニ高度ト成リ「カルブアンケル」血斑ヲ皮膚ニ生ス舌ハ厚キ白苔ヲ蒙ルリ急性ノ腺炎ヲ來ス腺ノ化膿破開ハ屢々豫后ノ良ナルトアリ而シテ死亡ノ轉歸ヲ取ル者ハ四日至六日ノ中ニ死シ全愈ニ趣クキハ一週至三週ヲ要ス

尤モ高度ノ場合ニハ前ノ諸症一層劇烈ニシテ患者ハ劇シキ苦膿ヲ感シ自ラ死スルノ考ヲ抱ク淋巴腺ノ腫脹ヲ來サスシテ速ニ死ス而シテ頑固ノ嘔吐持續性ノ便秘時トシテ尿閉ヲ來ス末期ニ至レハ血

液類敗ノ現象特ニ皮膚上ノ出血又胃腸腎及ヒ肺ヨリ出血ス特ニ頻回ノ肺出血ヲ來セシニ依リ歐州ニ於テ中古流行ノ時代ニ於テ黑死病 *Schwartz Tod* ノ名アリト患者ハ速ニ虛脱ニ陥リテ斃ル以上述ベシ症狀中尤モ「ベスト」病ニ特異トスルハ淋巴腺ノ腫脹ナリ即チ急性ノ出血性炎ニシテ只々ニ周圍ノミナラス腺内ニモ起ル而シテ周圍ノ組織ニ浸潤シ筋肉等ト癒着スルヲ以テ移動シ難シ或ハ周圍ノ浸潤強キカ爲メ他ノ腺ト合一シテ皮膚上ヨリ腺ノ形狀ヲ觸知スルヲ克ハス之レ梅毒結核等ノ腺腫脹ト異ナル特徴ナリ終ニ進メハ軟化シテ壞疽ニ陥ル

剖見上淋巴腺ハ外部及ヒ内部ヲ問ハス凡テ充血シ炎症ノ浮腫及ヒ間組織ノ成形過多并ニ周圍結締織ノ肥大ヲ認メ又タ出血ス脾ハ每常肥大シ肝腎モ肥大スルガ如シ屢々内臟器管ニ於テ大小ノ出血ヲ認ム

豫后ハ不良ニシテ死亡數ハ「八十五プロセント至九十プロセント」ナリ

療法豫防消毒法ヲ十分行フテ必要トス屍体并ニ所有物ハ燒捨テ出來得ケレハ家屋ヲモ燒却スヘシ然ラサレハ甚タ注意シテ消毒ス已ニ發病セシ者ニハ對症療法ヲ成スニ過キス

以上ハ本病ノ概論ニシテ終リニ神戸ニテ得タル病症日記ヲ述ベテ本論ヲ結バントス

明治二十三年神戸市ニ於ケルベスト病患者病症日誌

十一月十三日午後九時入院

十一月十日夜 發病 古川銈三郎 卅五年

十一月十五日午後九時五十分死亡

生來強壯ニシテ曾テ重患ニ懼リシコナシ百斯篤流行地ニ交通セシコナシ

本月十日午後十時頃惡寒戰慄ヲ以テ熱發セリ十二日朝以來左股腺部ニ劇痛ヲ來シ腫脹發赤セリト云フ便通ハ一日一回至二回ナリ嘔氣ナク精神異常ナシ

十三日体格榮養佳良ニシテ皮下脂肪中等ナリ脈搏八十四整正ニシテ實ス頭痛ナク眼瞼及眼球結膜ニハ輕度ノ充血アリ舌ハ白苔ヲ帶ビ乾燥ス口渴アリ便通一回稍々軟ナリ食思不振輕度ノ腹滿アリ理學的變狀ヲ認メス

左股腺ニ於テ鷲卵大ノ硬結セル腫脹アリ腫起發赤シ疼痛強シ周圍ニ浸潤ス

右方ハ腫脹ヲ認メス頸腺腋窩腺ニモ腫脹ヲ觸レズ而シテ患側ノ足部ニ於テハ皮膚軟部ノ損傷ヲ認メス摘出セル腺ヨリ成規ノ如ク顯愈スルニ多數ノ「ペスト」菌ヲ認ム

處方 鹽里茂二〇〇、〇 ストロロー、〇 赤酒三〇、〇

右一日 分服

十四日午前九時脈搏九十六整正強實ナリ舌苔口渴ハ依然タリ体温三十八度八分腺ノ摘出后ハ一時空腹ノ感アリシモ今朝牛乳二合ヲ飲シ而已精神爽快ニシテ僅ニ頭痛ヲ訴フ便通ナシ結膜充血アリ

脾ハ上縁ハ第八肋骨上縁ニ下縁ハ腹部緊張シ爲ニ明カナラス理學的變狀ハ著明ナラス午後六時脈膊九十四、体温三十九度舌苔口渴依然タリ而シテ局部ノ疼痛ヲ覺ヘス夜十一時催眠藥ニ依リテ一時間半安眠ス

鹽里茂前方 ズルホナル一、〇頓服

十五日午前九時脈膊九十六整正ナレモ弱シ便通四回二回ハ下痢様ナリ頭痛ヲ訴フ体温稽留ス局部ハ鈍痛ヲ訴フ舌苔口渴ハ依然タリ体温三十九度二分

鹽里茂前方 キニーチ一、〇 爲ニ包一包宛與フ

午后二時局部ニ於テ周圍ニ波及スル轉動狀疼痛ヲ訴フ次第ニ増加ス而シテ初メ顔面ニ於テ帽針頭大ノ發疹ヲ認メ其數稍々多シ次テ上肢及ヒ腹部ニモ同様ノ發疹ヲ認ム胸部ニハ認メス

午後六時体温三八、八脈膊百四整ナレモ小ニ弱シ右肺呼吸音粗烈ニ淡紅色ノ咯痰ヲ混シ泡沫様ヲ呈ス局部疼痛緩解セリ

鹽里茂二〇〇、〇 ウイスキー三〇〇、〇 ヲ與フ

是レヨリ次第ニ顔貌蒼白ニシテ不穩ノ狀ヲ呈シ脈膊不良ト成ル午後九時脈膊微細顔面蒼白少シク冷汗ヲ流ス患者自ラ死期ノ近キタルヲ決スル者ノ如シ呼吸不正ニメ全身苦悶ノ狀アリ如斯ニメ諸症増悪九時五十分死ニ就ケリ

十一月十五日午後七時廿五分入院

十一月十四日午前三時 發病 菅原伊勢吉 卅二年

十一月十八日午前六時 死亡

天性強壯ニノ曾テ著患ニ懼リシコナシ本月十三日午後第七時仕事先ヨリ歸宅セシカ別ニ異常ヲ認メサリシ十四日午前二時戰慄ヲ發シ熱發右鼠蹊部ノ劇痛ヲ訴フ頭痛ナシ十五日午後三時健康診斷ニ依リ本症ト認定セラレ當院ニ送り來レリ

十一月十五日體質佳良榮養中等皮下脂肪欠乏ス体温三十九度三分精神少シク朦朧トナリ重聽アリ結膜ハ充血シ舌ハ高度ノ白苔アリテ乾燥ス理學的變狀著明ナラス足蹠ニ數個ノ皮膚損傷ヲ認ム右ノ水脈腺腫起シ周圍ニ浸潤シ境界判然セス壓痛アリテ發赤ス此ノ他兩頸腺及兩腋窩腺ハ腫脹ヲ觸知セサリシ腫脹セル腺ヲ摘出シ之ヲ顯檢スルニベスト菌ヲ多數ニ發見ス局部血質中ニハ菌ヲ發見セサリシ

鹽里茂二〇〇、〇 ホートワイン三〇、〇

右一日 分服

十六日午後九時体温脈搏諸症前日ト大差ナシ脾ハ上緣第八肋骨ニシテ下緣ハ觸知セス胸部全面著シキ變狀ナキモ右第二肋間打診音僅ニ短背部右上葉呼吸音粗烈呼氣僅ニ延長ス全身苦悶甚クシカ

ラス頸腺及腋窩腺ノ腫脹ヲ觸知セズ

鹽里母前方 安知比林ノ頓服

午後三時体温三十九度六分脈搏百〇四性狀整ナリ舌苔ハ依然トノ存シ食思不振アリ口渴稍減退精神少シク朦朧タリ

十七日午前九時体温脈搏百二十ナリ右肺下葉ニ「ラッセル」ヲ聞ク少許ノ咳嗽アレモ咯痰ナシ精神朦朧結膜ノ充血ハ増加ス舌苔口渴依然タリ

午後三時体温又昇ス午後六時頃ヨリ精神幽微ヲ來シ屢々室内ヲ逸出セントシ騒狂ノ狀ヲ呈シ全身苦悶甚タシ夫レヨリ益々騒狂狀ヲ呈シ妄語ヲ發ス
ズルホナール一、〇頓服

十八日午前一時騒狂狀益々甚タシ遂ニ室内ヲ逸出セントシテ硝子戸ヲ破碎スル狀態ヲ呈シ來レリ苦悶益甚タシ

臭剝四、〇 苦丁二、〇 水一〇〇、〇 右一日三回分服
コロラール一、〇 浣腸ス

午前四時半脈膊微細殆ント觸レ難シ瞳孔散大シ角膜ハ反應ナシ心音微弱右肺「ラッセル」多シ左肺ハ著シカラス

毎半時カンフルオレフ油一筒ヲ注射ス

諸症益々増惡終ニ午前六時鬼籍ニ昇ル

十一月十七日午後五時入院

十一月十六日午後四時 發病 下司仙之助 二十九年

十一月二十日午後八時十五分死亡

天賦強壯ニシテ曾テ重病ニ罹リシコナシ十六才ノ頃天然痘ヲ經過セリ他ニ疾病ナシ
本月十六日午後四時頃右鼠蹊腺部ニ疼痛ヲ感シ漸々腫脹シ疼痛増惡ヲ來セシモ現著ノ前驅症ヲ自
覺セス健康診斷ニ由テ發發セラレタリ

十一月十七日体格榮養共ニ中等脈搏百二十舌ハ僅ニ白苔ヲ帶ヒ口渴著シカラス眼瞼結膜ハ貧血ヲ
呈ス頭痛ナシ頸腺及兩腋窩腺ノ腫起ヲ觸レス脾ノ上界ハ第八肋骨ニシテ下緣ハ觸レス肝ノ上界ハ
第六肋骨ニシテ下緣ハ通常ナリ其他理學的症候著シカラス左鼠蹊腺ハ腫左ヲ認メス

右股腺ハ腫起鶏卵大ニシテ限局シ能ク移動ス周圍ノ炎症症狀ナシ鼠蹊腺部ノ腫脹ハ一二ヲ觸知ス
下肢ニアリテハ著明ノ浸入点ヲ認メスト雖モ右ノ跖趾ニ爪床炎ヲ三十日前ニ起セリト云フ現時ハ
皮下溢血ノ状態ヲ呈シ疼痛ナシト云フ

之レヲ以テ「ペスト」ト診斷シ腺ノ摘出ニ取カ、リ梅實大ヨリ小豆大ニ至ルノ腺十一個ヲ摘出シ午
后七時全ク手術ヲ終ヘリ術後顯檢スニ多數ノ「ペスト」菌ヲ認ム

依テ氷褰法ヲ成シ下記ノ處方ヲ與ヘリ体温三十八度六分

鹽リモ一〇〇、〇 ポートワイン三〇、〇

右一日 分服

カンフル〇、四 乳糖〇、五宛四包 毎四時一包宛 牛乳二合鶏卵三個

十一月十八日午前一時空服ヲ訴フ稀粥二碗ヲ食ス

午前九時脈搏百十五性質整正ニシテ硬シ体温三十九度八分食思アリ理學的變狀著シカラス他腺ノ腫起ヲ觸レス痲痛アリト云フ又渴ヲ訴フ少々咳嗽ヲ發ス

水劑前方 スルボナール一、〇頓服

午後六時脈搏百卅二体温三十九度四分ニシテ右肺ノ下葉ハ呼吸音ノ粗烈ヲ發見セリ顔貌少苦悶狀アリ便通一回性ハ通常ナリ

十九日午前六時體溫三十九度八分顔貌稍々不穩ノ狀アリ右肺ノ下葉呼吸音粗烈前日ヨリ稍々著明ナリ頻リニ渴ヲ訴フ舌苔甚タシ他腺ノ腫脹ヲ見ス

午後六時體溫三十九度輕度ノ咳嗽アリ非常ニ口渴アリ諸症前日ト特別ノ大差ナシ

二十日午前六時脈搏九十體溫三十八度五分ニ下降ス前夜來口渴甚タシク多量ノ飲料ヲ欲ス水様下痢一回アリ午前八時粥汁ヲ請求スルヲ以テ之レヲ與ヘントスル際特別ノ苦悶ナクシテ心臟麻痺ヲ起シ死ニ就ケリ

死后一時間ノ狀態顔貌ハ不穩ノ狀ヲ呈シ顔面ハ殆ント鬱血シ眼瞼結膜充血腫孔散大四肢ノ指趾先ハ稍々「チアノーゼ」ヲ呈シ糞便ヲ洩出セリ（普通黃色ニシテ軟）

舌ハ悉ク苔ヲ帶ヒ白布ヲ引ク如ク舌乳頭ハ鬱血ス胸部理學的變狀ハ著シカラス下顎關節稍々強直ヲ呈シ股關節膝關節モ僅カニ強直ヲ呈ス而シテ他ノ腺ニ於テハ腫起ヲ觸レズ創面ハ皮膚ノ切面暗紫色ニ變シ靜脈ハ爵血シ周圍組織ハ一般浸潤ス即チ稍々壤坦ニ陥ルノ狀態ヲ呈セリ

●一種ノ發作性ヒステリー性震顫ノ一例

金澤病院内科室ニテ

藤井助雄

余輩元トヨリ詢劣薄識ニノ實見ニ乏シト雖モ只頃日我が金澤病院内科第一部外來「クリニツク」ニ於テ一病婦ノ奇異ナル震顫發作ヲ訴ヘツ、來レルヲ實見セリ當時余ハ彼ニ入院治療ヲ懇諭セリト雖患者ハ家事ノ多端ナルト亦自己ノ病ノ久シクシテ治愈セサルトヲ知り服從セス只僅ニ數日登院スヘキヲ約セシノミ是レニ由リ余ハ直接ニ患者ニ接スルノ機會少ナク満足ナル研究ヲ得サリキ故ニ只余ハ記憶ニ存スル既往ノ病歴ト發作ニ狀況ヲ單易ニ記述セント欲ス遺脫誤謬ノ罪ハ余ノ甘受スル所諸氏幸ニ其ノ研究ノ粗漏ナリシヲ嘲笑スルナカレ

一病婦 今井某 年齡四十七才 石川縣能登郡富來村 僧侶家族