

然ラバ果シテ本患者ハ何病ナルヤシャルコー氏 (J. M. Charcot) ニヨルニ歇私的里性震戰 Hysterische Krämpfe ト云ヘ其震顫ノ狀必
頑固著明ノ震顫ヲ來スコアリテ之レヲ歇私的里性震戰 Hysterische Krämpfe ト云ヘ其震顫ノ狀必
シモ一定スルモノニアラスト氏ハ其神經病講義ニ於テ本病ノ數例ヲ記載セリ而シテ本患者ノ如ク
生來神經質小譫ニシテ精神ヲ些事ニ勞スルコト多ク亦發作ハ常ニ精神ヲ過勞セル時期ニ起リ其ノ停
止狀態ノ奇異ナル等其症實ニ變幻出沒ニシテ他覺的一ノ病的變化ヲ認メサル等以テ「ヒステリー」
ト診斷スル敢テ太過ナクナカランカ殊ニ本患者今ヤ更年期ニ近ヅキシヲ以テ更ニ「ヒステリー」發
作ヲシテ容易ナラシメタルモノナラン
豫後 本病治癒ニ至リテハ或ハ難カランモ從來ノ經過中ニ於ケルカ如ク一時自然ニ靜止ススルナ
ラン而シテ生命ニ關スル豫后ニ至リテハ佳良ナルベシ
療法 一般「ヒステリー」療法トシテ規那煎臭素劑等ヲ用ヒシト雖モ其治療日數ノ短ナルヲ以テ茲
ニ充分ナル奏効ヲ見サリシヲ遺憾トス

●按摩術ノ醫療上應用ニ就テ

(承前)

下平用彩述

余ハ前回ニ於テ按摩術ノ施用ニ最モ適應スル主要ナル外科的疾患ノ綱目ヲ舉ゲタリ今ヤ其各病ニ

對スル該術ノ應用及治驗ノ大要ヲ述ヘ以テ此稿ヲ結ハントス

〔第一〕 皮膚ニ損傷ヲ來サヅル單純ノ挫傷即チ皮下挫傷ニ在テハ其部位及外力ノ強弱等ニ由リ固ヨリ其度ヲ異ニスヘキモ必ズヤ多少ノ皮下溢血ヲ來スヲ常トス而シテ其輕度ノ者ハ敢テ治療ヲ施スニ及ハサルモ後害ヲ貽スコト無ク再ヒ全ク吸収シ去ラルト雖モ其稍々高度ノ者ニ在テハ之ヲ放任スルキハ溢血容易ニ吸収シ去ラレサルノミナラス適々病菌外ヨリ來リテ此部ニ到達スルキハ爲メニ往々發炎化膿ヲ起シ時ニ不測ノ患害ヲ招クコト無キニ非ス斯ノ如キノ場合ニ際シ溢血ヲ速カニ消散セシメ以テ炎症其他ノ患害ヲ未發ニ防クノ法ハ如何只夫レ按摩法アルノミ蓋シ皮下ニ溢血ヲ來シ所謂血腫(ヘトム)ヲ生シタル際ト雖モ速カニ之ニ壓抵ヲ施シ且ツ按摩法ヲ施スキハ一方ニ於テハ溢血ノ増加ヲ防止スルノミナラス又溢出セル血液ハ損傷セラレザル周圍組織内ニ驅逐分配セラレ爲メニ吸収面増大スルヲ以テ大ニ其吸収ヲ催進スル者ニシテ高度ノ溢血ニ在テモ此法ヲ以テスルキハ速カニ之ヲ消散セシメ以テ發炎化膿ヲ防クコトヲ得可シ然レモ按摩法ノ効驗ハ管ニ之レノミニ止マラサルナリ溢血高度ニシテ皮膚緊脹シ爲メニ神經壓迫セラレ疼痛ヲ起ス者ニ之ヲ施スキハ皮膚ノ緊張速カニ減退スルヲ以テ疼痛モ亦直ニ消散スル者トス次ニ

〔第二〕 骨ノ疾患ニ就テハ殊ニ骨折ニ按摩法ヲ施スノ甚タ必要ナルコトアルヲ知ラサル可カラズ蓋シ骨折ニ對シテハ從來殆ント皆患部ヲ固定保安スルヲ主要トシ專ラ之ニ副子縛帶或ハ不動固定縛

帶ヲ施シタリト雖ニ關節附近ノ骨折ニシテ殊ニ溢血ノ著大ナル者ニ在テハ後チ繃帶ヲ除却スルニ關節ハ強直ヲ起シテ屈伸スルコト能ハス且ツ屢々腫脹ヲ貽シ遂ニ其運動機能ヲ廢絶スルニ至ルコトルハ吾人ノ往々目撃スル所ナリ然ルニ著大ナル溢血ヲ呈スル關節捻挫ニ按摩法ノ卓効ヲ奏スルコトヲ知リシヨリ以來種々ノ骨折ニ按摩法ヲ試用シ本症ニモ亦良効アルコトヲ認ムルニ至レリ蓋シ骨折ニ按摩法ヲ施スコトハ一千八百八十年巴里外科學會ノ主トシ唱道セシ所ニシテ爾來佛國外科醫ハ盛ンニ之ヲ試用シルカシヤンピオチール氏ノ如キハ關節附近ノ骨折ニ固定繃帶ヲ施スハ全ク無益ノ業ニシテ療法ノ主眼トスル所ハ第一ニ按摩法ニ由リ溢血ヲ去リ且ツ關節ノ運動法ヲ行フニ在リト云ヘリ獨逸國ニ於テ骨折ニ按摩法ヲ稱用シタルハ殊ニ軍醫スタルク氏（一千八百七十七年之ヲ獨乙軍醫會雜誌ニ報告セリ）ニシテ氏ハ始メ骨折部ヲ護謨帶ニテ緊縛スルコト十五分乃至四時ノ後之ヲ去リ次テ中樞部ニ向テ按摩法ヲ行ヒ溢血ノ吸収ヲ催ガセリ溢血去ルキハ折片ヲ正シク接合スルコト容易ニシテ後チ之ニ繃帶ヲ施スナリ但シ繃帶ハ屢々除去シ此際兩手ヲ以テ骨折部ヲ固持シ他働的ニ附近ノ關節ヲ運動セシム然レニ按摩法ハ受傷后第四日ノ後ニ行フテ法トス若シ之ヨリ早ク之ヲ行フキハ損傷セラレタル組織ヨリ再ビ出血シ易ケレバナリ今定型性ノ燒骨々折ニ就テ該療法ノ一班ヲ舉ゲンニ第一先ツ折片ノ轉位ヲ整復シタル後前膊及手ヲ「シエーデ」氏副子ニ中テ固定シ手指ヲ勉メテ運動セシメ溢血ノ著大ナラザル者ニ在テハ三四日ヲ經テ此副子ヲ去リ手ヲ按摩シ關節

ヲ運動シ次テ肘部ヨリ手掌ノ中央ニ至ルマテ義布斯綳帶ヲ施シ七日ノ後綳帶ヲ交換シ此際又按摩法及關節運動ヲ行ヒタル後再ヒ固定綳帶ヲ施シ五乃至七日ノ後(即チ交換後十五乃至十八日後)全ク綳帶ヲ撤去ス此時ニ至レハ骨折ハ多クハ骨性癒著ヲ遂クル者トス然レモ溢血ノ著大ナル者ニ在テハ患肢ヲ「シエーデ」氏副子ニ固定シ且ツ護謨帶ヲ以テ之ヲ緊縛シ先ツ溢血ノ吸収ヲ謀ラサルヘカラス次ニ

〔第二〕關節諸病ニ就テハ按摩法ノ應用頗ル廣シ余ハ先ツ關節挫傷及捻挫ニ就テ之カ應用ヲ述フヘシ蓋シ此二症ニ按摩法ノ頗ル有効ナルコトハ夙ニ識者ノ確認スル所ニシテ「ヒュテール」氏ノ如キハ之ヲ以テ「In der That stau nenaregend」トマデ賞賛セリ獨逸國ニ於テハ諸家夙ニ之ヲ稱用セリト雖モ殊ニ盛ンニ之ヲ研究シタルハ同國軍醫ニシテ其調査成績ニ憑レハ殊ニ關節捻挫ニハ著大ノ効アルヲ知ル蓋シ從來一汎ニ本症ノ療法トシテ行ハレタル法ハ關節固定法ニシテ甚タシキハ三四週ノ久シキ義布斯綳帶ヲ施ス者アリタリ然レモ是レ固ヨリ適當ノ療法非ス之カ爲メ後チ關節ノ強直、患肢ノ瘦削、無力ヲ殘シ或ハ鞞帶弛緩ノ爲メ再々捻挫ヲ反覆スル等ノコトハ吾人ノ熟知スル所ナリ故ニ現今ニ於テハ斯クノ如キ固定法ヲ避ケ主トシテ按摩法ヲ施スニ至レリ獨乙軍醫スタルケ、ゲス子ル、ブルーベルゲル等諸氏ノ研究調査スル所ニ據レハ舊法ニ從ヒ關節ニ固定法ヲ施スルハ治療日數平均二十三、七日ヲ要スレモ適當ノ按摩法ヲ以テスルハ其平均日數僅々八、九

日ニノ前者ヲ以テスルヨリ其數ヲ減スルト實ニ二十四、八日ナリト云フ以テ其効驗ノ頗ル著大ナルヲ推知スルニ足ルベシ而シテ其効驗ハ受傷後直ニ按摩法ヲ始ムルキハ益々較著ナル者ニシテ從來多數實地家ノ信シタルガ如ク關節部ノ疼痛、腫脹其他炎機ノ減退スルヲ俟テ始メテ之ヲ行フガ如キハ實ニ謬見ト謂ハザル可カラズ何トナレハ按摩法ノ目的トスル所ハ早く局所ノ溢血ヲ吸収セシメテ以テ速カニ其疼痛ヲ緩解セシメ以テ其腫脹ヲ減退セシメ又以テ炎機ノ發生ヲ防止シ關節機能ヲシテ早く恢復セシムルニ在レバナリ故ニ吾人ハ關節挫傷若クハ捻挫ニ遭遇スルキハ最初ヨリシテ按摩法ヲ施スヲ常規トス但シ初期ニ於テハ患者殊ニ疼痛ヲ訴フルト多キヲ以テ先ツ誘導按摩法及輕擦法ヲ行ヒ疼痛ノ稍緩解スルニ從ヒ稍強ク按摩ス而シテ其一同ニ費ス所ノ時間ハ少ナクモ十五分間ニシテ五乃至六時間ノ後更ニ同法ヲ反覆シ其中間時ニハ初メハ單純ノ「フリースニツ」氏崙法ヲ施シテ屢々之ヲ交換スルモ患者己ニ歩行シ得ルニ至レバ（殊ニ足關節ニ就テ云フ）其上ニ「フラチル」帶ヲ施シテ緊縛スルヲ良トス從來人ノ多ク稱用セル氷崙法ノ如キハ全く廢棄スベシ而シテ按摩法ヲ行フニ際シ殊ニ著目ス可キハ局所ニ毫モ腫起硬結等ヲ殘サヅラシムルニ在リ故ニ一週日ノ後ニ至リ若シ殘部ニ尙硬結ヲ存スルヲ認ムルキハ強ク該部ヲ按摩シテ之ガ消散ヲ謀ラザルベカラズ而カモ之ヲ消散セシムルト甚々容易ナルヲ常トス斯クテ後ニハ只夜間ノミ「フリースニツ」氏崙法ヲ施シ書問ハ尙暫ク「フラチル」帶ヲ纏結セシムベシ然而シテ自働運動、他働及反抗

運動ヲ施用スルノ時期ニ關シテハ諸説一定スル所チリト雖モ多數ノ實驗家ハ假令重症ナル關節捻挫ニ於テモ初メヨリ徐々ニ是等ノ運動法ヲ行フヲ稱揚ス但シ關節囊狀靱帶ノ著シク損傷セラレタル者ノ如キニ在テハ初メテ過劇ノ運動法ヲ施スハ固ヨリ避ケザルベカラズ

關節ニ一タビ捻挫ヲ起スキハ殊ニ足關節ニ於テハ後チ關節ニ萎弱ヲ覺ヘ轉倒シテ再々捻挫ヲ起スノ傾向ヲ生スルコトハ人ノ能ク知ル所ナリ或ハ曰ク是レ全ク囊狀靱帶ノ弛緩ニ因ル者ナラムト然レモ至細ニ之ヲ研索スルキハ此傾向ハ必ズシモ囊狀靱帶ノ弛緩ニノミ歸スヘキモノニ非ズ關節運動ヲ主トスル所ノ筋働作ノ不調亦實ニ之ガ一大原因トナルモノニ歸スル所ハ最初ヨリ適當ノ按摩法及運動法ヲ行ハザリシニ因ルノミ而シテ斯ノ如ク筋ノ働作ニ不調ヲ來ス所以ノモノハ其一定部ニ脂肪變性ヲ起スニ因ル者ニシテ此變性ハ關節及其周圍ノ筋膜、腱等ニ於ケル炎症其求心部ニ在ル所ノ一定ノ筋屬ニ蔓延シ此所ニ浸潤ヲ來スニ因ル者ニシテ爲メニ該筋ハ其對働筋ヨリ薄弱トナルニ因ルナリ

急性滑液膜炎ニ在テモ慘出物膿性ナラザルキハ亦按摩法ニ由テ其治癒ヲ催進スルコトヲ得ヘシ但シ此際施ス所ノ按摩法ハ只其上部ニ於テスルノミニシテ疼痛及炎症ノ減退スルヲ俟テ始メテ之ヲ局所ニ施スノミ然レモ特異ナル傳染性病菌ニ由ル關節炎ニハ之ヲ禁忌セサルベカラス慢性肉芽性關節炎ニ於ケルモ亦然リトス只是等ノ關節炎ニ於テハ炎症ノ消散若クハ治癒シタルノ後ニ至リ通常之

ガ結果トメ來ル所ノ關節強剛、筋萎縮等ニ按摩法及爾他運動法ヲ施スヲアルノミ然レモ其他ノ慢性關節炎ニ對シテハ按摩法ハ亦實ニ必須歟クヘカラサル肝要ノ療法トス蓋シ慢性關節炎ニ於テハ關節周圍ノ炎症浸潤及硬結ハ常ニ筋鞘、腱及節膜ノ間ニ在ル所ノ淋巴管及血管ニ沿テ患部ヨリ中樞部ニ蔓延スル者ニシテ此硬結ハ少シク注意シテ觸診スルハ明カニ觸ル、トテ得可ク又強ク之ヲ壓スルニ疼痛ヲ發スルヲ常トス若シ斯ノ如キノ硬結ニシテ長ク存在シ消散セサルハ關節ノ炎症漸ク治癒ニ向フモ爲メニ病的產物ノ吸收大ニ妨ケラル、ヲ以テ十全ナル治癒ヲ營ムト能ハサル者トス而シテ之ヲ消散セシメ以テ局所ノ炎症產物ヲ吸收セシメ其治癒ヲ催進スルノ法ハ按摩法ニ若クモノナケレハナリ嘗ニ然ルノミナラス慢性關節炎ニ於テハ亦通常其附近ノ一定筋屬ニ萎縮ヲ來シ之カ爲メ炎症治スルノ後モ長ク關節ノ機能障礙ヲ貽スコト多シ而シテ之ヲ治スルノ法モ亦必スヤ按摩法及爾他運動法ニ賴ラサル可カラサルナリ「ル、フォルト」及「ワルター」氏ノ研究ニ憑レハ此筋萎縮ハ關節炎發生後甚ダ早く來ルモノニシテ殊ニ一定ノ筋ハ侵サル、ト最モ著明ナル者ナリ即チ膝關節炎ニ於テハ四頭股筋、肩胛關節ニ於テハ第一ニ三角筋、次テ棘下筋、棘下筋及大胸筋、膀關節ニ於テハ臀筋、肘關節ニ於テハ二頭膊筋及内膊筋、足關節ニ於テハ前脛骨及總趾伸筋ノ侵サル、ト最モ多シト云フ蓋シ是等ノ諸筋ニ萎縮ヲ來ス所以ノモノハ只關節ヲ使用セサルカ爲メノミナラス(所謂廢用萎縮)又關節ノ炎機ハ恐ク淋巴道ヲ經テ潛カニ筋内ニ傳播シ之ニ胼胝或ハ脂肪變

性ヲ起サシメ以テ其營養ヲ障碍スルニ因ル者ナリ殊ニ伸筋ニハ萎縮ヲ來スヲ最モ甚クシキヲ以テ按摩法及運動法ヲ施スニ當テハ主トシテ該筋ニ力ヲ致サ、ルヘカラス

慢性漿液纖維性關節炎ニシテ既ニ一部或ハ全部ノ關節強直ヲ起シタル者ニハ按摩法ヲ施スニ先テ局所ニ熱濕法ヲ施スヲ最モ有効ナリトス蓋シ之ニ由テ局所ノ血行ヲ旺盛ニシ以テ病的產物ノ吸收ヲ催進スレハナリ

關節血腫及關節水腫ハ單ニ按摩法ニ由テ治癒セシムルヲ得可シト唱道スル者アレヒ「グッセンバウエル」氏ノ如キハ之ニ壓抵綱帶ヲ兼用スルヲ稱用ス余等モ亦「グ」氏ノ法ニ左袒スル者ナリ然レヒ蓄液ノ多量ナル者ニ在テハ又防腐的穿刺術ヲ行フヲ必要トスルヲ有リ

此他關節炎ノ療法上注意スベキ件ハ其炎症ノ急性タルト慢性タルトニ拘ラス患者ヲシテ嚴ニ就尋セシムルヲ不利ナルト是ナリ殊ニ慢性關節炎ニ惱メル者ニ於テ然リトス故ニ余等ハ寧ク患肢ヲ適度ニ使用スルヲ許スノミナラズ又之ヲ獎勵セザルベカラザルヲ有リ是レ長ク患肢ヲ固定シテ運動セシメザルキハ後チ關節機能ニ不良ノ結果(殊ニ關節強直)ヲ來スヲハ當然ノコタルノミナラズ亦全身ノ營養ヲ障碍スルヲ尠少ナラザルナリ然リ而シテ按摩法及運動法ハ官ニ關節強直ヲ防クノミナラス亦已ニ生シタル強直ヲ輕快セシメ或ハ全ク之ヲ治癒セシムルヲウベシ即チ經久ノ關節強直ニシテ關節体ノ固ク癱著セル者ニ在テモ按摩法ヲ行ヒ且ツ徐々ニ他働的運動法ヲ行フトキハ能

ク之ヲ治スルコト有リ此際時宜ニ由リ麻酔裡ニ稍々強劇ノ運動法ヲ試ムルコト有レトモ彼ノ所謂
“Prisement force”ハ稱用スベキノ法ニアラズ殊ニ奏効ノ著明ナルハ新タニ發シタル關節強直ニ
此症ニ於テハ假令纖維性癒著ノ廣大ナル者ニ於テモ多クハ之ヲ治癒セシムルヲ得ル者ナリ今左
ニ關節強直ニ對シテ行フ所ノ術式ニ就テ實地上肝要ナル點ヲ略述セムトス

新タニ發シタル關節強直ニシテ尙疼痛ノ消散セザル者ニ在テハ最初一二週間ハ只關節ニ接近セル
中樞部ニ輕擦法及甚ダ弱キ柔捏法ヲ行フノミニ直接ニ關節部ヲ按摩スベカラズ是レ其必要ナキ
ノミナラズ徒ラニ疼痛ヲ増劇セシメ又時トノ病勢ヲ増惡セシムルヲ有レハナリ而シテ直接ニ關節
ニ按摩法ヲ行フベキ時期ハ施術ノ際其中樞端部ニハ殆ンド疼痛ヲ覺ヘズ且ソ關節ヲ運動セシムル
モ著シキ疼痛ヲ喚起セザル時ニ在リ但シ最初ハ尙緩徐ニ術ヲ施サザルベカラサレモ關節ノ運動ヲ
主ドル所ノ筋殊ニ伸筋屬ニハ強ク按摩法ヲ行フヲ必要トス而シテ關節及其附近ノ炎性浸潤物漸ク
吸収セラレ腫脹減退スルトキハ屢々自他動的運動ヲ施シ又反抗運動ヲ行ヒ以テ筋肉ノ強實ヲ謀ラ
ザルヘカラズ是レ關節強直治癒スルモ其運動ヲ主ドル所ノ筋肉ニ萎縮ヲ貽スルハ全ク關節機能ヲ
恢復スルヲ能ハサレハナリ

所謂關節神經症ニ對シテモ亦按摩法ハ良効ヲ奏スルモノトス該症ハ貴賤、男女、長幼ノ差別ナク往
々觀ル所ノ疾患ニシテ他覺的ニハ精密ニ検査ヲ行フモ毫モ關節ニ病的變常ヲ認メザレモ患者ノ自
ケレンクイローゼ

覺の症候殊ニ關節痛ハ屢々頗ル劇甚ナル者ナリ而シテ此症ハ歇斯的里「ヒポコンデリー」其他總テ神經性ノ者ニ多ク見ル所ニシテ殊ニ女子ノ發育期ニ來ルヲ多シトス然レモ斯ノ如キ他覺的ニ毫モ病變ヲ認メズト稱スル者ニ在テモ實際ニ於テハ恐ク亦多クハ吾人ノ認識スルヲ能ハサル隱微ノ病變ヲ存スル者ニシテ之ヲ「Nervous」ト稱スル者ハ只其病變ヲ觸察スルヲ能ハサルニ坐スルノミ故ニ人ノ神經性關節炎ト稱スル者ニ於テモ熟鍊ナル按摩家ハ能ク其病變（即チ浸潤、滲出物）ヲ觸察シ得ルヲ有リ斯ノ如ク關節部ニ觸知シ得ヘキ浸潤及滲出物ヲ存スル者ニ在テハ按摩法ニ由テ速クニ治癒ヲ得セシムルヲ得ヘキハ固ヨリ其所ナリ

關節癱麻質斯ニ就テハ急性性症ニハ按摩法奏効ナキノミナラス反テ有害ナルヲ有リ是レ本症ハ「レックリングハウゼン」、「ライデン」等諸氏ノ研究ニヨルモ一種ノ傳染物ニ之ニ按摩法ヲ施スルハ身体ニ病毒ヲ散蔓セシムルノ悞アレバナリ然レモ慢性關節癱麻質斯ニ向テハ頗ル卓効ヲ奏スルヲ有リ今左ニ「グッセンバウエル」氏が報告セル一患者ニ就テ之ガ例証ヲ舉ゲン

四十才ノ女十八才ノ頃ヨリ認ムヘキ原因ナクノ漸次右肘關節ニ無痛性ノ腫脹ヲ來シ只運動ノ際疼痛ヲ覺ユルノミナリシガ醫ハ其病性ヲ審ニセズ最初關節ヲ保安シ且ツ局所ニ種々ノ藥物ヲ使用セリ然ルニ後チ感冒ニ由テ右指關節ニモ同一ノ疾患ヲ來シタルヲ以テ冷水療法ヲ施シタルニ症狀却テ増惡セルヲ以テ更ニ温浴及熱浴療法ヲ行ヒタルニ毫モ其効無ク爾後病勢漸ク進ミ二十

二才ノ頃ニ至リテハ全身ノ諸關節殆ント皆浸サレサルヲ無ク斯クテ該患ハ第二回ノ分娩時ニ至リ漸ク中止セリ此間ニハ種々ノ藥物療法ノ傍ラ諸處ノ靈泉ニ浴シ又電氣療法等ヲ試シタレモ寸効ナク關節ニハ日夜絶ヘス多少ノ疼痛アリ患者ハ只幕中ニ呻吟スルノ悲境ニ陥井リ全身ノ營養亦頗ル衰ヘ便通常ニ秘結シ尿中ニハ每常多量ノ尿酸鹽沈渣ヲ生シ遂ニハ心臟機能モ障碍セラレ脈不整微弱ニシテ殆シト觸ルベカラサルニ至リ患者大ニ衰弱セリ

斯ノ如キノ現症ヲ以テ患者ハ一千八百八十年二月下旬「グッセンバウエル」氏ノ治ヲ乞ヒタルニ氏ハ其豫後ノ頗ル疑ハシキニモ拘ラス按摩療法ヲ試ミンコニ決心シ只ニ侵サレタル關節ノミナラス諸關節及全身按摩法ヲ行ヒタリ是レ全身按摩法ハ全身ノ新陳代謝機能ヲ鼓舞シ以テ其營養ヲ旺盛シ從テ亦萎縮セル筋ヲ強實ナラシムレハナリ即チ氏ハ毎日一時間半宛按摩法ヲ施シ同時ニ自他働的運動ヲ行ハシメタルニ已ニ十四日ニメ關節及粘液囊ノ腫脹ハ減退ヲ始メ關節運動漸ク恢復シ患者亦著シキ疼痛ヲ訴ヘサルニ至リ斯クテ一ヶ月ノ後患者ハ杖ニ倚リテ室内歩行シ得ルニ至リ榮養亦大ニ佳良トナレリ其後尙四ヶ月間同法ヲ持續シタルニ諸關節ノ疼痛消散シ關節及粘液囊ノ腫脹消退シ關節ハ只恐ク骨性痘著ヲ營ミタル膊尺關節ヲ除クノ外ハ尋常ノ運動ヲ行ヒ得ルニ至リ尿中ノ沈渣ハ已ニ早ク消失シ脈強實トナリ患者ハ半時間餘ノ散步ヲ試ムルモ疲勞ヲ覺エルヲ無ク能ク家事ヲ執ルニ至レリ

(未完)