

[史料紹介] ホルトルマン氏方集 (薬剂処方集)

メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2017-10-03 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: メールアドレス: 所属:
URL	http://hdl.handle.net/2297/46685

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International License.



北陸医史 第三十九号（平成二十九年二月） 別刷

史料紹介

ホルトルマン氏方集（薬剂処方集）

板垣 英治（金沢市）

ホルトルマン氏方集 (薬剂処方集)

板垣 英治 (金沢市)

ホルトルマン氏方集は総数三七八点の薬剂处方を記したものであり、藤本純吉の筆記した講義録が金沢市立玉川図書館近世史料館に架蔵されている(1)。本処方集の各項目の処方にはどの様な疾病の治療に使用したものであつてゐるかについての記載がない。この為、処方方に記載された薬剂から如何なる疾病に使用されてゐたか推定を試みたが容易ではなく、ここでは史料として紹介することにした。

内容は丸剂七十一點、散剂五十九點、水剂八十九點、煎剂三十七點、点眼剂十三點、含嗽剂十點、注射剂九點、吸入剂六點、点耳剂四點、尿道注射剂十點、腔内注射剂九點、灌腸剂十四點、浴剂二點、塗擦剂およびペルキターネ剂及び膏藥四十五點である。

単位はオンス、グレイン、スクルプル、羨、滴、食ヒ(さじ)が使用されている。

原典では分散しているが、類似した処方集めて記

載した。

ホルトルマン方集

丸剂

一、 硫酸鉄 1 羨 エルホチー子 半羨 ラバル

末 1 羨 或いは甘草末 甘草エキス 適宜

右為 60丸 一日三回5粒宛

二、 硫酸鉄 3 羨 大黃末 2 羨 甘草エキス

適宜

右為 60丸 一日三回 5粒宛

三、 硫酸鉄 3 羨 大黃末 1 羨 キニー子

1 羨 甘草エキス 適宜

四、 硫酸鉄 1 羨 キニー子 1 羨 炭酸カリ

1 羨 タラカントゴム膠 適宜

右為 60丸 一日三回 5粒宛

五、 硫酸鉄 2 羨 炭酸加里 1 羨 シナモン末

ヘンチアナエキス 各適宜

右為 100丸 三回 5粒宛

六、 硫酸鉄 半羨 ラタニアエキス 半羨 エル

ホチーネ 15グレイン 桂皮末 半羨

ヘンブル末 健知亜那エキス 各適宜

右為 50丸 一日四回 5粒宛

七、硫酸鉄 半匁 カンフル 半匁 カルボナス

カリキユス 半匁 タラカントゴム膠 適宜

右為 30丸 三回 5粒宛

八、硫酸鉄 1匁 エルホチ子 1匁 ラタニア

エキス 半匁 コロンボ末 1匁 ヘンチア

ナエキス 適宜

右為 60丸 三回 5粒宛

九、乳酸鉄 3匁 沃剝 1匁半 大黃末 1匁

半 健知亜那エキス 適宜

右為 60丸 一日四回 3粒宛

十、乳酸鉄 1匁 アラビアゴム 1匁 アコ

ニットエキス 4グレイン 沃剝 1匁

甘草エキス 適宜 阿片末 2グレイン

右為 60丸 一日三回 5粒宛

十一、硫酸鉄 1匁半 沃剝 1匁 コロンボ末 適

宜 健知亜那エキス 適宜 実芟多利須葉末

10グレイン

右為 60丸 三回 5粒宛

十二、乳酸鉄 3匁 沃剝 1匁半 阿片末 2グ

レイン コロンボ末 適宜 健知亜那エキス

適宜

右為 60丸 四回 3粒宛

十三、硫酸鉄 1匁半 沃剝 1匁 大黃末 1匁

ヘンチアナエキス 適宜

右為 60丸 三回 5粒宛

十四、硫酸鉄 1匁半 沃剝 1匁 コロンボ末 適

宜 健知亜那エキス 適宜 実芟多利須葉末

10グレイン

右為 60丸 一日三回 5粒宛

十五、沃剝 1匁半 阿片末 2グレイン 乳酸鉄

3匁 コロンボ末 適宜 健知亜那エキス

適宜

右為 60丸 四回 3粒宛

十六、沃剝 1匁 硫酸鉄 1匁半 大黃末 1匁

ヘンチアナエキス 適宜

右為 60丸 三回 5粒宛

十七、沃剝 1匁 硫酸鉄 1匁 コロンボ末 ヘン

チアナエキス 各適宜

右為 60丸 一日三回 5粒宛

十八、沃剝 1匁半 硫酸鉄 3匁 阿片末 2グレ

イン コロンボ末 ヘンチアナエキス 各適

宜

右為 60丸 四回 3粒宛

十九、沃剝 1 匁 乳酸鉄 1 匁 キニーネ 1 匁

ホミカエキス 4 グレイン ヘンチアナエキス

ス 適宜

右為 60丸 三回 5粒宛

二十、沃剝 1 匁 乳酸鉄 1 匁 ホミカエキス 6

グレイン コロンボ末 ヘンチアナエキス

適宜

右為 60丸 一日 10粒宛

二十一、沃剝 1 匁 乳酸鉄 1 匁 コロンボ末

ヘンチアナエキス 各適宜

右為 60丸

二十二、乳酸鉄 1 匁 アセシユムアルセニコシユム

1 グレイン キニーネ 1 匁 ホミカエキス

2 グレイン キナ皮エキス 適宜

右為 30丸 一日三回 4粒宛

二三、乳酸鉄 1 匁 キニーネ 半匁 砒石酸 1 グ

レイン ヘンチアナエキス コロンボ末 各

適宜

右為 60丸 三回 5粒宛

二四、沃剝 2 匁 乳酸鉄 1 匁 エルホチー子 1

匁 コロンボ末 ヘンチアナエキス 各適宜

右為 100丸 一日四回 5粒宛

二五、乳酸鉄 半匁 キニーネ 半匁 阿魏 半匁

ベラドンナエキス 2 グレイン 幾那皮エキ

ス 適宜

二六、沃剝 1 匁 乳酸鉄 1 匁 ホミカエキス 6

グレイン キニーネ 1 匁 幾那皮エキス

適宜

右為 60丸 三回 5粒宛

二七、乳酸鉄 2 匁 ホミカエキス 4 グレイン

キニーネ 1 匁 幾那皮エキス 適宜

右為 60丸 一日三回 5粒宛

二八、乳酸鉄 沃度加里 各3匁 砒石酸 1 グレイ

ン ロベリアインフラタ葉末 健知亜那エキ

ス 各適宜

右為 60丸 一日三回 6粒宛

二九、乳酸鉄 2 匁 沃剝 2 匁 スタラアンノニア

エキス 8 グレイン 吐根末 1 スクルプル

阿片末 2 グレイン ロベリアインフラタ末

半匁 コロンボ末 幾那皮エキス 各適宜

右為 120丸 一日三回 4粒宛

三十、沃陳鉄 24グレイン 甘草エキス 適宜

右為 60丸 一日三回 5丸宛

三一、沃陳鉄 半匁 規尼捏 半匁 タラカントゴム

膠 適宜

右為 60丸 一日三回 4粒宛

三二、沃鉄 半匁 沃汞 5グレイン 阿片末 3グ

レイン アルテール末 幾那皮エキス 各適宜

右為 30丸 一日三回 1粒宛

但し毎日1粒宛増加

三三、キニー子 半匁 実芝多利須葉末 6グレイン

幾那皮エキス 適宜

右為 20丸 一日 10粒宛

三四、ベラドンナエキス 1匁 アロエ 1匁 ミュ

リアスアンモニア 1匁 ヘンチアナエキス

適宜

右為 30丸 毎回 5粒宛

三五、アロエ 1匁 ベラドンナエキス 1グレイン

ン ポドヘー子 1スクルプル 大黃末 半

匁 薬用石鹼 適宜

右為 20丸 1回 3粒宛

三六、アロエ 半匁 ラバル末 1匁 ヘンケル油

10滴 薬用石鹼 適宜

右為 30丸 一日5丸 1回に用す

三七、アロエ 1匁 莨菪越幾斯 2グレイン 塩酸

アンモニウム 1匁 薬用石鹼 適宜

右為 40丸 毎回 5粒宛

三八、ピーペルクユベエ 半オンス テレピンテーナ

油 1オンス 白蠟 適宜

右為 120丸 一日三回 10粒宛

三九、ミュリアスアムモニアカーレ 1匁 コロンボ

末 ヘンチアナエキス 各適宜

右為 60丸 一日四回 5粒宛

四十、金硫黄 8グルテン モルヒネ 1グレイン

テール 大黃末 各適宜

右為 60丸 三回 5粒宛

四一、纈草酸鉄 半匁 モルヒネ 1グレイン

幾那皮エキス 甘草末 各適宜

右為 60丸 四回 5粒宛

四二、青酸亜鉛 2グレイン 纈草酸亜鉛 12グレ

イン 纈草酸規尼涅 24グレイン

右為 30丸 一日三回 5粒

頑固顔面痛に効あり

四三、沃剝 半匁 コロンボ末 幾那皮エキス 各適宜

宜

右為 60丸 三回 5粒宛

四四、沃承 5グレイン タラカントゴム膠 適宜

右為 2丸 朝夕5粒宛 但し毎日1粒宛増加

右為 30丸 朝夕5粒宛

四五、ブロシユムカリ 4匁 タルタラスフェリポツ

タース 1匁 纏草末 1匁 キナ皮エキス

適度

右為 60丸

四六、ブロムカリ 4匁 ラバル末 2匁 ヘンチア

チンキ 適宜

右為 60丸 三回 5粒宛

四七、臭素加里 1匁 ブローム鉄 半匁 タラカン

トゴム膠 適宜

右為 30丸 一日三回 5粒宛

四八、鉛糖 2グレイン タンニー子 1匁 阿片

末 4グレイン ヘネチアエキス コロンボ

末 各適宜

右為 30丸 一日三回 2粒宛

四九、鉛糖 2グレイン 阿片末 1グレイン

ンニー子 半匁 タラカントゴム膠 各適宜

右為 30丸 三回 5粒宛

五十、硝酸銀 1グレイン半 阿片末 3グレイン

タラカントゴム膠 適宜

右為 30丸 三回 5粒宛

五一、硝酸銀 3グレイン オピユム末 3グレイン

タラカントゴム末 蒸留水 各適宜

右為 36丸 朝昼夕 4粒宛

五二、硝酸銀 3グレイン 阿片末 3グレイン

タラカントゴム膠 各適宜

五三、硝酸銀 2グレイン 阿片末 4グレイン

ラカントゴム膠 適宜

右為 40丸 三回 3粒宛

五四、硝酸銀 6グレイン 百留バルサム 1匁 甘

草末 適宜

右為 60丸 一日三回 3粒宛(膀胱カタ

ル)

五五、砒石酸 1グレイン キニー子 1匁 タラモ

ニユムエキス 8グレイン ロベリアインフ

ラタ末 幾那皮エキス 各適宜

右為 60丸 三回 5粒宛

五六、 実多利須葉 10グレイン キニー子 半羹

コロンボ末 幾那皮エキス 各適宜

右為 30丸 三回 5粒宛

五七、 ジキタリス末 1スクルプル ミュリアスフェ

リアンモニアカーレ 1羹 シュリアスキ

ニー子 1羹 幾那皮エキス 適宜 タラカ

ントゴム膠

右為 60丸 一日三次 5粒宛

五八、 結晶石炭酸 10グレイン 阿片末 10グレ

イン シュシラホヒュシタラカント 適宜

右為 30丸 日々三回 3粒宛

五九、 結晶石炭酸 6グレイン 阿片末 6グレイン

タラカントゴム膠 適宜

右為 30丸 三時 5粒宛

六十、 結晶石炭酸 4グレイン 阿片末 30グレ

ン タラカントゴム膠 適宜

六一、 ホスファスカルシス 1羹 ホスファスフェ

リー 1羹 甘草末 2羹

右為 16包 一日四回 1包宛

六二、 ベルラドンナエキス 2グレイン アロエ 半

羹 セープ 大黃末 各適宜

右為 30丸 一日 5粒宛

六三、 幾那皮エキス 1羹 コロンボ末 適宜

右為 60丸 三回 5粒宛

六四、 阿片 10グレイン タラカントゴム膠 適宜

右為 20丸 毎四時 1粒宛 一日4乃至6

丸 右為 30丸 一日 7粒宛

六五、 阿片末 6グレイン ヘネチアテレピン 6グ

レイン乃至12グレイン タラカントゴム膠

適宜

右為 30丸 一日三回 5粒宛

六六、 ヘネチアーンセテレピンテン 1スクルプル

タラハカントゴム末 ヘンチアナエキス 各

適宜

右為 30丸 一日三回 2粒宛

六七、 ヘコチアテレピンテン 15グレイン 阿片末

6グレイン タラカントゴム膠 適宜

右為 30丸 一日三回 5粒宛

六八、 サックバルサム

右一日四回 5粒宛

右為す 30丸 三回 3粒宛

六九. ケレヲソウト 2滴 ホロラルヒドダル 1 匁

甘草エキス 適宜

右為 30丸 毎時 2粒

七十. カスロリュウム 1 匁 阿魏 半匁 ヘンチア

ナエキス 適宜

右為 60丸 毎時 5粒宛

七一. アブセンチエキス ヘレニーエキス ヘンチ

アナエキス 各1スクルプル ホミカエキス

4 グレイン コロンボ末 適宜

右為 60丸 一日三回 5粒宛

散 劑

一. 甘汞 6 グレイン 金硫黄 4 グレイン ヤ

ラツパ末 6 グレイン 白糖 1 匁

右12包となし毎時1包宛 三才児グループに

用ひる法なり

二. 甘汞 6 グレイン モスキュス 4 グレイン

白糖 1 匁

右6包となし 毎時1包宛

三. 甘汞 3 グレイン 白糖 1 匁

右為 6包 朝夕1包宛

四. 甘汞 5 グレイン 糖 適宜

右為 1包 頓服

五. 甘汞 4 匁 阿片末 4 グレイン ゴム末

1 匁

右為 16包 毎食后 1包宛

六. 甘汞 金硫黄 ヒヨスエキス 各4 グレイン

甘草エキス 1 匁

右為 12包 毎2時 1包宛

七. 甘汞 2 グレイン 阿片末 2 グレイン ビ

スミット 1 匁 糖 1 匁

右為 12包 一日六回 1包宛

八. 甘汞 6 グレイン シシネヤラツパ 6 グ

レイン 硝石 1 匁 金硫黄 6 グレイン

糖 1 匁

右為 8包 毎二時 1包宛

九. 甘汞 4 グレイン ヤーラツパ 16 グレイ

ン コリンボ末 1 匁

右為 16包 一日四回 1包宛

十. 甘汞 ヤーラツパ 各24 グレイン マグネ

シア 1スクルプル 乳糖 1 匁

右為 12包 一日三回 1包宛

- 十一、甘汞 4グレイン 金硫黄 4グレイン 吐酒
石 2グレイン 糖 1 匁
右為 8包 毎二時 1包宛
- 十二、甘汞 12グレイン ヤーラパハルス 12オ
ンス 糖 1 匁
右為 6包 毎二時 1包宛
- 十三、甘汞6グレイン ニトリウム1 匁 ジキタリス
末 18グレイン 糖 1 匁
為 12包 毎時 1包宛
- 十四、甘汞 ヤーラツパ 各8グレイン 糖 半 匁
右為 4包 一日4回 1包宛
- 十五、乳酸鉄 2 匁 コロンボ末 半 匁 白糖 半 匁
右 12包となし 一日四回 1包宛
- 十六、乳酸鉄 1 匁 硫酸キニー子 12グレイン
甘草末 1 匁
右為 12包 毎時 1包宛
- 一七、乳酸鉄 1 匁 重炭酸曹達 半 匁
右為 16包 一日四回 1包宛
- 十八、乳酸鉄 半 匁 キニー子 12グレイン 甘草
末 1 匁
右為 6包 毎二時 1包宛
- 十九、乳酸鉄 1 匁 カストリーニウム 20グレイ
ン 纈草酸亜鉛 24グレイン 糖 1 匁
右為 12包 毎二時四回 1包宛
- 二十、乳酸鉄 1 匁 糖 1 匁
右為 12包 一日三回 1包宛
- 二一、乳酸鉄 1 匁 吐酒石 2グレイン 甘草末
1 匁
右為 12包 一日四回 1包宛
- 二二、重炭酸曹達 4 匁 マグネシア 2 匁 白糖2
匁 アンニース油 8滴
右為 16包 4回1包宛 あるいはアロエ半
匁を加える
- 二三、重炭酸曹達 4 匁 実菱多利斯末 1スケルプ
ル マグネシア 2 匁 ホミカエキス 3グ
レイン
右為 12包 一日4回 1包あて
- 二四、硫酸キニー子 1スケルプル 重炭酸曹達 4
匁 阿片末 2グレイン アラビアゴム1 匁
右為 12包 一日3回 1包あて
- 二五、ホムアセヘチダ 半 匁 重炭酸曹達 4 匁 マ
グネシア 2 匁 白糖 2 匁 ア子ース油

8滴

右為 16包

二六、重碳酸曹達 4 匁 ヘンケル油 6 滴 大黃末

1 匁 コロンボ末 1 匁

右為 12包 一日三回 1包宛

二七、阿片末 2 グレイン 重碳酸曹達 2 匁

マグネシア 2 スクルプル 糖 2 匁

右為 20包 毎時1食宛与え吐きを止めるに
至るべし。

二八、モルヒネ 2 グレイン 纈草酸亜鉛 12 グレ

イン 糖 1 匁

右為 6包 一日二乃至三回 1包宛

二九、重碳酸曹達 4 匁 ペラドンナエキス 2 グレ

イン コロンボ末 1 匁

右為 12包 一日四回 1包宛

三十、重碳酸曹達 4 匁 モルヒネ 半グレイン 金

硫黄 4 グレイン コロンボ末 1 匁

右為 12包 一日四回 1包宛

三一、重碳酸曹達 半オンス ホミカエキス 8 グレ

イン コロンボ末 2 匁

右為 36包 一日四回 1包宛

三二、ペプシ子 1 匁 薄荷油 6 滴 オクリカン

クリ 1 匁 重碳酸曹達 1 匁 マグネシア

半匁

右為 12包 一日三回 1包宛

三三、硝酸ビスミット 1 匁 コロンボ末 1 匁

マグネシアアールバ ア子ス油 6 滴 薄荷

油 6 滴

三四、ビスミット 1 匁 亜鉛花 6 グレイン ア子

ス油 3 滴 オクリカンキリ 1 匁 モ

ルヒネ 1 グレイン

右為 16包 一日四回 1包宛

三五、ビスミット 1 匁 オクリカンキリ 1 匁 薄

荷油 6 滴 亜鉛花 12 グレイン マグネ

シア 半匁 糖 1 匁

右為 12包 一日四回 1包宛

三六、硫酸キニー子 16 グレイン ラクタスフェ

リー 半匁 安息香酸 8 グレイン 甘草

末 適宜

右為 4包 一日四回 1包あて

三七、キニー子12 グレイン 吐酒石1 グレイン 金

硫黄 4 グレイン 硝石1 匁

右為 12包 毎時半或 1包宛

三八、硫酸規尼捏 8グレイン 硫酸鉄 結晶を除い

たもの 4グレイン 或いは6グレイン

右為 2包 朝夕 1包宛

三九、阿片末 3グレイン コム末 1匁

右為 9包 一日五回 1包宛

四十、阿片 4グレイン アロエン 12グレイン

糖 1匁

右為 12包 一日三回 1包宛

四一、ヘンケル油 6滴 阿片末 1グレイン マグ

ネシア 1スクルプル

右為 6包 毎半時 1包宛 胶痛止まるに至

四二、阿片末 2グレイン半 アロエ 15グレイン

スタラモニユムエキス 5グレイン 砒石酸

半グレイン ロベリアインフラタ末 1匁

右為 15包毎三回 1包宛

四三、阿片末 6グレイン テラヤポニカ 1匁 タ

ンニ子半匁ゴム末 1匁

右為 12包 一日四回 1包宛

四四、ミユリアスアンモニア 1匁 ドーフルス散

半匁 甘草末 1匁

右為 9包 一日三回 1包宛

四五、シトラスフェリーアンモニユム 1匁

ヒポスファスカルシユス 1匁 甘草末 1

匁 フェラトリヒリジード幾 40滴

右為 16包 一日四回 1包宛

四六、ホロールアンモニ 1匁 金硫黄 6グレイ

ン モルヒネ 1グレイン 甘草末 1匁

右為 12包 毎時1包宛

四七、ハスファスフェリ シトリコアンモニアカーレ

12グレイン

右為 3包 毎食前に糖水に和し用ふ

四八、硫黄花 酒石英 大黃末 各1匁

右為 9包 一日三回 1包宛

四九、金硫黄 12グレイン 滷砂 1匁半 吐酒石

6グレイン 砒石酸 半グレイン

ロベリアインフラタ末 1匁半

右為 24包 一日四回 1包宛

五十、サントニー子 12グレイン 糖1匁

為 6包 毎二時 1包宛

五一、サントニー子 24グレイン 纈草油 12滴

大黃末 1匁 マグネシア 半匁

右為 12包 毎時 1包宛

五二、カストリウム 12グレイン モスキュス

28グレイン カンフル 12グレイン 纈

草酸亜鉛 12グレイン モルヒネ 1グレ

イン ソイクル 1匁

右為 12包 毎時 1包宛

五三、カストリウム 12グレイン 纈草酸亜鉛

12グレイン 酒精莨菪エキス 6グレイン

纈草末 半匁

右為 6包 一日三回 1包宛

五四、ホスファスカルシス 1匁 ホスファスフェリ

1匁 甘草末 2匁

右為 16包 四回 1包宛

五五、青酸亜鉛 1グレイン乃至2グレイン 纈草末

1或いは1匁半

右為 4—6包 一日四回あるいは六回 1包

宛

五六、亜砒酸 莨菪エキス ロベリア末 ストラモテ

エキス オピウム 纈草末 幾那エキス 阿

魏(量の記載ナシ)重曹 2.0 コデイン0.

1 タカジアスゼ 0.5

右為 三方 一日三回 1包宛

五七、フチソール 0.5 重曹 3.0 ピラミドン

0.5

右為 3包 1日量 (チュベル)

五八、デルマトール 1 タンナピン 1 硝石

1 重曹 2 ジアスターゼ 0.5

右為 一日三次 腸結核

五九、純ピラミドン 窒扶斯に効あり

用法 三時間毎之0.15或いは二時間毎0.

1宛 Bayer製Pyramidon

アミノピリン

水 劑

一、重炭酸曹達 1匁 橙皮水 6オンス パル

ダーナエキス 半匁

右為 毎時1匕

消化不良、バルダナ = extracto de Bardana

吐酒石 1オンス 或は吐根酒

右為 毎十分 1卵匕 吐を得るを度とす

吐酒石 = 酒石酸アンチモン、吐劑

三、ヘニウムアマリウム 4オンス

- 右一日三回 1食匕
- ヘニユムアマリユム 不詳
- アセタスシケレー 2 羹 タツタラスカリ
- キユス半羹 亜括 4 オンス 橙皮舎利別
- 2 オンス
- 右為 一日 二分服
- タツタラスカリキユス 酒石酸カリウム
- 亜括 〓 アクア 〓 水
- 沃鉄ストロップ 2 羹
- 右為 一日四回水に和し用
- 沃化鉄を糖蜜に加えたシロツプ
- ソレシオヘモーサ 8 オンス ラウダニユム
- 1 2 滴
- 右為 毎時 1 食匕
- ソレシオヘモーサ 〓 solutio gamnose アラビ
- アゴム半オンスと水 8 オンスの混合物、緩和剤
- ラウダニユム 〓 阿片チンキ
- 塩酸鉄溶液 半オンス或いは三羹 亜括 半
- オンス
- 右為 一日三回 30 滴宛
- 沃度加里 1 羹 亜括 1 オンス
- 右為 三回 1 卵匕宛
- モルヒネ 半グレイン 鯨砂加アネース精
- 1 羹 ソレシオヘモーサ 7 オンス 橙皮舎
- 利別 1 オンス
- 右為 毎時 1 食匕 鎮痛剤?
- 重炭酸曹達 4 羹 ヘレニーエキス 半羹
- 橙皮水 8 オンス
- 右為 毎時 1 食匕 或二時 1 食匕
- 沃剝 1 羹半 純沃陳 1 グレイン半 蒸留水
- 1 オンス半
- 右為 一日三回 30 滴宛
- リチ子油 半オンス
- 右為 頓服 リチ子油 〓 ヒマシ油、下剤
- 實芰多丁幾 三羹 硫酸規尼捏 半羹 乳酸
- 鉄 1 羹 喇宇達 1 2 滴 ソレシヲヘモー
- サ 1 2 オンス
- 右為 毎時 1 食匕 消化器 止痛剤
- 稀硫酸 2 羹 水 8 オンス 糖 2 羹 飲料
- 吐酒石 半オンス 老利児水 半オンス ソレ
- シオヘモーサ 8 オンス
- 右為 毎時 1 匕 吐出剤

十六、ヒドラルホロラル 15グレイン 糖スト

ロープ 半オンス 頓服

ヒドラルホロラル||塩酸、胃薬

十七、老利児水 半オンス 吐酒石酒 半オンス、ヒ

ニユムアセラニ 2オンス 英蘭苔煎 1オ

ンス

右為 毎時1ヒ

十八、稀硫酸 2 羹 エルホチ子 半羹 モルヒネ

半羹 ラウリール水 半オンス ヒシヲヘ

モーサ 8オンス

十九、塩酸鉄液 半オンス 純燐酸 半オンス 単舎

利別 4オンス

右為 毎二時 1卵ヒ

二十、エルホチ子 半羹 桂皮丁幾 1オンス ソ

レシヲヘモーサ 7オンス モルヒネ 1グ

レイン

右為 毎時二時 1ヒ

二十一、沃剝 1 羹 純沃陳 1グレイン 亜括 1オ

ンス

右為 一日三回 10滴宛 或三回 30滴宛

二十二、酒石英 1オンス 橙皮水 8オンス 糖 2

羹

右為 毎時1ヒ

二十三、沃鉄ストロップ 半オンス 単舎利別 1オ

ス半

二十四、右為 一日三回 1卵ヒ

ソレシオヘモーサ 8オンス ラウリール水 半

オンス ボラキス 半羹 モルヒネ 半グレ

イン

二十五、右為 毎時1ヒ 沃鉄ストロップ 2 羹 単舎利別 6 羹

右為 三回 1 羹宛

二十六、ミューアスフェリリキユイジウム 1オンス

右為 一日三回 30滴宛 水に和し用ゆ

二十七、ソレシオヘモーサ 8オンス 硝酸加里 半羹

右為 毎時1ヒ

二十八、ブロムユームカリ半羹 水 3オンス

右為 一日三回 2ヒ

二十九、沃剝 1 羹半 水 1オンス

右為 一日三回 30滴宛

三十、バルサムコッパイ 2オンス

右朝夕半オンス宛 或毎回嚥下し当たり6滴の
ラウタ加入

三一、 ソレシオヘモーサ 8号 ニトリウム 1匁

右為 毎時 1ヒ

三二、 リコールホレリー 半匁

右為一日 3滴宛 或三回1滴

三三、 ロイワイン 3オンス

右為 一日三回 1オンス宛 糖を和し用い

る

三四、 沃剝 1匁半 エルホチー子 1匁 水 1オ

ンス

右為 一日三回 1匁宛

三五、 酒石酸 半匁 糖 2匁 水 8オンス

右為 毎時1ヒ 毎回重炭酸曹達 10グレイ

ンを加える

三六、 ホロラルヒダニル 1匁 糖舎利別 4オンス

右為 毎臨床1ヒ宛服メ眠りに至る

三七、 硝石 2匁 ベルラドンナエキス 2グレイ

コム末 1匁 水10オンス

右為 毎時1ヒ

三八、 硫酸銅 1スケルプル 吐根酒 1オンス 単

舎利別 1オンス

右為 毎10分時 1匁宛て 湯下薬 吐劑

三九、 ブロマイドホロラム 2匁 水2オンス 橙皮

皮ストロブ 2オンス

右為 毎半時 1ヒ宛 眠を得るに至る 睡眠

劑

四十、 酒石英 半匁 ゴム末 1匁 亜括 6オンス

糖 半オンス

右為 毎時半オンス宛

酒石英||酒石酸水素加里

四一、 ソレシオヘモーサ 4オンス キニー子 半匁

吐根酒 半オンス ヒヨスエキス 6グレイ

ン

右為 毎二時 1ヒ

四二、 ブROOMホロラル 2匁

右為 毎時1匁宛

四三、 カストリウム丁幾 レベリー氏動物油 各

1匁 阿魏丁幾 半オンス ラクチャーリア

ンフリーリウム 半匁 ソレシオヘモーサ

6オンス

右為 毎二時 1ヒ

四四、茴香水 6オンス 重炭酸曹達 半匁 ペプシ

子 1匁 白葡萄酒に溶解する。

右為 毎二時1ヒ 消化薬

四五、ソレシオヘモーサ 8オンス ビカルボナス

ソーダ 半匁 ベラドンナエキス 1グレイン

ジキタリース丁幾 半匁乃至二匁半

右為 毎二時1ヒ 胃炎薬

四六、純塩酸 4滴 ソレシオヘモーサ 4オンス

糖 1匁

右為 毎時半オンス宛 胃炎薬

四七、ペプシ子 1匁 重炭酸曹達 1匁 レーンワ

イン 1オンス

右為 毎食時2匁宛 胃炎薬

四八、ソレシオヘモーサ 6オンス 硝酸銀 2グレ

イン ラウタ 8滴

右為 毎時半オンス宛 六才(小児用)

四九、ソレシオヘモーサ 6オンス 強燐酸 30滴

糖2匁

右為 毎時半オンス宛

五〇、硝石 1匁 ソレシオヘモーサ 9オンス

老利昆水 半オンス 吐酒石酒 半オンス

ヒヨスエキス 10グレイン 実斐多利斯丁

幾 2匁

右為 毎時1食ヒ

五一、ソレシオヘモーサ 8オンス ボラキス 1匁

ラウダ 12滴

右為 毎二時1ヒ

五二、塩酸鉄液 1匁 单舍利別 2オンス 水 4

オンス

右為 毎二時1ヒ (五才児用)

五三、曹達水 8オンス 老利昆水 半オンス ベラ

ドンナエキス 2グレイン

右為 毎時一食ヒ

五四、ホロラルヒダラート 1匁 ペプシ子 1匁

オラニーストロープ 2オンス

右為 毎二時1オンス宛

ホロラルヒダラートII 塩酸

五五、レアコーサ丁幾 1オンス 苦味酒 2オンス

コロンボ浸 3オンス 薄荷油 6滴 ペプシ

子 2匁

五六、右為 毎食前 半食ヒ

ソレシオヘモーサ 8オンス 強塩酸 8滴

酒製萇蓉エキス

右為 毎時1ヒ

五七、 サントニー子 12グレイン リチ子油 1オ
ンス

右為 毎時一棧 下痢を得るに至る 虫下し薬

五八、 オレナムフォスファウム 2棧 アレーフ油
2棧

右為 一日三回 2滴宛より12滴に至

五九、 卵白 6個 水 6オンス 糖 1棧

右為 1日の飲料とす

六〇、 硝酸曹達 1棧 甘扁桃油エムルシー 6オン
ス テバйка丁幾 1スクルプル

右為 毎時1ヒ宛

甘扁桃油エムルシースイートアーモンドの種
子よりの油成分の分散液(エマルジョン)乳剤、

包摂剤として使用、オレイン酸を多く含む

六一、 酒石英 1棧 ソレシオヘモーサ 8オンス

右為 毎時1ヒ

六二、 実芝多利斯丁幾 6棧 刺字達 1棧

右為 一日四回 10滴宛

六三、 茴香水 6オンス 酒製萇蓉エキス 2グレイ

ン

右為 毎二時半オンス宛

六四、 稀硫酸 1棧 水 8オンス 甘硝石精 2棧
塩酸鉄液 半棧 ラウダ 3滴

身児 毎時1ヒ

六五、 肝油 2オンス 沃鉄肝油 1オンス
右為 朝夕半オンス宛

六六、 稀硫酸 半オンス 塩酸鉄 半オンス

右為 一日三回 40滴宛

六七、 稀硫酸 2棧 塩酸鉄液 1棧 亜括 4オン
ス

右為 毎二時半オンス宛

六八、 卵白 4箇 テバйка丁幾 半棧 重炭酸曹達

1棧

右為 毎時1ヒ

六九、 ペプシ子 1棧 蛋白 4箇 テバйка丁幾

1スクルプル半 硝石 1スクルプル 水

6オンス

右為 毎時1ヒ

七〇、 ヒポシュールポス曹達 1棧 ソレシオヘモー
サ 8オンス

右為 毎時1ヒ

七一、セネハストローブ 1オンス ピリチャスアン

モニアアニサーセス 半匁

右為 毎半時二匁宛

七二、ヘンケル油 20滴 ロベリアインフラタ丁幾

1オンス 老利児水 吐酒石酒 各半オンス

ラウダニューム 60滴

右為 毎10ミユート 60滴宛 静□に至り

后 服用を止む

七三、ブロマイドホロラル 半匁 橙皮舍利別 1オ

ンス ヘンケル水 3オンス

右為 三回1食ヒ

七四、実菱多利斯丁幾 半オンス チンキチュラヘラ

トリヒリジ 2匁 モルヒ子 2グレイン

ロリコン水 適量

右為一日三回 20滴宛 水中に滴し用ゆ

七五、爹児水 8オンス 莫吉 4分グレインの1

老利児水 半オンス

右為 毎時1ヒ

七六、ミチウスチュララレーラーサ 10オンス 酒

製蓑蓉エキス 4グレイン 老利児水 半オ

ンス

右為毎時 1ヒ

七七、卵白 6箇 ペプシ子 1匁 桂皮舍利別

1オンス 老利児水 半オンス 亜括 3オ

ンス 毎時1オンス宛

七八、塩酸鉄液 1匁 肝油 1オンス

右為 一日三回 半匁宛

七九、塩酸加里 4匁 稀塩酸 1匁 水 8オンス

右為 毎時1ヒ

八〇、鶏卵 12箇 乳汁 4オンス 水 4オンス

右為 一日四回 5オンス宛

八一、酒石酸鉄加里 1匁 酒石酸加里 2匁 海葱

舍利別 1オンス 水 3オンス

右為 毎二時 半オンス宛

八二、アトロヒ子 1グレイン 亜括 1匁

右為 毎夜3滴乃至4滴宛

八三、コンヤツキ 1オンス 亜括 3オンス 糖

2匁

右為 一日四回 1オンス宛

八四、滷砂 半匁 塩酸鉄液 半匁 亜括 6オンス

右為 毎時半オンス宛

八五、酒石酸鉄加里 1 匁 水 1 オンス

右為 一日三回 3 匁宛

八六、昇汞 1/10 グレイン 水 8 オンス

右為 毎二時 1 食ヒ

八七、セダン液 4、莫吉 6、亜括 100

右為 一日三回分服 月経痛

八八、精製セラチン 10 苦丁 1、莫吉 8 亜括 100

右為 服用時湯煎に掛け溶解して服用

莫吉 II ハツカ水

煎 劑

一、赤幾那皮 1 オンス 水煎 8 オンス キ

ニ一子 12 グレイン 稀硫酸 12 滴 橙

皮舎利別 1 オンス

右為 毎時 1 食ヒ

二、エースランスモス 1 オンス 水煎 8 オン

ス ラウリール水 半オンス 白糖 4 匁

ミアス モルヒ子 四分グレインの三

右為 毎二時 1 食ヒ

三、遠志 1 匁 煎出 6 オンス キニ一子

12 グレイン 吐酒石酒 半匁

右為 毎時 1 食ヒ

四、キナ皮煎 10 オンス 稀硫酸 半オンス

エルホチ一子 1 匁 ヘラトリヒリジ一丁幾

半匁 モルヒ子 1 グレイン

右為 毎時 1 食ヒ

五、纈草浸 8 オンス 民埵里精 1 オンス 甘

硝石精 2 匁 橙花ストロフ 1 オンス

右為 毎時 1 食ヒ宛

六、サツサパラ根 1 オンス 水 24 オンス

を以て 12 オンスに煎

右為 1 日に分服

七、亜麻仁煎 12 オンス ラウダ 12 滴 ホ

ロラスカリキユス 1 匁

右為 毎時 1 食ヒ

八、赤キナ皮煎 12 オンス モルヒ子 16 分

グレインの 1

右為 毎時 1 食ヒ

九、キナ皮煎 6 オンス 纈草浸 2 オンス 苦

味酒 1 オンス

右為 毎時 1 食ヒ

十、ブロシュームホロラル 2 匁 橙花ストロー

プ 1 オンス アルニカ浸 5 オンス

右為 一日四回 1 ヒ

十一、幾那浸 8 オンス 硫酸曹達 半オンス

右為 毎時 1 ヒ

十二、キニー子 半匁 硝石 半匁 糖 1 オンス

甘草浸 4 オンス 吐酒石酒 半オンス

右為 毎二時 2 匁宛

十三、亜麻仁煎 1 2 オンス 酒石英 2 匁 ラウタ

1 2 滴

右為 毎時 1 ヒ宛

十四、吐根 アルニカ花 セニハ根 各 1 匁 浸出

8 オンス 放冷后 アムモニアアニサーチュ

スー 1 匁を加える

右為 毎時 1 ヒ

十五、ブロマイドホロラル 2 匁 纈草浸 4 オンス

糖 半オンス

右為 卧前毎 1 時或いは半時に 1 ヒを与え眠を

得るにいたる 催眠劑

十六、アルニカ花 半オンス 大黄根 1 匁 浸出

8 オンス ブロームカリ 2 匁 糖半オンス

右為 毎時 1 ヒ

十七、サーレツプ 半匁 熱湯 4 オンス 糖 2 匁 ス

ピリチユスニトルドシス 2 匁 ア子ース油

2 滴 アムモニアリキユダ 2 滴

右為 毎時 1 ヒ

スピリチユスニトルドシス 2 硝石精?

十八、幾那皮煎 2 オンス 英蘭苔煎 2 オンス

纈草浸 2 オンス

右為 毎 2 時 1 ヒ

十九、規尼捏 6 グレイン ゴム末 半匁 ヒヨスエ

キス 4 グレイン 老利児水 2 匁 重炭酸

曹達 半匁 甘草浸 6 オンス

右為 毎時 1 ヒ宛

二十、アルニカ根 1 匁 吐根半匁 浸出 8 オン

ス 老利児水 半オンス 吐酒石酒 半オンス

ホラルヒダラート 1 匁

右為 毎時 1 ヒ

二一、モロンボ根煎 依蘭苔煎 各 3 オンス 苦酒 2

オンス

右為 毎時 1 ヒ

二二、サーレツプ煎 8 オンス タンニー子 4 グレ

- イン ラウタアエキス 半匁 ラウダ 12
滴
- 二三、 きな皮煎 8オンス キニー子 12グレイン
純塩酸 12滴
右為 毎時1ヒ 胃炎
- 二四、 玉林度煎 8オンス 硝酸加里 1匁
右為 毎時1ヒ
- 二五、 サルビア浸 8オンス
右為 一日四回 1オンス宛
- 二六、 健知亜那浸 6オンス 重炭酸曹達 1匁
右為 毎時1ヒ 健胃劑
- 二七、 強烈シットマニー煎 サルサ根 12オンス
右水 48オンスを以て1昼夜浸出后
明礬糖 1オンス半 甘汞 半オンス 朱砂 半匁
右の品を加え、文火を以て煎し 16オンスに
居たり、此煎熱終わるときにおいてさらに 幾
那3オンス 茴香半オンス 甘草根 1オン
ス半 以上の品を加え放冷し后ち 更に之を
濾過するべし
- 二八、 弱シットマニー煎
サルサ根6オンス、之に強烈煮口を加え 水
48オンスを以て1昼夜間泡だしし 后 橙皮
桂皮 益智 甘草 各3オンスを加え煮して、
16オンスにいたし放冷后之を濾過す
- 二九、 キナ皮煎 8オンス 硝石 1匁 ジキタ丁幾
2匁
右為 毎時1ヒ
- 三十、 アルニカ浸 2オンス 鹼砂ア子1ス精 1ス
クルプル
右為 毎二時半オンス宛
- 三二、 アルニカ浸 2オンス 実菱多利斯丁幾 1ス
クルプル 硝石 1スクルプス ゴム末 1
匁
右為 毎時 2匁宛
- 三三、 スットマニー煎 8オンス
右為 毎時1ヒ
- 三三、 デコクチュムアルベンセーデンハシー 8オン
ス
右為 毎時1ヒ
デコクチュムアルベンセーデンハシー 不詳

三四、鹿角屑 半オンス 煎出8オンス 蒸併心 半

オンス 右浸出すること1時間 濾過後テバ
イカ丁幾半匁を加える

右為 毎時1匕

三五、キナ皮煎 8オンス ホーレル水 3滴 ルウ

ダ12滴 吐酒石酒 半オンス ヒヨスエキ

ス 16グレイン

右為 毎時1匕

三六、実芫多利斯葉 1スクルプル 浸出 8オンス

酢酸加里 1匁 吐根酒 2匁

右為 毎時1匕 鉄飴煎

三七、桂皮末 1・5(23グレイン) 小茴香末 2・

0(半匁) 硼砂 2・0 淨水 200(6オ

ンス)

右為 温浸5日斗にして濾過しその溶液に枸櫞

酸鉄10・0(1オンス半)を加え 溶解する

を得て後 水飴 800(二百目)に一集し重

湯煎にて混和溶解せしむべし

用法 一日1オンスより1オンス半 水に和

シ服用せしむ

注射劑

一、へ子ールシユール 2滴 蒸留水 100滴

右「アンタラクシス」周囲の四方より皮下注射す
ること一日一回

へ子ールシユール||石炭酸? アンタラク

ス?

二、エルホチー子飽和液

右為 一日二回皮下注射

エルホチー子||*ergotoxin* 麦角アルカロイド 止

血作用、血液凝固促進

三、硫酸キニーネ 半匁 ミュリアスモルヒネ

1グレイン

右為 皮下注射器に五回入れるべき蒸留水を

入れて能く振盪して後純硝酸を入れて溶解す

るを度とする。一日一回皮下注射

四、ストレキニー子 1グレイン 水 1匁

右為 1滴宛 皮下注射

五、アトロヒ子 1グレイン 亜括 2匁

右為 二滴より始め漸々増加し一日八滴を皮下

注射するに至る

六、アシジウムタンニクム 1匁 ヒニユムリ

ビリー4オンス ヒシヲサルヒア 2オンス

右為 鼻内注入すること 一日二回

アシジユウムタンニクムニタンニン酸、

ヒニユムリビリーニ？ ヒシヲサルヒアニ？

七、 沃陳丁幾 30滴 アルコホル 半オンス

水 2オンス

右為 一日二回 鼻孔内注入

八、 純沃陳 5グレイン 沃剝 半匁 水 24

オンス

右為 一日三回 鼻ツーシー 8オンス宛

九、 礮砂 半オンス 亜括 24オンス

右為 一日三回 鼻ツーシー

礮砂ニ塩化アンモニウム、ツーシー zuigen

吸入

吸入劑 インハラシー inhalatic

一、 希釈テール水テール 1オンス 水 24オ

ンス瓶中に入れ振盪する事半時間にして、上面の透明液を用いる。

右為 三回 毎回4オンス宛

二、 アセジニムタンニキユム 1匁 水 2オ

ス

右為 三回2オンス宛 インハラシー

三、 カルキワートル 右 インハラシー

四、 硝酸カリ 1オンス半 亜括 2スケルプル

右 インハラシー

五、 塩酸アンモニア 1匁 水 8オンス

右 インハラシー

六、 テール水 12オンス モルヒネ 2グレ

イン

右為 蒸氣吸入法

七、 ケレオソート 3、メントール 3、アル

コール 10 エーテル 10 右脱脂綿花

に付け鼻引せしむ(肺壞症)

点耳劑

一、 ラウタニユム 洗耳内点入

二、 ラウタニユム 1匁 テレピンチーナ油

1匁 ヲレーフ油 2匁

右為 一日三回 耳内点入

三、 ホロール水

右為 一日三回 耳部洗滌

四、吐石石 1グレイン フェナチアテレピン

チーン 1 羹 脂肪 3 羹

右為 耳殻後部に塗る事

五、加密列浸 8 オンス

右為 一日三回 尿道注射

タンニー子 半羹 亜括 4 オンス

右為 三回半オンス宛 尿道注射

タンニー子 没食子より抽出したタンニン、尿道淋には注入する

道淋には注入する

タンニー子 1 羹 ヘリセリ子 1 オンス

右為 一日二回 1 オンス宛 尿道注射

解皮煎 6 オンス アロエン 1 スクルプル

右為 一日三回 尿道注射

解皮 〓 カシワの樹皮、ケルセチンが含まれる。

丹礬 5 グレイン 皓礬 10 グレイン 赤

葡萄酒 2 オンス

右為 一日三回 尿道注射

丹礬 〓 硫酸銅、皓礬 〓 明礬、硫酸カリ・硫酸ア

ルミニウム の複塩

プロタルコール 半乃至 1% 水 尿道注入

淋病菌の除菌、プロタルコール 〓 protagol,

プロテイン銀、硝酸銀とタンパク質の反応物

一、硫酸亜鉛 24 グレイン 亜鉛花 半羹 カ

ルボナスピュムピー 半羹 赤葡萄酒 1 2

オンス

右為 尿道注射

亜鉛花 〓 酸化亜鉛、カルボナスピュムピー 〓 炭

酸鉛? 尿道への細菌感染症用

二、硫酸亜鉛 10 グレイン オキシジウムシン

シ 10 グレイン 硫酸銅 2 グレイン 赤

葡萄酒 6 オンス

右為 三回 尿道注射

三、硫酸亜鉛 1 スクルプル ラウダニウム 1

スクルプル 亜括 1 2 オンス

右為 一日三回尿道注射

四、硫酸亜鉛 1 スクルプル 亜鉛花 半羹 水

6 オンス 赤葡萄酒 6 オンス

右為 一日三回 尿道注射

腔内注射

一、カミレッツ浸 12オンス 硫酸亜鉛 30グ

レイン

右為 腔内注射する事 一日三回、但し毎回二

オンス宛

二、加密列浸

右為 一日三回三オンス宛 腔内注射

カミツレ||テルペンアルコール、リュウマチ、

疝痛、外用で注入、灌腸あり

三、アロエン 1匁 加密列浸 24オンス

右為 一日二回4オンス宛腔内注射

アロエン||峻下剤

四、硝酸銀 20グレイン 蒸留水 5オンス

五、硝酸銀 20グレイン 蒸留水 半オンス

右為 患部に注入

六、昇汞 五グレイン 老利児水 1オンス 皿

括 20オンス

右為 腔内及び肛門内注射

老利児水||月桂樹の精留液、尿器衰弱

七、純沃陳 6グレイン アルコホル 1オンス

水11オンス

右為 一日一乃至二回 腔内注射

八、懈皮煎 12オンス

右為 一日三回 膀胱内注入

九、懈皮煎 24オンス タンニー子 半匁

右為 一日三回 4オンス宛 直腸内注入

灌腸劑

一、ソレシヲヘモーサ 24オンス ラウダ

48滴

右為 一日三回 4オンス宛 灌腸

二、ソレシオヘモーサ 12オンス ラウダ 1

匁

右為 一日三回 2オンス宛 灌腸

三、ラタニアエキス 1匁 サレツプ末 1匁

宛研和シタル品 熱湯 10オンス ラウダ

半匁

右為 一日三回 2オンス宛 灌腸

四、旗那浸 8オンス 硫酸曹達 1オンス

ンケル油 20滴 ベラドンナエキス 2グ

レイン

右為 灌腸

五. 硝酸銀 5 グレン ラウタ 半匁 ゴム末

1 匁 留水 6 オンス

右為 三回 1 オンス宛 灌腸

六. ソレシオサーレップ 8 オンス タンニ—子

1 匁 ラウタ 1 匁

右為 一日四回 1 オンス宛長管ヲ以テ灌腸

七. ソレシオサーレップ 8 オンス 結晶石炭酸

8 グレイン ラウタ 1 匁

右為 四回 灌腸

八. 阿魏丁幾 半オンス ソレシオヘモ—サ 4

オンス

右為 一日二回 2 オンス宛灌腸

九. 硝酸銀 4 グレイン テバйкаチンキ 半オ

ンス 留水 6 オンス

右為 一日三回 2 オンス宛 灌腸

十. ヘ子チアテレピン 1 匁 ラウタ 半匁 阿

列布油 2 オンス

右為 一日三回 灌腸

十一. 硝酸銀 10 グレイン 蒸留水 2 オンス テ

バйка丁幾 30 滴

右為 一日二回 1 オンス宛 長管ヲ以テ灌

腸

十二. ベネチアテレピン油 1 匁 フレーフ油 2 オ

ンス テバйкаチンキ 1 匁

右為 毎回 半オンス宛 灌腸 但し一日三回

十三. 檳皮煎 24 オンス

右為 一日三回 4 オンス宛 灌腸

十四. 硫酸銅 5 グレイン 水 10 オンス

右為 一日三回 2 オンス宛 灌腸

浴 劑

一. コロイット浴

薄荷葉 2 握 加密列花 1 握

右為 一浴湯に供す、小児の散汗に効ある

二. 人工温泉浴

重曹 7.5 硫酸鉄 0.1 硫酸マグネシ

ウム 4.5 塩化カルシウム 3 食塩(灼

熱せしもの) 4

右為 五種を湯の稍暖まるたる時に投入す。

普通用風呂に要する水量は一石二斗内外即
二百十八リットルを用す

塗擦剤およびペルキター子剤および膏薬

- 一、ヘネールシユール 1 匁 或いは半匁 亜括
1 オンス
右為 撒糸に浸し患部に貼す (石炭酸 *fenol*
zaur) ?
- 二、ヘネールシユール 5 滴 亜括 百滴
右為 撒糸に浸し患部に貼る
- 三、強烈ホロールワートル 4 オンス (*phenol in*
water)
右為 撒糸に浸し患部に貼る
- 四、水銀軟膏 1 オンス 沃陳丁幾 2 匁 或
4 匁
右為 混合して患部に塗擦
- 五、水銀膏 半オンス 沃剝 半匁 沃陳 2 匁
レイン
右為 混和 一日二次 患部塗布
- 六、沃陳丁幾 半オンス
右為 患部に貼る
- 七、沃陳丁幾 2 匁 ヘリセリ子油 6 匁
右為 一日二回 患部塗布
- 八、沃剝 1 匁 純沃陳 3 グレイン ヘリセリ
子 2 オンス
右為 一日二回会陰部に塗布
- 九、沃度ホルム 5 乃至 10 グレイン アルコホ
ル 2 匁 ワートル 1 オンス
右為 三回患部に貼る
- 十、沃度ホルム 15 グレイン カルボナスカリ
キユス 半匁 水 2 オンス
右為 三回患部に貼す
- 十一、肝油 1 オンス 沃陳丁幾 2 匁
右為 一日三回患部に貼す
- 十二、ヨードホルム 50 分 コツヒー 25 分
エーテル 1 滴
右為 塗布
- 十三、ヘコチャテレピンチーン 1 匁
turpentine 或いは半オンス 脂肪 4 匁 あ
るいは 1 オンス
- 十四、ヲレーフ油 半グレイン テレピン油 半オン
ス カヤアーテ油 半オンス
右為 患部に塗布すること一日二回
- 十五、ホロホルム 1 オンス アムモニアリキュー

ダ半オンス テレピン油 半オンス ヲレーフ油 1オンス

右為 毎時患部に塗布 olive oil

十六、丁字油 半匁 ラウタ 1匁 アムモニアリ

キユータ 1匁 ヲレーフ油 1匁半 ホロー

ルホルム 2匁 テレピンテーン油 1匁

右為 一日三回疼痛部に塗布

十七、テレピン油 半オンス ホロールホルム 半オ

ンス アルカホル 半オンス ヲレーフ油 半オ

ンス

右為 一日三回 胶布 塗布

十八、ラウタニユム ヘリセリ子 ホロホルム テレ

ピンチーン油 各半オンス

右為 一日四回疼痛部に塗布

十九、テレピン油 1オンス オレーフ油 2オンス

右為 撒糸に浸し患部に貼る

二十、撒里矢爾酸 10、テレピン油 10、これ

を溶解して次のものを加える。沈降硫黄、テレ

ピン油 各40

右は腰痛、筋炎などに効あり

二十一、昇汞 10グレイン 亜括 半オンス

右為 一日三回患部に貼る

二十二、甘汞 1スクリプト 或いは半匁 脂肪 1オ

ンス

右為 頭部瘡上に塗擦

二十三、水銀膏 1オンス

右為 四肢に塗布

二十四、水銀膏 1オンス 莨菪エキス 10グレイン

右為 一日三回 患部に塗布

二十五、ホロールホルム 半オンス ヘリセリ子 半オ

ンス

右為 患部に塗布

二十六、ポッターズローフ 4オンス

右為 一日二回患部浴法とす

二十七、腐食加里 10グレイン 淨水 1オンス

右為 一日三次浴后布片に浸し疹上に貼る

二十八、ホロホルム 2匁 カヤアアテ油 2匁 ヲ

レーフ油 半オンス

右為 一日二回患部に塗布

二十九、スチラキス 半オンス 硫黄花 2匁 脂肪

半オンス

右為 一日二回入浴し石鹼にて洗滌し乾燥後

塗布

三〇、カミツレ煎 4オンス モルヒネ 2グレイン

右為 患部に貼る

三一、癩皮煎 24オンス

右為 布片に浸し患部に貼る

三二、カンフル丁幾 1オンス

右為 布片に浸し患部に貼る

三三、芫菁硬膏

右為 患部に貼る

三四、エレミーサルフ

右為 一日二回患部に貼る

三五、ヘリセリ子 半オンス ベルラドンナエキス
10グレイン

右為 毎回1幾をタンポンに浸し腔内挿入

三六、ベルラドンナエキス 1スクルプル 脂肪半
オンス

右為 一日二回患部塗布

三七、テール 1幾 酒精1オンス ヘリセリ子 3

幾 アンモニアリキユード 4滴 亜括 3オ
ンス

右為 患部に塗布

三八、ホロホルム 2幾 刺宇達 1幾 アンモニア

リキユード 半幾 ヘリセリ子 半オンス

右為 一日四回患部の塗布

三九、硝酸銀 1スクルプル 亜括 1幾

右為 患部 アーセーレン

四〇、酒石酸鉄加里 4% 4オンス

右為 一日三回傷面に捻糸に浸し

四一、硫酸亜鉛 5グレイン 硫酸鉄 5グレイン

水 1オンス

右為 患部に塗布

四二、硫酸銅 20グレイン 水1オンス

右為 一日三回陰部塗布

四三、シュルハスキュプリー 10グレイン ヘリセ
リ子 2幾

右為 一日三回咽喉ステリーセーレン

四四、イヒチヲール 0・15、カカオ酸 3

右為 □一球 腔座薬

四五、Eau de cologne

香水 4オンス 別刺敦那^{ペラドレナ} 半オンス
右為 混和一日三回塗擦 (手掌多汗)

考察

ホルトルマン氏方集(1)をスロイス氏方聚(2、3)、ローレッツ氏方集(4、5)と比較すると、多くの特徴が目につく。その幾つかを上げると、無機化合物の使用頻度が増加し、また無機塩類の種類も増加している。例えば水剤では、重炭酸曹達、沃鉄(沃化鉄)、塩酸鉄、沃度加里、沃剝、純沃陳、乳酸鉄、稀硫酸、純燐酸、硝酸加里、硝石、硫酸銅、ボラキス、塩酸、硝酸曹達、甘硝石精、硝酸銀、臭化加里、昇汞、酒石酸鉄加里、酒石酸加里、滷砂などが使用されている。散剤では甘汞、金硫黄(硫化錫)を使用したものが多く記載されている。乳酸鉄、マグネシア、硝酸ビスミット、亜鉛華、吐酒石(酒石酸アンチモン)、砒石酸、亜砒酸、青酸亜鉛などが記載されている。これは化学物質についての情報の増加に伴って、医薬品としての使用例も増加したものと考えられる。

当時、阿片末、キニーネ、硫酸キニーネなどの麻薬が高頻度で使用されていたことも示して居る。

この様に多種多様な処方が記載されているが、その適応症についての情報が少なく、これは今後の研究に

期待する。

わが国にはシーボルトの薬剤録(6)を始め、オランダ系の薬剤処方が入っていた。そこにイギリス局方(7、8)が海軍、陸軍に翻訳して取り入れられ、さらに1886(明治19)年には日本薬局方もこのイギリスの局方を翻訳していた(9)。このホルトルマン方集はスロイス方聚とともに、オランダ系の薬剤の処方であったと考えられる。

文献

- 1 ホルトルマン講述、藤本純吉筆記『ホルトルマン氏方集』明治八年、金沢市立玉川図書館・近世史料館蔵。
- 2 スロイス講述、藤本純吉筆記『スロイス氏方聚』明治五年、金沢市立玉川図書館・近世史料館蔵。
- 3 板垣英治「スロイス方聚・スロイスの調剤処方箋」『北陸医史』第三四号、平成二四年、18―25頁。
- 4 赤祖父一知、今井美和「老烈氏方叢」藤本純吉記『北陸医史』第二三卷、第一号、平成十四年、1―8頁、『老烈氏方叢』藤本純吉記、金沢市立玉川図書館・近世史料館蔵。

- 5 赤祖父一知、板垣英治「ローレッツ氏方叢の薬剤処方への解説」、『北陸医史』第三七号、平成二七年、44―53頁。
- 6 「シーボルトの使った薬」、『長崎薬学史の研究』長崎大学薬学部ホームページ。
- 7 奥田虎炳閱、前田清則訳補、『官版・薬局方』海軍医寮、明治五年、百八七丁、近代デジタルライブラリー。
- 8 二宮一彌「日本薬局方物語」、『薬学図書館』三九(二)、21―27頁、(一九九四年)。
- 9 『日本薬局方』内務省編、明治一九年、百二二頁、近代デジタルライブラリー。

注 □…判読不明文字