


日本産蘭科植物分布図（六十三）

正宗巖敬・里見信生

MASAMUNE, G. & N. SATOMI : Distribution Maps of
Orchidaceae in Japan (63)

コクラン *Liparis nervosa* (THUNB.) LINDL. —
Ophrys nervosa THUNB. — *Epidendrum nervosum* (THUNB.) Sw. — *Malaxis nervosa* (THUNB.) Sw. — *Sturmia nervosa* (THUNB.) REICHB. fil. — *L. cornicula* MAKINO —



Leptorchis nervosa (THUNB.) O. KTZE. — *L. bambusaefolia* MAKINO は、この図でみられるように、本州・四国・九州に分布し、茨城県筑波山は北限産地、鹿児島県トカラ列島の中之島は南限産地となっている。九州南部以南では、ユウコクラン *L. formosana* REICHB. fil. の分布域と、また、伊豆諸島では、ユウコクランにくらべて花が小形のシマサバラン *L. f. var. hachijoensis* (NAKAI) OHWI の分布域と重複する。すなわち、ユウコクラン・シマサバランはコクランより暖かい地域を好むが、形態的には互に良く似ているので、同一種にあつかわれることもある。

* 中之島はミヤマウズラ *Goodyera schlechtendaliana* REICHB. fil. の南限産地でもあり、その他ノギラン・サルトリイバラ・ヤマノイモなども同様南限になっている。植物分布の上で興味深い場所と言えよう。