
中島邦雄* ラン科斑入2新品種について

Kunio NAKAJIMA : Two new forms of variegated orchid from Okinawa.

沖繩本島山原(ヤンバル:北部<^{クニガミ}国頭郡>の意)の中心地名護町の西方に海拔約450mの連山がある。その最高峰嘉津宇(カツウ)岳は眺望に富み、名所の一つとされているが、沖繩の多くない自然の植相を今なお残し、植物研究家が毎年多く訪ずれる所でもある。筆者は数年来この山を機会あるごとに歩き、今日まで判明したラン科植物を同好の士の参考にしていただければと思い、嘉津宇岳産の主な種類を記しておく。

Acanthephippium pictum FUKUYAMA (fig. 1) エンレイショウキラン, *Bulbophyllum makinoanum* (SCHL.) NASAM. シコウラン, *Calanthe discolor* var. *kanashiroi* FUKUYAMA カツウダケエビネ, *C. furcata* BATEM. ツルラン, *C. longicalcarata* HAYATA オナガエビネ, *Cheirostylis anomala* OHWI アノマラン (新記録), *Ch. liukiensis* MASAM. アカバシユスラン, *Dendrobium moniliforme* (L.) Sw. セキコク(?、筆者未採集), *Didy-*

*明治山植物園, Meiji-yama Botanical Garden (MEBG), Kube, Okinawa.




Fig. 1 Fruits of *Acanthephippium pictum* FUKUYAMA ($\times 2.0$)

Fig. 2 Fruits of *Gastrodia nipponica* TUYAMA ($\times 1.6$)

moplexis subcampanulata HAYATA ユウレイラン, *Epipogium rolfei* (HAY.) SCHLTR. リュウキュウムヨウラン (新記録), *Eria corneri* REICHB. ホザキオサラン, *Gastrodia nipponica* TUYAMA (fig. 2; Mar. 8, 1969) ハルザキヤッシロラン (新記録), *Goodyera procera* (KER.) HOOK. f. キンギンソウ, *G. hachijoensis* var. *matsumurana* OHWI カゴメラン, *Habenaria cirrhifera* OHWI リュウキュウサギソウ, *Liparis formosana* REICHB. ユウコクラン, *Phajus tankervilleae* (BANK.) BL. カクラン, *Tropidia somai* HAYATA アコウネッタイルン, *Luisia liukiensis* SCHLTR. リュウキュウボウラン etc. である。

他に, *Asarum leptophyllum* HAY. カツウダケカンアオイ, *Asa. okinawense* HATUSIMA (固有種) ヒメカンアオイ, *Desmodium oxyphyllum* DC. ヌスビトハギ, *Mercularia leiocarpa* S. et Z. ヤマアイ, *Arisaema heterocephalum* KOIDZ. ホソバテンナンショウ, *Burmammia itoana* MAKINO ルリシヤクジョウ, *Arthropters obliterated* J. SM. ワラビツナギ, *Loxogramme salicifolia* MAKINO イワヤナギシダ, etc. の植物地理学上真に興味深い種類を産する。

こゝに報告する2新品種 (いずれも葉のみに斑の入ったもの) はツルランの葉に, 白覆輪の入ったもので西伸一郎君が嘉津宇岳より得, またその南側の南安和岳から筆者によってユウコクランの美術品的な黄金斑のものが採集された。いずれも未発表のものと思われ




Fig. 3 *Liparis formosana* REICHB. forma *aureo-variegata* NAKAJIMA (f. nov.)

るので、前者をハクリンツルラン、後者をコガネユウコクラン (Fig. 3) として記載をしておきたい。

Calanthe furcata BATEM. form. *albo-marginata* NAKAJIMA, f. nov.

A typo differt folia albo-marginata.

Nom. Jap. Hakurin-tsururan (nov.)

Hab. Okinawa ; Mt. Katsuu-dake, Kunigami (May. 13, 1968; S. NISHI-typus in MEBG).

Liparis formosana REICHB. form. *aureo-variegata* NAKAJIMA, f. nov. (fig. 3). A

typo differt folia aureo-variegata.

Nom. Jap. Kogane-yûkokuran (nov.)

Hab. Okinawa ; Mt. Mt. Minami-awa-dake, Kunigami. (Jan. 10, 1969; K. NAKAJIMA-typus in MEBG).
