

ニ乗スルニ於テチャ

(二)加害者或ハ豫メ被害者ニ麻醉藥ノ如キ毒物ヲ與ヘ其麻醉期ニ乗シテ扼殺シタルニ非ラサル歟ノ疑ナキニ非ラサルヲ以テ立會豫審判事ニ請求シテ化學者ニ命シテ胃ノ内容物ヲ検査セシメシニ毒物ヲ發見セサルヲ以テ其然ラサルヲ知ル

鑑定

前條審明スル處ノ理由ニ基キ被害者某女ノ致命原因ハ他爲ニ據ル器械的窒息ニシテ扼殺ト鑑定候也

明治廿六年五月廿九日

◎頑固ナル陰莖「ヘルペス」治驗

會員 松本善次郎述

「ヘルペス」ノ陰莖ニ多發スルコトハ普ク人ノ知ル處ニシテ交接、不潔等ノ如キ刺戟能ク之ヲ誘起シ敢テ醫治ヲ乞フニ至ラス數日ニシテ癒ユルヲ常トス、上記

ノ誘因ハ屢反復スル者ナルカ故ニ此症ノ頻回發生スルコトアルハ敢テ恠ムニ足ラスト雖余カ茲ニ報道セント欲スル者ハ定期性ニシテ毎常神經痛ヲ前驅シ諸種ノ攝生、治療其効ヲ見ス三年間數多ノ醫家ヲ苦メタル者ナリ請フ左ニ其概略ヲ記セン

患者、京都某學校生徒、三浦某、齡二十八

〔宗族〕中遺傳スヘキ疾病ナシ

〔既往症〕患者生來強壯著患ナシ幼時麻疹、種痘ヲ經過ス七年疥癬ニ罹リ全身ニ蔓延シ治癒ニ數月ヲ費セリ爾後屢身體諸部ニ發疹シ二十歳ノ頃ニ至リ始テ止ム、二十三年淋疾ニ罹リ治ヲ怠リシ爲三ヶ月ヲ費セリト云フ〔本病來歴〕今ヲ距ル三年前即患者二十五年ノ冬記憶スヘキ原因ナク龜頭ニ水泡疹數個ヲ發生セリ發疹ニ先ツ「三日腰背部ニ疼痛ヲ發シ次テ臀部、鼠蹊部、陰囊、陰莖ニ蔓延セリ發疹ヲ見ルニ至テハ疼痛其跡ヲ留メスト云

フ水泡ハ大低三四日ニシテ治シ毫モ潰瘍、癩痕等ヲ殘  
カス發作ハ一月一二回ニ止リ間時一ノ障害ナシ

二十六年二月包皮内板ニ裂創ヲ生シ日ナラスノ治セリ  
次テ包皮外板ニ疣ヲ生シ(パヒローム?)醫手藥液燒灼  
チ行フ癩痕ヲ殘カス治スルヲ得タリ

爾來陰莖發疹屢起リ毎十日此レアルニ至レリ神經痛チ  
伴フ前ニ異ナラス其性刺スカ如ク或ハ純痛ナルアリ  
疼痛點ハ腰推兩側、鼠蹊部、臀部下緣内方、陰囊等ニシ  
テ左右交番シ同側ニ發疹ヲ現出セリト云フ

患者初メハ意ニ介セカリシト雖荏苒治シ難キヲ以テ數  
多ノ醫師、病院等ニ治チ求メ經過中梅毒ト稱セラレ久  
シク沃剃チ内服シ又交接、飲酒、過勞等ヲ避ケ常ニ陰部  
ノ清潔ヲ保チ散布藥ヲ以テ陰莖ノ濕潤ヲ防ケリ然ルニ  
未タ其効ヲ見ス毎十日乃至十五日毎ニ必ス發作アリ患  
者遂ニ不治ヲ悟リ憂鬱スルニ至レリ、四日前腰部倦痛

ヲ發シ次テ臀部陰囊陰莖ニ刺痛ヲ來セシカ昨日疼痛止  
ムト共ニ龜頭ニ發疹スト云フ

〔現症〕明治廿六年二月三日、外來、男、体格偉大骨筋肉  
皮下脂肪織共ニ能ク發育スト雖稍貧血ヲ呈ス精神不活  
潑鬱憂ノ狀アリ頭部、顔面、頸部共ニ違常ナク胸腹器臟  
常ノ如ク脾腫ナシ脊椎壓迫疼痛ナク異形ナシ腰部下肢  
亦然リ右鼠蹊腺一個ノ小硬結ヲ觸ル、

陰莖頸部及龜頭右側ニ偏シ帽針頭大ノ蕾疹及水泡疹四  
個ヲ見ル痒覺アルノ外疼痛ナク他ニ硬結、癩痕等ヲ認  
メス

〔診斷〕陰部神經痛ニ因ル陰莖「ヘルペス」

〔治療及經過〕

鹽酸規尼涅 ○、六 爲丸分三包

右每食後一包服(漸ク増量一日一、〇ニ至ル)

華良泥電氣應用(始メハ弱流ヲ用ヒ漸ク其強度ヲ

増ス)

右隔日一回各側五分時(后ニ十五分トス)

腰部、臀部下縁間ニ通ス

硼酸澱粉 一ト四ノ者

右陰莖撒布料

(二月五日)水泡全ク治ス發疹日第四日目ニ當ル

(二月十六日)包皮外板ニ水泡疹二個ヲ生ス前回發疹ヨ

リ第十四日目ナリ二日前神經痛發作アリ然レモ輕シト

此間治療日數二週ナリト雖患者多用爲ニ治テ受クルコ

數回服藥モ亦持續セス其後來ラス

(四月廿八日)再來リ日爾後某病院ニ至リ治テ受ク内服

藥、下肢ニ鉗針ヲ貼スル等竝ニ二ヶ月ヲ經ルト雖其効

ヲ見ス毎十日發作整然トシテ來ル敢テ治ヲ乞フト

處置前ノ如クス

(五月九日)昨日左臀部下縁内方ニ當リ壓重ノ感アリシ

カ漸ク増劇シ壓迫ニ由リ疼痛アリ

(十日)昨夜來陰莖ニ純痛起リ他部疼痛去ル

(十一日)今朝龜頭繫帶部右側ニ水泡疹壹個ヲ發見ス疼

痛全ク去レリ

(十三日)水泡疹治ス右腸骨后上棘内側ニ當リ純痛ヲ覺

ユ

(十九日)左腰部腸骨后上棘内側及臀筋下縁内方ニ純痛

アリ(發作時ニ當ル即前回發作十一日后ナリ)

安知必林〇、五乳糖 〇、五 一包量

右腰痛甚キ際臨臥一包頓服

(二十日)疼痛全ク去ル壓迫過敏部ナシ此日或ル祭典準

備ノ爲大ニ身体精神ヲ勞働スト雖毫モ發作ノ兆ナシ

(廿二日)昨日ハ發疹時ニ當ルト雖微恙ナシ

(三十日)四五日前ヨリ繁多治療ヲ怠リシカ昨日來腰部

ニ不快ノ感アリ(發作時ニ當ル)本日陰莖ニ及フ然レモ

疼痛ヲ發スルニ至ラス

(六月一日)不快ノ感覺去ル未タ發疹ヲ見ス

(三日)昨日來頭重耳鳴アリ靜肅ニ際シ蟬鳴ヲ聞ク食思不良ナリ上衝ノ感甚シ

規尼涅内服ヲ止ム、電氣舊ノ如シ

(九日)發作時ニ當ルモ未タ違常ナシ

爾后療養ヲ怠ルト雖遂ニ發作ナシ治療日數四十二日間ナリ(但シ初診時ハ治療ヲ持續セス他ノ療法ヲ受クル「永日ニ亘リシテ以テ再來ノ日ヨリ起算セリ」)

(原因追究)抑本患者ノ「ヘルペス」ハ其原因何レニ存スルヤ知ラサルヘカラス以下試ニ之ヲ説ン

己ニ既往症中記載セシカ如ク患者常ニ有害ノ刺戟ヲ避クルニ注意セシテ以テ其原因ヲ知ル「容易ナラス、近時醫家ノ唱フルカ如ク本患者ノ「ヘルペス」モ亦皮膚ノ傳染ト見做サンカ如斯頻回再生スヘキ感染ノ機會ヲ

發見セサルヲ如何セン

茲ニ最注意スヘキハ發疹神經痛ニ伴フノ一事ナリトス己ニ前條記載セシカ如ク發疹ハ每常神經痛ニ續テ起リ治療中神經痛ノ輕快スルニ至リ遂ニ其跡ヲ絶ツニ至レルヤ明ニシテ「ヘルペス」ノ未梢神經炎ニ併發スルノ事實ハ普ク醫家ノ信スル所ナリ故ニ余ハ本患者ノ「ヘルペス」ヲ以テ神經痛ニ續發セシ者ナリト謂ハン今ヤ進テ神經痛ノ部位及其原因ヲ探究セサルヘカラス

其部位タルヤ壓痛點、疼痛區域等ヲ以テ察スル時ハ腰神經叢并ニ薦骨神經叢分枝ノ領内ニシテ内陰部神經後股皮下神經及腸骨鼠蹊神經等ノ神經痛ナリトス然ラハ此レ等神經痛發生ノ原因ハ如何此問題ニ就テハ尙確定ヲ得サル所ナリ左ニ其理由ヲ述ン

(一)麻刺利亞性神經痛ニアラサルカ、發作ノ定期性

ナ現ハシ、規尼涅ノ効ヲ奏セシヲ以テ見レハ既ニ明ナルカ如シト雖病毒感染ノ機會ヲ發見セス、脾腫ヲ欠キ、比較的間歇時長ク、前驅症ヲ欠クカ如キ未ダ疑ヲ解ク能ハサル處ナリ

(二)梅毒性ニアラサルカ、曾テ淋疾ニ罹リシヲアリ或ハ尿道下疳ニアラサリシヤ知ルヘカラスト雖他ニ梅毒ノ症候ヲ發セシヲナク曾テ梅毒ト見做サレ久シク其療養ヲ受ケシヲアリト雖毫モ其効ナキヲ以テ見レハ疑鬪自ラ解ケン

(三)外傷性、壓迫性、若クハ反射的の神經痛ニアラサルカ、此疑問ニ就テハ諸種ノ探求成績ナシ陰莖疣燒灼ノ既往症アリト雖今日其痕跡ヲ見ス又神經痛ハ己ニ之ニ先テ發生セリ何ソ疑フニ足ランヤ

(四)寒胃ニ因スルカ、既往ニ徴シ特殊ノ關係アルヲ認メス

(五)慢性病、中毒、神經系疾患等ニ因スル處ナキカ、患者稍貧血ヲ呈セリト雖治癒后ノ今日尙初診ノ時ト其度ヲ異ニセス又敢テ貧血ノ治療ヲ加ヘスノ己ニ本病ノ治セシヲ見ル以テ職因スル所ナキヲ知ルヘシ、又他ニ疑念ヲ抱クヘキ疾患ナシ

以上諸項中第一項ノ如キ尙疑ヲ存スヘキ者ナリト雖モ強テ附說セント欲スルハ反テ誤ヲ招クノ基ニシテ又々特發性神經痛ノ名ハ余ノ快トセサル處ナリ茲ニ疑ヲ遺シ以テ他日ノ參考ニ供セントス博識ナル會員諸君教ヲ垂ル、アラハ幸甚

寶 驗 雜 俎

◎淋疾ノ療法ニ就テ

會員 松山五七郎