

キ暗室ニ於テ燭火ヲ見セシムルニ著ク復像ヲ見ル之レ
尙ホ斜視アリテ兩眼單視シ克ツザルノ証ナリ然レモ手
術前後トモ患者ハ常ニ復視ヲ訴エズ別ニ視機ノ障害ナ
キヲ以テ容貌的全治ノ目的ヲ達セリト云フモ敢テ過言
ニ非スト信ス

震盪症ハ偶然治癒シタル者ナルカ故ニ爾后再發ノ如何
ニ注意セシニ今尙ホ再發ノ兆モナケレハ之レ又全ク治
シタリト見ナスヲ得ンカ

ジョールベルグ、ウエルス氏ハ手術ニ由テ斜視ハ治セシ
モ震盪症ハ依然トシテ存セリト云ヘリ而ルニ吾患者ニ
在リテハ兩ツナカラ全ク治ス之レ實ニ奇ト言ハサルヲ
得ス而シテ其治シタル理由ニ就テハ余未タ充分考案ヲ
下ス克ソス聊カ以テ參考ニ供ス

◎肉様鬼胎ニ就テ

會員 岡田剛吉

今茲ニ携帶シ來リ諸君ノ劉覽ニ供セントスル標品ハ
本縣羽咋郡羽咋町ニ開業セラル、種田義信君ヨリ學
士山田謙治君エ其鑑定ヲ依頼セラレシ者ニシテ學士
ハ其取調ヲ余ニ囑セラレタルヲ以テ淺學無經驗ナル
ヲ顧ミスニ「リテラトウール」ニ就テ其肉様鬼胎
ナルヲ檢知シ得タレハ今日諸君ノ清聽ヲ煩ハスコト
ナリシ次第ニテ實ニ種田山田兩君ニ向ヒ深ク感謝ス
ル所ナリ

抑モ塊胎 *Uola* (*Uondkalb*, *Uohnealb*, *Fenfelfbit*, *Kielkepf*,
ronnenkind, *Niezenkind*, u. s. w.) ナル名稱ハ既ニ「ヒボク
ラテス」「アリストテレス」及ヒ「ガールン」氏ノ命名ス
ル處ニシテ變性シタル流産トシテ説明セリ其後亞拉比
人ハ此名稱ヲ廣ク應用シ凡テ子宮腔或ハ子宮壁ニ生シ
タル腫瘍等モ其名ヲ冠セシメ後亦之ヲ區別シテ眞鬼胎

Wahre mole 假鬼胎 Falsch mole ノ二種トシ甲ハ妊娠ノ變性産物乙ハ妊娠ニ關セスシテ生シタル腫瘍ノ類トセリ現今吾人ノ鬼胎ト稱スル處ノ者ハ胞狀或ハ葡萄狀鬼胎 Blasen oder Strauben mole 肉様鬼胎 Fleischmole ノ二種ニシテ血様鬼胎 Blutmole 石様鬼胎 Steinhole 脂肪様鬼胎 Fettmole ハ肉様鬼胎ノ同類ニ過キスシテ予カ茲ニ述ブルハ肉様鬼胎 Fleischmole (Uta carnorum) ナリトス

總テ妊娠第一ケ月ニ流産スル者ノ多數中既ニ胎兒ノ死亡スルニ係ハラス猶強ク卵ノ發育スルコアリ即チ卵床デビダウ脱落膜ノ部ニ多數ノ脈絡膜絨毛ヒヨロキヤンクオヤンノ分岐スルニ依リ胎兒死亡ノ後ト雖モ母体ノ血液アリテ營養セラレ未來ノ胎盤ヲ形成シ全卵ノ大サ鶏卵大ニ達スト雖モ種々ノ時期ニ於テ流出シタル血液ノ卵膜内ニ至リ結節狀腫瘍狀物ヲ形成スルキハ卵ハ全ク變性シタル如キ外觀ヲ呈ス」斯ノ如ク變性シタル卵中ノ出血尙ホ新鮮ニシテ流動性

ヲ有スル者ヲ血様鬼胎ト云ヒ陳奮ニシテ既ニ褪色シ硬靱ナル者ヲ肉様鬼胎ト云フ然リ而シテ血様或ハ肉様鬼胎ノ原因トナルヘキ卵内ノ出血ハ急性熱性病(第扶斯痘瘡 麻疹 肺炎 虎列刺等)ノ爲ニ子宮内脱落膜炎就中其急性症ヲ發シ其經過中ニ出血ヲ誘發スル者ヲ多シトス (qudmethris decidualis acuta hemorrhagica) 又外傷或ハ胎兒自己ノ疾患ニ由ル者ナキニアラス而シテ其出血竈ハ始メ暗色ナルモ赤血球ノ消失ニ據リ周圍部ヨリ漸々中心部ニ向ツテ次第ニ脱色セラレ纖維素ハ自ラ結締織ニ變性シ亦之ニ近ク位シタル卵膜即チ周圍ノ最外層ニシテ凝血ヲ被包シタル眞脱落膜オビドクマツカシモ亦結締織ニ變性シ之ニ由テ多少癒着シ互ニ經界セラレタル現象ヲ呈シ其子宮内面ニ結合スルヤ胎盤部ニ於テ最モ緊固ニシテ他ノ周圍部ハ子宮内壁ヨリ分離シ時トシテ固着ニ由テ困難ニ剝離スヘキ莖ヲ以テ子宮内ニ結合スルコアリ」

眞脫落膜及ヒ反轉脫落膜ノ間或ハ反轉脫落膜ト脈絡膜ヒヨリオソ

ノ間互ニ分離シ上述ノ如ク變性シタル疑血ノ厚キ層ヲ

以テ其間隙ヲ充實融合ス」卵床脫落膜及ヒ反轉脫落膜

ハ處々ニ切片狀ノ厚キ膜ヲナシ外面ハ絨毛樣ニシテ子

宮内壁ト結合ス脈絡膜ハ其絨毛ノ間ニ流注シタル多

量或ハ少量ノ有機變性シタル血液ニ由テ肥厚シ卵床ニ

適應スル部ハ結節狀ニ膨起シ尙ホ暗色ヲ呈ス或ハ結締

織ノ網狀纖維ヲ現ハス亦スペート及ヒウエザル Spæth,

Wedl 兩氏ノ精密ナル檢索ニ從ヘハ分子狀ノ著明ナル脂

肪球ヲ以テ浸潤シ脂肪樣鬼胎ノ名ヲ冒スニ至ル者アリ

(Spæth und Wedl, weber mehrere Anomalien der Frucht

umgebenen theile. Zeitschrift der gesellschaft der aenzte.

X. jahrig. pag. 806. n. f.)

只破格トシテ出血ノ脈絡膜ヨリ發スルコアリ然ルキハ

羊膜アマニオンノ外面ニ廣ク濺漑播布シ一部ハ卵腔ニ向ツテ灣入

スルコアリ加之ナラス遂ニ羊膜ヲ破リ新鮮或ハ陳舊ノ

血液ヲ羊膜腔内ニ發見スルコアリト雖凡通常羊膜ハ變

性セスシテ脈絡膜ノ内面ト固着シ羊膜腔ハ側方ニ押排

セラレ其腔内ヲ開キ見ルキハ少量ノ粘液樣帶青赤白色

ノ液ヲ含有シ其内ニ胎兒ノ痕跡物ト看做スヘキ者ヲ發

見スルヲ得ヘシト雖凡其探檢タルヤ甚タ困難ニシテ容

易ニ看過スルコ多ク之ヲ發見スルモ極小ニシテ妊娠初

週ニ於テ既ニ浸漬マゼラチオン或ハ變性崩壞スルコ稀ナラスシテ往

々「ル―ペ」ノ助ケニヨリ漸ク認識シ得ルコアリ(既ニ

雞卵大ニ達シタル卵ト雖凡胎兒ノ既ニ初週ニ於テ發育

ヲ止ムルヲ以テ卵ノ大サト胎兒ノ大サト比例セサルハ

勿論ナリ)亦卵黃囊ヲ發見スルコ稀ナラス

肉樣鬼胎ノ久シク子宮内ニ停ルキハ多量ノ石灰分沈着

シ所謂石樣鬼胎ヲ形成スルコ敢テ稀有ナラスシテ化學

的及ヒ顯微鏡的試驗ニ由テ燃酸加爾叟母及ヒ炭酸加爾

叟母ヲ發見ス」子宮内ニ生シタル凝血纖維腫義膜等トノ鑑別ハ其内ニ胎兒ノ存在及ヒ卵各部ヲ發見スルカ爲ニ敢テ困難ナラス」肉様鬼胎ノ娩出スルヤ陳痛燦間歇性子宮收縮ヲ以テスルコト通常流産ト異ナルコトナシ

以上説明スル處ハ「スカンツオニー」氏「コルマン」氏

「シユロイデル」氏産科書(千八百八十九年)ヨリ拔萃

セシ事項ニシテ次ニ種田君ヨリ寄贈セラレタル病床

記事及ヒ其標品ニ就テ余ノ所見ヲ述ヘ本論ノ局ヲ結

ハント欲ス

本縣羽咋郡羽咋町ノ一農婦某齡三拾有五生來強壯ニシテ特筆スヘキ大患ニ罹リシコトク十七歳ニテ嫁シタル後二月華始メテ潮來シ爾來整然月次ヲ誤ラス二十一歳ニシテ一子ヲ擧ク分娩産褥トモ滑カニ經過スト雖凡可憐ノ嬰兒ハ生後一ヶ月急瀉ノ爲ニ没ス後チ數年妊娠セサリシカ昨年十二月ヨリ月花ヲ見ス本年十二月二十五

日夜俄然臍下部及ヒ腰部ニ鈍痛ヲ呈スト雖凡敢テ著シキ苦惱ナキヲ以テ放任セシカ二十八日ニ至リ疼痛頓ニ増劇シ苦悶堪ヘ難キヲ以テ余(種田君)ニ往診ヲ乞フ時既ニ羊水流泄スルヲ以テ流産ナラント察シ産婆ニ托ス後チ數時ニシテ殆ント全子宮ノ形狀ニ一致スル柔軟囊狀物ヲ排出シ隨ツテ疼痛緩解シ多少ノ血液及ヒ惡露様物ヲ排泄スルノミ他ニ異狀ナク目今殆ント平常ノ健康ニ復ス(三月六日記)

右娩出物ハ扁平梨子狀ニシテ長徑五仙迷橫徑最廣部ハ三仙迷最厚徑二仙迷ヲ算シ重量拾七瓦蘭誤ヲ有シ全体帶紅褐色ニシテ一部ハ殆ント黑色ヲ呈ス之ヲ縱斷シテ其面ヲ檢スルニ外面ハ反轉脱落膜ニ由テ被包セラレ反轉脱落膜ト脈絡膜間ハ出血竈ニ由テ充實セラル其竈ノ周圍部ハ淡褐色平滑ニシテ全ク肉様ノ觀ヲナシ反轉脱落膜及ヒ脈絡膜ト固ク凝着シ中心部ハ粗糙ニシテ網様

胎 鬼



面 断 縦 同



纖維性物質ト顆粒狀物ヲ以テ充實ス羊膜腔ハ一方ニ壓迫セラレ外面ハ脈絡膜ト接合シ内ニ少量ノ液体及ヒ胎兒元基トシテ指定スヘキ者ヲ發見スル能ハス(液体ハ貯藏用ニ供セシ亞兒簡保爾ノ中ニ滲透竄出セシ者ナラシ乎)

