

ハ一ニリ

◎特發性筋炎ノ實驗

池亀 祐藏

筋實質ノ炎症ハ極テ稀有ナリトシ人多クハ其炎症ノ間質ニノミ止マルモノナルヲ信シタリシカ「ウルヒィヨウ」氏等ノ証明アリテ以來筋實質炎ノ亦稀ナラサルヲ注意

スルニ至レリ

近頃エ、ワルテル氏ハ大ニ特發性筋炎ニ就テ報告シテ云フ多クノ場合ニハ先ツ結締織炎ヲ發シ筋質ヲ包裹浸潤シ遂ニ筋纖維モ其沒領スル處トナリテ變色蒼白色ヲ呈シ宛モ膠様ニ膨脹シ原纖維束ノ内容溷濁シテ横紋消失シ筋膜ノ核全ク不明トナリ動モスレハ遂ニ化膿シテ所謂筋膿瘍ヲ形成スルニ至ル此時尙ホ其周圍界ニハ幼若ナル筋核アリテ之レヨリ更ニ筋纖維ヲ生出シ得ルモノナリ

又他ノ場合ニハ筋纖維主トノ脂肪變性シ或ハ収縮質大小不同ノ塊ニ變ス此等ノモノモ尙ホ再ヒ赤血球ニ化シ成形機能ヲ起シ得ルヲ見ル故ニ如斯ハ之ヲ眞ノ變質ト看做スヘカラス

筋炎ハ諸多ノ外傷過勞等ヨリ來リ其毒素ハ創口又血液ヨリス又周圍ノ諸炎症ヨリ筋ニ蔓延スルヲアリ例之皮

下フレグモトネ及骨ノ化膿性炎ヨリスルカ如シ又轉移性筋炎トナリテ發スルコアリ例之膿毒症、チフス、麻疹、ローツ、産褥熱、等又淋疾ヨリスルコアリ而シテ此場合ニハ化膿性ナルコ多キモ淋毒性ノ如キハ同性關節炎ト同ク必ス化膿スルニモ限ラサルナリ

以上ノ場合ニ於テ筋實質ハ變化ナク、或ハ變化少ナク又ハ既ニ萎縮、變質等諸多ノ景況ニ存スルヲ見ル

如述原因殊ニ化膿性ナルトキハ之ヲ速ニ切開セサレハ遂ニ下垂シテ危險ナル蜂窩織炎トナルニ至ル之レ其膿ハ強剛ナル筋鞘下ニ強ク壓迫セラレ毒素ノ吸收ヲ促スヲ以テナリ又如斯惡性ノ症ナラサルモノ、初期ニ適當消炎法ヲ試ムルカ如キハ勿論多言ヲ要セサルナリ殊ニ炎症ノ度ニ比シテハ尙ホ治シ得ヘキ機能ヲ長ク有スルニ於テチヤ

ハ一エム氏ハ一ノ傳染性筋炎ナル報告ヲナセリ即チ高

熱ヲ以テ或ル一部若シハ數多ノ部位ノ筋ニ赤色腫起硬結ヲ呈シ或ハ蒼白色ナルコアリテ遂ニ化膿シ皆數日間ニメ不幸ノ轉移ヲ取ル此時筋ハ蔓延性浸潤ヲ來シテ壞疽ヲ起シ同時ニ助膜炎肝、脾、膜腹等ヲ續發スルヲ見ルト

今左ニ認ムヘキ原因ナクシテ發セシ筋炎一二ヲ述ヘ併テ其「ブレパラート」ヲ鏡下ニ裝置シアレハ乞フ一覽ヲ賜ヘ

第一患者 村上某六十三年ノ農婦

生來健康嘗テ疾患ナシ今ヨリ十日前認ムヘキ故ナク右上膊殊ニ其内側ニ疼痛ヲ覺ヘ此時惡寒熱發等ナク該部漸ク腫起潮紅硬結シテ昨日ヨリ諸症増劇寒熱往來未ダ讒語ヲ發スルニ至ラサルモ安眠ナラスト云々明治廿三年九月廿六日之ヲ檢スルニ体格強壯營養モ甚タ不良ナラサル一老媼顏良少ク苦楚ノ狀ヲ呈ス右

上膊ノ屈側一沉ニ發赤腫起シ皮膚ニ稍々腫脹ヲ認メ  
觸檢スレハ二頭筋ノ全部泥狀ニノ硬結ス体温三十八  
度脈百至ナリ於茲入院加療ヲ諭スニ患者喜諾シ明日  
ヲ約シテ去リ遂ニ又タ來ラス

然ルニ之レヨリ一周日ヲ經テ爾來前約ヲ履マンコト  
乞フ即チ之ヲ入院セシメ前日ノ狀ヨリ推スキハ最早  
充分化膿セシナラント察シ少ク輕卒ナリシモ之ヲ再  
檢スルニ先キ切開ノ用意ヲナシ「グロ、ホルム」摩睡  
ヲ施シ刀ヲ手ニシテ后之ヲ檢スルニ病勢前日ノトヨ  
リ少ク劇チ加ヘ腫脹等ハ増加セシモ末タ化膿シ波動  
ヲ呈スルニ至ラス併シナカラ今更術ヲ廢スルモ不可  
且ツ今ニ之ヲ切開スルモ假令化膿ナキニモセヨ確  
實ナル消炎法トシテハ最良ノ法ナレハ先ツ刀ヲ二頭  
筋外縁ノ中央ニ下シ之ヲ上下ニ切開スルニ膿ノ蓄積  
スル處ナク筋ハ甚タ浸潤セラレ其色暗紫赤色ヲ呈シ

其脆キコ指ヲ以テ容易ニ斷離ス之レヨリ内膊筋ノ方  
向ニ指ヲ挿入シ檢スルモ膿ヲ認メス故ニ創ハ防腐崩  
帶ヲ施シ内服ニ希鹽酸リモナーテヲ投ス同六日繃帶  
ヲ交換スルニ創甚清潔腫起モ減シ疼痛ナシ熱尙ホ七  
度九分而メ三菱筋ノ内縁少ク腫起シテ疼痛ヲ訴フ之  
ニ水銀軟羔ヲ塗布セシメ内服ハ水楊酸曹達ニ換ユ同  
八日ニ至リ二頭筋領ノ腫起ハ全ク去リ創ハ殆ト第一  
癒合スルモ三菱筋ノ前縁腫起去ラスシテ少ク波動ヲ  
觸ル、カ如シ之ニ少切開ヲ施スニ少許ノ膿ヲ出ス爾  
后熱ハ下リテ平温トナリ上部ノ創ハ來タ癒合セサル  
モ硬結全ク去リ同十五日創全ク癒合シ他ニ寸害ナキ  
ヲ以テ退院セシム

第二患者 坂本某四十七年ノ農夫

天賦強健且暮星ヲ踏ンテ農業ヲ營ム茲ニ三十有余年  
其間唯寒胃等ノ微恙ヲ以テ五日或ハ七日業ヲ怠タル

コアルノ他疾病ナシ今ヨリ十七日前故ナク右大腿ノ  
 深部ニ時々微痛アリシモ介意スルニ足ヲサリシカ三  
 四日ノ后同部疼痛ヲ發シテ腫起發赤動勞スルコ能ハ  
 サルニ至リシヲ以テ自家ノ消炎法トシ温包セシニ諸  
 症増劇シ爾后四五日ニ惡寒熱發スルヲ以テ叩テ治  
 ナクフニ至ルト

明治廿三年十一月十七日之ヲ檢スルニ体格營養共ニ  
 稍善良ナチ一男子少ク倦怠ノ狀アルモ体温三十七度  
 八分ナル右大腿ノ内側ニ發赤シ耻骨筋ノ方向ニ紡錘  
 形ノ硬結アリテ皮膚甚浸潤セラレ之ヲ上下ニ切開ス  
 ルニ其硬キコ恰モ癩痕ヲ切ルニ均シ筋色蒼白ニ所  
 々帶黃褐色ヲ斑ス少許ノ膿ヲモ認ムルナシ術終リテ  
 防腐帶施行内服稀鹽酸リモノ一テ」ヲ投ス同廿七日  
 即チ術後十一日ニ僅微ノ續發症モナク此間二回ノ  
 綳帶交換ニテ周圍ノ浸潤全ク去リ全治退院ス

以上二患者ハ即チ認ムヘキ原因ナクシテ發セルモノニ  
 ノ檢微鏡下ニ示スカ如ク二者共ニ結締織甚浸潤セラレ  
 筋纖維甚萎縮ス併ラ試驗上未ダ變質スルヲ認メサリシ