

又親族ニ生殖器病アルコト聞カス又スタイレーチル
eylmer 氏ノ實驗セシ如ク体格容貌婦人ナルモ剖檢後
骨盤内ニ罌丸副罌丸等ヲ發見スルコトアレハ本患者モ假
性半陰陽ニシテ外部婦人コシテ内部男子ナルヤモ計リ
難シト雖モ其剖檢後ニ非ラサレハ知ルニ由ナシ聊カ記
シテ諸君ノ參考ニ供ス

◎虞粟聘ノ記事

會員 吉田茂人

流行性感胃ハ今ヤ本邦都鄙ノ別ナク其侵襲ヲ被ムラサ
ルハナク當縣ニ於テハ二三ヶ月前ヨリ貴賤(貧富)男女、
長幼ナ問ハス之レカ爲メニ胃サレ到ル處其流行ヲ見サ
ルナキニ至レリ余カ家族ハ老幼七人ヲ以テ團欒チナセ
リ過ル頃一種ノ熱性病ヲ患ヒ舉家悉ク臥セリ余モ亦タ
同症ヲ發シ一週日ハ起首スル能ハサリキ

然ルニ其熱性病狀ヲ調査考定スルニ殆ント流行性感胃
ト一徹ノ中ニ出入セリ

是レヨリ先キ歐洲各國ノ大流行アルヤ延テ本邦ニモ亦
タ同一ノ流行ヲ發シ猛然トメ四方ニ閃發シタレハ一ハ
以テ實地ニ於テ本病ヲ研究スルノ機會ヲ得一ハ以テ無
慮數百万ノ生靈ヲ犧牲ニ供セラルヤトノ不幸ハ心頭ニ
凝着シタリシコ本邦新誌並ニ人口ニ據レハ自ラ泰西ノ
諸症ト一般病徵ヲ輕微ナリトシ生命ヲ闇キコ墜スノ寡
キヲ傳聞シ百憂中ニ一喜ヲ得タリ、

余カ家族ノ侵タルヤ實ニ六月十四日ヲ始トシ以來一
閱月間ニ悉ク其害ヲ受ケ自然ニ自体並ニ家族ノ病症ヲ
調査スルノ偶機トナリタレハ余ハ忽チ東西兩洋ノ症候
ヲ比較センコトヲ望ミ果シテ本邦ハ輕易ナルヤ否ヤヲ定
メンカ爲メニ此小數ナル家族ヲ原料トナセシハ今更其
痴情ナルチ知レリ

余ハ六月一日ヲ以テ縣内羽咋郡醫師總會ニ臨ムノ機ヲ得偶々會員ニ質スニ本病ノ事柄ヲ以テシタレハ孰レモ輕症ナルトノ答ニテ大概其主徴ハ三四日ノ熱發輕キ咽頭、氣管枝ノ加答兒頭痛等ヲ以テ散症スルヲ示サレ現ニ二三ノ患者ニ接セリト然ルニ當時ノ流行ハ流行ナレ目今ノ如キ甚タシカラズ余思フ未タ以テ眞ニ流行性感胃ト認ム能ハストノ疑團ヲ抱ケリ今ヤ家族數人ノ比較ヲ以テ漸ク此疑惑ヲ氷解スルヲ得タリ

余ハ當時金澤病院眼科ニ勤務スレハ自ラ剩多ノ患者ニ接セス從テ經驗モ最モ寡ナク調症モ亦概畧タルニ過キス會員諸君ニ示スハ恰モ石ヲ抱キ淵ニ入ルカ如ク只雜誌欄内ヲ瀆スノ恐レアレハ日誌ノ儘箱底ニ止メ置キタレヒ此頃三四隣友ノ切ナル論シト獎勵トニ由テ會員諸君ニ極顔ヲ顯ハスノ苦痛ヲ忍ヒ遂ニ編輯委員諸君ノ勞ヲ顧ミス之レヲ依托スルヲトハナレリ

諸君モ厭迄了得セラル、如ク流行性感胃ノ主徴トシテ診定スヘキ通有性ハ之ヲ單簡ニ記載スレハ左ノ次項ニ外ナラス

○流行性ニ行ハル○泰西諸國ハ冬季ニ流行スト云ヒ本邦ニハ夏、季、ニ、向、ツ、テ、瀾、臺、セ、リ○稀ニ通有性前驅諸兆ヲ備フルモ多クハ俄然發病ス○頗回惡寒若クハ戰慄ヲ兼ヌ○体温速ニ昇騰脈甚タ數○神經症候前額劇痛若クハ後頭痛ヲ發シ語、背及ヒ腓膈筋痛等○結膜、鼻腔、咽喉、氣管支、胃、腸ノ諸粘

膜加苔見○全身衰脫最モ甚タシ○經過長キモ二週間ニ消長ス

故ニ此疾病ノ特徵ハ俄然体温上騰神經諸兆粘膜加苔兒ニテ兼ヌルニ体力ノ衰脫經過短小ナルト一時ニ流行スルニアルヲ以テ診定ノ最要點トスヘキ乎

然ルニ當地ニ於テ流行スル景況ハ一般ニ此通有諸兆アリ而間々一二ノ徵ヲ欠如スルヲナキニアラス之レ屢々

數多醫伯ノ教ユル所ナリキ余ノ家族七八中純然タル諸症ヲ備有スルアリ亦僅カニ熱發、頭痛、咽喉加苔兒、消化不良ヲ呈シ爾三日ニシテ消退シタルカ如キ類似症アリ平生ニテハ該感冒ト認定シ能ハサル者アルカ如ク僅ニ七八ニテ尙ホ疾病ノ輕重アリ且ツ一タヒ弊屋ヲ窺フヤ忽チ全家族ヲ襲ヒ加之ナラス本邦ニハ大流行アリ當地ノ如キハ未タ目今ノ如キ流行ハ宿老モ尙ホ暗知セスト其他聞知スル處ニ據レハ病勢一般ニ輕易ニシテ死數甚々寡ナキトノコナレハ此流行ヲ機會トシ諸君ノ嘲笑ヲ顧ミス次章ニ於テ全家七名ノ概畧ナル記事ヲ現ハシ誌面ヲ贅占セント欲ス乞フ之ヲ恕セヨ

○第一患者(弟鉄外齡十八年八月)全家中左モ劇甚タル症ニテ六月十四日俄然惡寒ヲ發シ全身倦怠、食欲稍、減少、頻リニ噴嚏ヲ起シ日暮熱四十度ニ達シ脈頻ル數、劇烈ナル前額痛アリ併シ夜間尙ホ眠ル翌十五日朝起ス

ル能ハス熱三十九度一分食欲全ク欠如シ少量ノ營養品ヲ攝ルノミ少シク涙液ヲ流シ咳嗽時々發シ体力頓ニ脱墮シ日後ユク全頭蓋鈍痛ヲ覺エ人事ヲ辨セス夕陽ハ熱四十度五分譫語喃喃ヲ持續シ夜間甚々不安ノ狀アレリ十六日朝熱三十九度益々前症ヲ増シ咳嗽階痰咽頭發赤兩扁桃腺稍、腫起譫語持續セリ晚ニハ熱四十度ニ上昇セリ此日朝九時頃キニ一子内服其夜譫語ナク稍、眠ヲトレリ十七日ハ早朝ヨリ心思僅ニ快ク熱尙ホ三十九度アレリ併シ体力脱衰ハ益々甚クシク咳嗽ハ愈々多ク涙瀧ハ停止シ頭痛尙ホ持續シ此三日間ハ大便秘結セリ日夕熱三十九度四分十九日ニハ日夕熱三十八度五分夜間モ安眠シ少シク食欲アリ以來二十一日迄夕暮三十八度前後ニ從來シ每朝三十七度五分ヲ上下シ唯氣管枝加答兒ト僅カナル前額痛ト歩行スル能ハサル非常ノ脱力ト食欲減退ヲ殘スノミ其後兩三日間ハ午後二時間計僅ニ發熱

シ前殘遺症ノ外異常ナク平素左モ強壯ナル爲ニ意ヲ挺
シ三四町歩行シテ忽チ辟易タリ爾來日子ヲ經ルニ從ヒ
諸症全ク消却セリ

○第二患者(茂人二十五年十ヶ月)六月廿四日未明頓ニ
惡寒シ前額痛全身倦怠ナク朝八時三十八度三分午餐ヲ
廢シ頭痛甚クシク兼ヌルニ右側後頭ノ劇痛及ヒ腓腸筋
鈍痛アリ終日頭ヲ按摩セリ日暮熱四十度トナリ咳嗽少
シク發セリ大便ハ二日前ヨリ秘結シ當夜四時間計眠レ
リ然ルニ頭ノ疼痛ハ益々増劇シ頭首ヲ回轉スルニ苦シ
ミ僅ニ上下スルノミ遂ニ起ツコ能ハス翌廿五日朝熱三
十八度四分咳嗽甚ク頓發シ筋痛ハ消失シ頭痛ハ尙ホ依
然クリ体力頓ニ疲憊シ食思僅ニ存セリ余ハ考フ解熱藥
ヲ服セス自然ノ經過ヲ定メンコナ併シ正午頃ニ至レハ
全身苦悶ニ堪エス他人モ頗リニ解熱ヲ論ス因テキニ
子内服セリ日夕熱三十七度八分トナリ其夜稍々安眠セ

リ廿六日朝熱解散心意少シ快手トシテ床上ニ坐セリ頭
痛減セス咳嗽益々頻發泡沫ヲ混スル粘稠ナル痰ヲ咯出
シ當日室内ヲ緩歩スレモ身体動搖セリ醫友ノ爲ニ空氣
管枝加答兒アルヲ告ラレタリ以後三日間ハ咳嗽ト頭痛
ト脱力トヲ殘シ諸症消退シタレモ廿八日ハ漢學老師父
追悼會ニ際シ病ヲ制シ出會シタレモ唯々一隅ニ端坐ス
ルノ不快ヲ以テ終レリ」全經過中鼻及ヒ結膜加答兒欠
如シ譫語等人事不省ノ舉アラス唯以來十數日ハ氣管枝
加答兒ト体力疲勞ヲ遺殘スルノミナリキ

○第三患者(妹久尾七年四ヶ月)六月廿六日俄然惡寒ナ
ク發熱日夕四十度ニ達シ食欲欠亡全身倦怠頭痛烈シク
咽頭痛及ヒ咳嗽アレリ翌日諸症増惡熱殆ント同一廿七
日ハ日夕熱三十八度一分体力衰脱シ是ヨリ先キ發病ノ
時嘔吐數回アリ便秘シ且ツ三日ヲ經過スレハ羸瘦殊ニ
甚クシク四日間ニテハ体熱上昇セス一週日ニシテ咳嗽

ト疲勞トテ殘シ快癒ニ趣ムケリ前日子ニ於テ腦症劇シ
カラス惡寒鼻結膜症欠亡セリ

○第四患者(妻壽枝子十七年)妹久尾ト發病ノ日ナ同フ
シ日夕熱三十八度ニ達シ頭痛食思欠亡咳嗽全身疲勞ヲ
以テ臥シ下利數回ヲ發セリ然ルニ翌日暮ヲ拂ヒ只食欲
欠如ト全身ノ瘦羸ノ度甚タシキヲ遺シ治セリ

○第五患者(兒他行七ヶ月)六月廿七日偶然熱七昇三十
八度ニ達シ二日間持續シ頗ル安靜ナラス且ツ氣管枝炎
ノ爲ニ咳嗽ヲ發セリ併シ哺乳ノ度ハ僅ニ減退シタルノ
外毫モ異常ナクシテ快然タリ

○第六患者(父茂雄五十九年)六月廿八日發病第四患者
ト大同小異ナレハ特別ナル記載ヲ要セス只熱三十八度
前後ヲ以テ三日間持續スルノミ

○第七患者(母壽手四十五年)六月廿八日午後惡寒ヲ以
テ起リ頭痛甚タシカラス日夕熱三十九度ニ昇リ晚餐ヲ

絶々時々咳嗽發シ夜間安眠セリ翌廿九日朝熱三十八度
五分全身疲勞シテ起ツ能ハス鼻及ヒ涙液ヲ流シ下利一
日六回食欲全ク減退シ咳嗽頗發シ鼻咽氣管枝炎ノ特
徵次第ニ顯發シ日暮三十九度一分ニ達シタルニ當夜モ
安眠シ神徑症候ハ只僅カ頭痛ノ外現出セス体力甚タ疲
勞シタリ熱ハ三日間持續シ下利ハ四日間續キ漸次減數
シ殘遺症トシテ氣管枝加答兒消化不具体力衰脫アリ漸
ク七月廿日頃ニ恬然トシテ健康ニ復セリ

以上七名患者中第三第四第五第六ノ四名ハ十日計コシ
テ毫モ異常ナク健全ニ復セリ只第一第二第七患者ハ二
週日ニシテ漸ク平常ニ歸レリ

然レニ第四、五、六、ノ如キハ些少ノ氣管枝加答兒ト二
三日間ノ昇熱ヨリ異常ナキヲ以テ果シテ該病ナルヤ否
ヤヲ信スル能ハサルカ如シト雖ニ獨リ當地流行ノ猛勢
ナルト舉家類似症ヲ患フルトナ以テ該感冒ナラント推

斷セリ彼ノ第一患者ニ於テハ前章掲載スル概要自ニ適
 スルノ確實ナルト世間傳呼スル流行性症兆モ亦斯ノ如
 キ烈シキ病勢ハ稀有ナルヲ以テ直誠ニ該病ナランヲ
 確定セリ」此數患者ニ就テハ諸粘膜加苔兒中眼ノ結膜
 ハ加苔兒ヲ發セスノ充血ヲ以テ終リ亦第七患者ノ如キ
 神經病候ノ欠如スル者モアレリ加之一般日數ノ短小ナ
 ルト熱性等劇シカラサル割合ニ体力甚クシク衰脱セル
 ハ此七名患者ニ於テ親シク經驗スル處ナリ且ツ余カ前
 項ニ掲ケタル該病ノ要目ハ成書ニ依テ現ハシタル者ナ
 レトモ患者ノ病歴ヲ彼是對照スレハ或ハ一二ノ病兆
 ナ欠亡スルヲアレモ悉ク其類似症ニ非サルハナシ然レ
 モ一モ危險忌ムヘキ惡徵ナク老幼男女ナ同ハス純粹ニ
 快癒ニ趣キ不長ナル結果ヲ殘セシ者ナク殊ニ第三、四、
 五、六、七、ノ如キハ輕微ニシテ流行ナキ時期ニ於テハ
 該病ト信スル能ハサルカ獨リ第一、第二、少シシ傾首ス

ヘキ兆候トナスヘキカ如キヲ以テ少數ノ記事ナレモ聊
 カ病勢ノ猛烈ナラサル一端ヲ伺フニ足ラン焉

◎金澤地方ニ發見セル流行性感胃ニ就テ

會員 大木則雄記

今余ハ茲ニ特別ニ斯ル問題ヲ掲ケ出シテ當金澤地方ニ
 於ケル流行性感胃ノ報告ヲナスト雖トモ敢テ當地方ノ
 流行性感胃カ他諸邦ニ於ケル同症ヨリハ特異ナルヲ以
 テニアラス亦タ特ニ注目スヘキ點アルヲ以テニモアラ
 ス然シ一地方一流行毎ニ或ハ同一流行中ニアルモ各人
 各症ニ由テ症狀ニ多少輕重ノ差異アルハ一般ニ傳染性
 病ニ於テ免ル能ハサル處ノモノナルハ既ニ先輩諸氏ノ
 論シテ吾人ノ嘗テ疑ハサル處ナリ故ニ余ハ今茲ニ吾人
 カ當金澤地方ニ於テ實見セル流行性感胃症ノ症狀ヲ概
 記シ以テ明治廿三年ニ金澤地方ニ發見セル流行性感胃