

婦ノ頭部ヲ隨意ニ高クスルヲ得ルモノニ患婦ノ諸部ニ醫ハ容易ク達シ得ル機ニナシタル者ナリ又タ患婦ハ顔面ヲ露シテ陰部ヲ出スヲ耻ルカ故ニ布片ヲ天井ヨリ臺ノ中央ニ鈞張シ或ハ臺ニ附着シテ診察ノ際其顔面ヲ蓋フヘシ

第三腹部診

腹部診ハ腹部及ヒ胸部ヨリ診察スルノ法ニ之レ只腫瘍等著キ變化ノ存スルキニ利用スルモノナリ此法ニハ望診觸診打診聽診測診ノ五アリ然レモ打聽ノ二診ハ肺心ノ疾病ニ於ル如ク要用ナラス只特別ノ場合ニ用ルコアルノミ

〔甲〕望診 望診ヲナスニハ患婦ヲ起立或ハ仰臥セシメ衣帶ヲ緩徐ニシテ腹部ヲ露出シ体軀ノ形狀大小肥瘠特ニ脊椎彎曲ノ狀骨盤ノ大小形狀傾向骨部異常皮膚ノ色澤着色搔痕^液皮疹特ニ疥癬^{又ハ}藥白條ノ着色有^{及ヒ}直^チ腹筋ノ離開^ハ妊娠癍痕ノ有無^{及ヒ}其ノ新舊^{新キモノハ}大ニシテ赤色ヲ呈シ或ニ變^シ漸次收縮スルモノナリ之ヲ以テ妊娠ノ兆候トスレモ妊娠シテ半ニ至ラサレハ露レス又タ分娩シタル者ニ於ラモ欠亡スルコトアリクレデ氏

ノ説ニ由レハ百人中十人ハ欠亡スト而シテ妊娠ニ非ラサルモ腹部膨滿スル病ニ罹ルカ或ハ肥滿ニ由テ發スルコトアリ其部位ハ下腹ナルモ乳房大腿内側又時トメ腎部上脚内側下脚ニモ存在スルコトアリ乳房ノ形狀大小及ヒ緊張皮膚ノ緊張ニ由リ皮下結締織ノ減裂セシ者ナリ乳頭ノ形狀大小及ヒ緊張小サクシテ前方或ハ稍々上方ニ向フアリ大クシテ下方ニ向乳頭ノ發育及ヒ着色其他ヘルニア、膿瘍等ニ注目シ若シ腹部ニ腫瘍存スルハ其部位大小形狀及ヒ緊張ヲ診スヘシ而シテ之レ体位ニ從テ變位シ易キカ故ニ患婦ヲシテ一回ハ立位一回ハ臥位トシ診スルヲ要ス瘡セタル婦人ニ於テハ望診ノ功績多キモノニシテ腹壁薄キカ故ニ内部ノ腫瘍ヲ透見シ始テ妊娠セシ者ニ於テハ胎兒ノ部位等ヲ透見シ或ハ時トシ腹部内臟、脊椎及ヒ下腹動脈ノ搏動ヲ透見シ得ルコトアリ

(乙)觸診　觸診ニ於テハ其功績望診ヨリモ稍々多キ者ナリ然レモ單一ノ觸診ニ於テハ大ナル腫瘍ニアラサレハ十分ノ診斷ヲ成スコト克ハス故ニ婦人病學ニ於テ其要少キモノトス凡ソ觸診ヲ行フニハ患婦ヲ治療臺上ニ仰臥セシメ下脚ヲ少シク屈セシメ醫ハ其一側ニ立テ兩手ヲ預メ暖メ置キ決シテ寒冷ナルヘカラズナ平ニ腹部ニ當テ指端ヲ上向シテ肋下ヲ探リ又々下向シテ耻骨縫際部

ニ至リ又タ兩側ヲ診按スヘシ急頓ノ壓又タハ突ク此際腹部ニ硬結ヲ觸レ
如クナスヘカラス疼痛ノ部位ヲ認ムルハ更ニ其部ヲ綿蜜ニ診スルヲ要ス觸診ニ妨碍トナ
ル者ハ腹筋ノ緊張膀胱及ヒ直腸ノ膨滿トス故ニ預テ下劑ヲ服用セシメ或
ハ注腸法ヲ施シテ直腸ヲ空虚トシ又タ排尿セシムル乎或ハカテール目
的ニ用ルカテールハチ用テ膀胱ヲ空虚ナラシメ衣帶ヲ緩徐ニシテ治療
男性ノ者ヲ便利トス臺上ニ仰臥セシメ臺ノ後板ヲ少ク高クスルハ多少弛緩スヘシト雖モ尙
 才直腹筋緊張シテ腹部ヲ按シ難キハ對話ヲ爲シ患婦チシテ口ヲ開カシ
レ尙才患婦意ヲ腹部或ハ少ク位置ヲ變セシムヘシ此ノ如クシテ緊張尙才
ニ注クカ故ニ効ナシ止サルハクロトホルムヲ吸入セシメサルヘカラス邊ガル可ルテンハフ
 氏ハ鹽水ヲ膀胱ニ注入スルハ腹筋全ク弛緩スト云ヘリ此法モ亦タ試用
 シテ可ナリ觸診ニ由テ診シ得ル所ノ者ハ皮膚ノ水腫氣腫腹腔内腫瘍ナリ
 而シテ此腫瘍ハ腹壁ニ附着スルヤ或ハ腹膜内ニ存スルヤ將タ其外方ニ存ス
 ルヤヲ知ルニアリ腹壁ニ附着スル腫瘍ハ壁ノ運動ニ伴ヒ或ハ壁ト共ニ牽
 揚スルヲ得レト腹壁ニ關係セサルモノニ在テハ腹筋緊張スル時ニ於テ隱

匿シテ診スルヲ克ハス腹腔内ノ腫瘍ハ呼吸ニ依テ胸廓内ニ上下スルモノニシテ特ニ肝脾ノ腫瘍ニ於テ然リ然レモ子宮及ヒ卵巢ヨリ發生セル腫瘍ナル時ハ以上ノ内臓ト癒着シタル時ニノミ多少隨伴運動ヲ成スト雖モ否ラサル時ハ毫モ呼吸ニ關係スルヲナシ腹膜外ノ腫瘍ハ其位置ニ依テ預メ其發生器ヲ定メ得ル者ナリ即チ生殖器ヨリ發生セル者ハ總テ其根居ヲ骨盤内ニ存シ之レヨリ腹腔内ニ出ル者ニシテ子宮ニ屬スル腫瘍妊娠肥大、ハ中央ニ位シ卵巢ニ屬スルモノハ側方ニアルモノナリ己ニ其部位ヲ診定シ得タル時ハ其大小形狀、抵抗、運動及ヒ發生ノ遲速ニ注意ス可シ

〔丙〕打診　ハ只腫瘍ノ經界ヲ定ルニ止ル者ニシテ胸部ニ於ルカ如ク如何ノ疾病ナルヤヲ知ルハ少キ者トス〔打診ヲ行フニハ釵狀突起ヨリ耻骨縫際ニ至リ又タ乳線或ハ腋下線ニ沿フテ成シ或ハ臍ノ左右ニ於テ直線ニ行フ可シ以上ノ線ニ從ヒ打ツニ強弱ナカラシテ要ス弱ク打ツ時ハ表在腸内ノ瓦斯ヲ知ルト雖モ強ク打ツ時ハ腸ヲ壓シ下方ノ濁音ノミヲ知ルモノナリ故ニ内部ノ診斷ヲ爲スニハ其打法最モ巧ナルヲ要ス囊内液少キ時ハ或