

ニシテ一定ノ變化ナカルヘカラスト余ハ固ク信スルナリ然ルニ視官及ヒ腫孔ニ異常ナキ云々亦之レカ説チナスモノ稀レコシテ實驗上余ハ不幸モ未タ之カ變常アルヲ見ルヲ殆ント二十人患者中僅ニ二女子ノ之レアルコ過キサルノミナラス此變化ト雖モ確然之ニ因スルヤ否ヤニ至リテハ多少意見ナキ能ワサルモ余ハ未タ諸君ニ向テ公言説チナス能ワス遺憾ノ極益々進テ之カ研究ニ從事シ敢テ諸先生ノ高説ヲ質シ且ツ以テ深ク教示ヲ仰カントシテ已ム能ワサル以所ナリ乞フ諸老先生ヨ高説ト教示ヲ吝ムヲ勿ラゾトナ余モ亦今ヨリ一層注意シ疑團アフハ直ニ之ヲ諸君ニ報導シ以テ諸君ノ教示ヲ待ツトナ忘タラサルヘシ矣

(完)

＊妊娠中ノ惡性嘔吐

醫學士 山田謙治

第四高等中學校醫學部助手 竹腰慶三筆記

總テ妊娠ノ初期ニ於テハ消化器ノ障害ヲ起ス者ニシテ嗜好品變化シ之ニ加

フルニ平素攝取スル食物ノ嗅味二官ニ關スル異狀ヲ訴ヘ域ハ惡阻唾漏若クハ嘔吐ヲ起スヲ常ナク而シテ此嘔吐ハ苦痛ナク且ツ嘔吐運動ナクシテ早朝單性若クハ胆汁ヲ混シタル帶黃色ノ粘液多少ヲ嘔出ス此變化ハ妊婦ニ於テハ生理的ノ如ク精神上ノ變化ト同様神經々ノ障害ニ依ル者ニシテ其原因ハ小骨盤内ニ於テ子宮膨大シ壓迫シテ交感神經ヲ刺戟シ其作用一ハ神經々ニ變化ヲ及ホシ一ハ反射的ニ消化器ニ障害ヲ及ホス者ナラン故ニ子宮小骨盤内ニ占居シ殊ニ夜間睡眠中膀胱及ヒ直腸ヲ壓迫シ早朝離床后ニ嘔吐ヲ起スト云フ說アリ免ニ角此障害ハ二三ヶ月ニシテ消却スル者ナレハ妊娠ノ生理的作用トモ稱スヘクシテ深ク意トスルニ足ラサルナリ而シテ子宮大骨盤内ニ上昇スレハ嘔吐鎮靜ス又一ハ早朝ニ限ラス食后ニモ起ス處ノ嘔吐ハ稍惡性ナリト雖モ食物ノ一部ノミヲ吐出スルノミニシテ未タ食欲ニ變狀ナク全身ノ衰弱ヲ來スヲナケレハ少シシ攝生法ニ注意スルノミニニ足レリ予カ今述フル處ノ惡性嘔吐トハ甚タ頑固ナク徵候アル者ヲ指ス即チ嘔吐ハ容易ニ鎮靜スルヲナク且ツ食物ヲ吐出スルノミナ

ラス不斷惡阻ト嘔吐運動アリテ患婦ノ疲勞甚クシク全身漸次羸瘦シ舌乾燥シ呼氣惡息ヲ放ナテ胃ニ饑餓ヲ覺ヘ大便秘決シ稀レニ下痢シ尿ハ濃厚ニシテ褐色トナリ時々或ハ發熱シ人事不省トナリ甚シク唾漏チ來スニアリ遂ニ室扶斯狀或ハ肺結核ヲ呈シ死亡スヘキヲアル者ナリ

此惡性嘔吐發起ノ時期ハ生理的嘔吐ト異ニシテ一定セス或ハ初期ニ發スルアリ或ハ五六ヶ月ニ至テ初メテ發スルモノアリ而シテ其經過緩慢コシテ死ニ至ル迄ハ二三ヶ月ヲ要ス若シ治癒ニ赴クキハ俄然嘔吐鎮靜シテ快復スル者ナリ或ハ胎兒ノ死亡又ハ流産ニ由ルヲアリト雖モ或ハ亦不明ニシテ治スルヲアリ凡テ惡性嘔吐ハ稀有ノ病症ニシテ獨乙國ノ統計表ニモ其數甚少クEhne氏杯ハ此ノ如キ病症ハ全ク無シト迄斷言セシ程ナリ惡性嘔吐ノ原因ニ就テハ諸家大ニ其所見ヲ異ニシテ確定セスSchneider氏ハ羊膜水腫双胎兒等ニ因テ子宮過度ニ增大シ周圍ヲ壓迫スルヲ強キニ依ルト云ヒBennett氏ハ子宮若クハ子宮頭管ノ加答兒ニ歸シCruejehewitt氏ハ子宮ノ變位ニ歸シ又Lebert氏及Rosenthal氏ハ一種ノ神經障害ナトト云フカ如シ

今余カ診セシ婦人ハ齡三十四年ニシテ既ニ五回分娩シ妊娠中ハ每常初期ニ多少ノ消化器障害アリ惡阻及輕度ノ嘔吐ヲ發シダレヒ意ニ介セス二三ケ月ハ平易ニ經過セリト云フ最終ノ月經ハ四月九日ヨリ十二日迄ニシテ五月十五日ヨリ惡阻嘔吐ヲ發シ廿四五日ヨリ絶食シ藥液牛乳肉羹汁ヲモ嚥下スルヲ克ハス始終嘔吐運動アリテ單性或ハ時々胆汁ヲ混スル粘液ヲ吐シ時トシテ血液ヲ混セシヲアリ甚シキニ至リテハ一日十回モ嘔吐運動アリ甚タ苦悶ヲ訴ヘ全身羸瘦シテ呼氣惡臭アリ体温三十七度脈搏微細沈靜シテ僅ニ數フベシ百至ヲ算ス試ニ手診スルニ子宮ハ拳大ニシテ甚タ前屈シ膀胱ヲ壓迫セリ子宮ノ抗抵ハ稍柔軟ニシテ臍部ハ通常ノ者ニ比スレハ硬ク臍ハ充血ヲ呈シ通常分泌物アリ本患者ニ於テハ其原因子宮ノ強キ前屈ニ歸スルガ如シ

妊婦生理的ノ嘔吐ハ攝生ヲ專ラトシ食物及食法ヲ變シ轉地セシメ湯治ヲ行ハシムルト雖モ此レ等ノヲ頑固ナル嘔吐ニハ其効ナシ本患者ノ如キ藥液ヲ服用スル克ハサルノ時機ニ達スル者ニ於テハ素ヨリ此等ノ治法

ハ論外ナリ因テ体力ヲ保持セシムル爲メ肉羹汁ヲ滋養灌腸トシテ與ヘタルモ身体益衰弱シテ到底快復ノ見込ナク從テ正規分娩ヲ遂クルヲ克ハサルベシ此場合ニ於テ往々妊娠ヲ中止シテ流産セシムルノ一法アルノミ故ニ本患者ニ於テモ目下人工流産ヲ施スノ外術ナシ

人工流産ノ手術ハ既ニ太古未開ノ時ヨリ行ハレ彼ノ遠ク希臘時代ニ於テ骨盂狹窄ニ此術ヲ施コセリ然レ耶蘇教ノ傳播ト共ニ此術一時擯斥セラレテ只亞粒比亞人種中ニノミ行ハルヽトナレリ十七世紀ニ至リ復ヒ仁術トシテ償用スル者アリト雖モ普ク流行スルニ至ラズ千七百十七年ニ至リ英國ニ於テ *Williamovpe* 氏此術ヲ行ヒシ以來漸々獨佛ニ行ハレ近來普ク實行スルニ至レリ蓋シ母体ノ疾病危險ニ陥リ人工流産ヲ行フノ他救濟ノ道ナキ時ニ於テ此術ヲ行フハ決シ不仁ノ道ニ非ズ則チ此術ヲ施ス時ハ胎兒ヲ失フノミニシテ母体ヲ救助スルヲ得若シ之ヲ行ハサルハ胎兒ト共ニ母体モ死亡スルノ際ニ在テハ一人ヲ失フ乎二人ヲ失フ乎其何レカ正道ナルヤハ疑ヲ容レサル點ニシテ斯ノ如キ適應症ニ於テ此術ヲ行フヲ實ニ醫

家ノ義務ナリトス今本患者ノ如キハ實ニ此場合ニ居ル者ナリ

然_レ此術ヲ行フニ先ツテ尙ホ本人或ハ其夫ニ就テ該術ヲ施スベキヤ否ヤ
ヲ問フ_レ必要ナリトス何トナレハ他醫ニ治療ヲ托シ胎兒母体共ニ救助ス
ルノ道アルモ知ルベカラサルカ故ナリ實ニ此場合ハ困難ナル者ニシテ他
醫師ニモ謀リ患者及ヒ親戚ヨリ依託ヲ受ケテ而后施ス可キ者トス

人工流産ノ術ハ種々アリト雖モ最モ確實ニシテ最モ危險寡ナキハ消息子
挿入法ナリ故ニ予モ此術ヲ行ヘリ術后十二時間ニシテ陳痛ヲ起シ廿四時
間ニシテ出血シ四十時間ニシテ流産セリ

其産出スルヤ胎兒ハ身長三ノ五仙迷ニシテ臍帶ハ下方ニ在リテ三密迷位
ニテ裂ケ下腹ハ稍膨脹シ四肢ノ長サハ一仙迷ニシテ三部ニ區別セラレ指
及ヒ趾ハ五個ニ分裂セリ頭部ノ前後徑ハ一仙迷ニシテ耳ノ形跡ヲ存シ眼
ハ黑點トシテ認メ得ヘク鼻軟骨發生シ口ハ分裂シテ口唇發生セリ頸部ニ
顯裂アリ鎖骨未ク化骨セス胸部ニモ裂孔アリテ左右両室ニ分レタル心臓
ヲ見ル顔面ハ頭蓋ノ前方ニ突出シ下顎ハ化骨ヲ始メ頭ハ軟柔ナリ体量

此胎兒ハ二ヶ月ノ胎兒ニハ少シク太ク且ツ上下唇發育シ腸ハ臍帶下ニ露
ハレ指數分裂セルモ爪ナケレハ十週位ノ胎兒ト想定スヘキナリ
此ノ變化ノ階級ニ由テ動物ノ進化ヲ想像スルニ足ルヘシ

＊結核パチルレンノ略説

會 員 飯森益太郎

我醫學世紀ニ嶄然トシ頭角ヲ現シ永ク迷霧中ニ彷徨セシ處ノ結核ノ病理
ヲ瞭々火ヲ見ルヨリ易カラシメ病理學上ニ一大變動ヲ與ヘ赫々タル偉積
ヲ青史ニ輝スモノハ獨乙國醫科大學教授醫學博士「ローベルトコツホ」氏
Ce Robert Koch 其人ナリ氏ハ實ニ千八百八十二年ニ當リ結核ノ原因ハ一ノ桿
狀黴菌ニ因テ起ルト世ニ公言セシヨリ反對論者ハ種々ノ論難攻撃ヲ試ミ
クワリト雖モ氏ハ侃々諤々トシテ之ヲ辨駁シ今日ニ至リテハ結核ハ必ス結
核パチルレン「Tubercle Bacillen」ニ因テ起ル傳染病ナリトハ世人ノ信シテ疑ハ
サル處トナレリ