

## 剥脱性皮膚炎ノ二例

メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2017-10-04 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: メールアドレス: 所属:
URL	<a href="http://hdl.handle.net/2297/38331">http://hdl.handle.net/2297/38331</a>

ザル血液百二十瓦斗ヲ漏シ、内腔ヲ檢スルニ蒼白ナル肉芽様物ヲ以テ充滿シ骨端ハ著シク曝瀆セラル、試ニ其一部ヲ搔破セシニ、海綿様出血溢々トシテ止マズ、已ムヲ得ズ直チニ創口ヲ縫合シ、壓抵帶ヲ施シ、下脚ヲ高置セリ、

搔破セシ腫瘍ヲ鏡檢スルニ、毛細管擴張ヲ有スル紡錘形細胞肉腫ニシテ處々ニ巨態細胞ヲ混シ又色素沈着ヲ有セリ

其後内出血ハ停止セズシテ、大腿ノ腫脹、漸ク上進シ、遂ニ大腿上三分一部ニ達セシヲ以テ、切斷術ヲ施スノ他、已ムナキヲ諭セシト雖トモ肯セス、同月二十八日退院、約一ヶ月ノ後死亡セリト云フ、

要之、余ノ例ハ左大腿骨下端ヨリ生セシ Myxoid ノ關節ヲ侵セシモノニシテ結核ト誤診シ、沃度仿兒讓、グリスリン<sup>1</sup>ヲ注入セシ爲メ、肉腫組織ヲ破損シ、異常ノ出血ヲ來セシ稀有ノ例ナリトス、唯手術ヲ肯セザル爲メ、患部病的變化ノ詳細ナル記載ヲナス能ハザルハ憾トス、

● 剝脫性皮膚炎ノ二例

金城療病院皮梅毒 山田孝太郎

一 例 石川縣鹿島郡中野島村農 S、T、男、三十六年

父六十歳生存左肩關節慢性「ロイマチス」アリ母五十八歳生存スントモ六七年前ヨリ下肢ニ鈍痛アリ勞働スルコトヲ得ズ兄弟妹各一人健在、五子アリシモ二名死亡

患者七八歳ノトキ重症ノ麻疹ヲ經過シ十五六歳「スカビース」ニ罹ル二十歳ニ至ル迄ハ時々胃瘕ヲ患ヒ二十歳後ハ腰痛ノ癢アリ兵役義務ヲ經過シタリ淋病蠱毒ニ感染シタルコトナシ

三四年前ヨリ毎年十一月大阪ニ行キテ勞働シ翌年三月歸國ス昨年九月背部ニ「フルンケル」ヲ生ジ治後該部赤色ヲ殘シ時々癢痒アリ落屑スト云フ其當時ヨリ肛門亦癢痒アリ十一月十七日大阪ニ行キ南京蟲ニ螫サレタリ十二月上旬右腓腸部ニ癢痒アリ其部五厘貨大ノ部繻批狀ニ落屑セシモ「ワシツエ」ノ螫セシモノト思考セシニ入浴ノ際前記ノ背部ノ他右肩部ニモ掌大ノ赤斑ヲ存スルコトヲ注意セラレタリ爾來不明ノ日子ノ間ニ漸次蔓延シ本年三月ニハ大腿内側兩胸側橫腹部顔面手掌足蹠ヲ除キ其他ハ悉ク侵襲セラル、ニ至レリ三月二十日歸國シテ其前後毎日甚シキ惡寒アリ同月二十七日八時突

然全身猩紅熱様ノ發疹アリ數日ヲ經テ葉狀ニ甚シク落屑スト云フ

五月二日診 体格佳良營養モ甚シク侵サレズ全身皮膚中頰鼻隆及手指ノ掌側ヲ殘シ其他ハ悉ク犯サレ全身皮膚暗赤色ヲ呈シ灰白色葉狀ノ落屑片ヲ以テ被ラレ頭毛ハ稀粗トナリ白色ノ落屑片ヲ固着シ耳翼ハ滲潤腫脹シ數ケノ龜裂ヲ現ハシ肘關節腕關節膝關節周圍ニ龜裂アリ腋毛ハ全ク脫離シ陰毛亦減ス趾爪ハ營養ヲ失ヒ肥厚粗糙トナル

皮膚ノ溫度ハ亢進ス指壓ニヨリ全ク褪色セズ

肘腺ハ左一ヶ豌豆大、左頭鬚蠶豆大、左右脚腺鼠蹊腺數ヶ豌豆大ヨリ北海

道蠶豆大腫脹無痛  
自覺症、中等度ノ癢痒、起坐時臀部ノ痛、屈伸時肘膝部ノ痛、一般乾燥緊張ノ感、眼及口ノ閉閉較困難此他全身倦怠時トシテ眩暈アリ、粘膜ニ變化

ナシ、尿中糖及蛋白ナシ

經過及治療、亞砒酸内服、ツイルソソ氏軟膏外用全身繃帶、毎日繃帶交換ニ際シ剝脱スル落屑片九〇、〇乃至一〇〇、〇四日目ヨリ落屑片減少シ漸次非茫且ツ小トナリ五月二十日ニハ最初ノ十分ノ一以下ニ減シ紅色モ亦褪色ス、熱ハ入院當時三十八度五分ニ昇リシモ三日目ヨリ夕熱三十七度四分又ハ五分ニ止マリ目下ハ夕熱六、六七分ニ止マル

## 二例

越中東礪波郡東野尻村農 眞、K、女、四十四年

四子ヲ産シ皆健全

昨四十二年一月右腕關節腫脹疼痛ヲ發シ漸次諸關節ヲ侵襲シタリ六月心臟病ノ診ノ下ニ全身浮腫シタリ昨年五月顔面殊ニ前額及口圍暗黑色ニ變シタルコトヲ知リシガ九月ニ至リ大腿内側腰部ニ赤斑ヲ生ジ甚シク癢痒アリ搔把スルハ鱗屑剝離シ其後漸次蔓延シ毎日惡寒アリ本年春以來肘腺鼠蹊腺ノ腫脹發見シタリト云フ

四十四年三月六日診、羸瘦貧血惡液質ヲ呈シ脉九十六熱三十七、八

顔面ハ汚穢黃色ヲ呈シ眼圍口圍前額ハ散在性ニ暗黑色ヲ呈シ殊ニ前頭髮際ハ著シク汚垢ヲ堆積スルガ如シ齒齦口蓋額粘膜著明ニ暗色ヲ呈ス、軀幹及頸圍ハ兩肩部ト胸ノ一部ヲ殘シ其他ハ色素沈着シテ暗黑色ヲ呈シ皮膚ハ乾燥粗粒トナリ糠秕狀ノ落屑ヲ被リ其比較的變化少ナキ胸ノ一部モ散在性ニ小粟大疹ノ集合ニヨリ多形性ノ板ヲ形成シ板ノ周圍ハ不正ニ色素沈着ス疹ハ水泡膿胞ヲ造ラズ其形圓錐形ニシテ僅ニ皮膚ヨリ隆起スルノミ毛囊ニ一致スルモノトセザルモノトアリ多クハ鱗屑ヲ被ラス下腹部ヨリ陰部及大腿内側ニ渡リテ一様ニ暗黑色ヲ呈シ皮膚粗粒トナリ髻部ヨリ薦骨部

ハ最モ著シク灰白色葉狀ノ落屑片ヲ被ル

上肢モ亦部位ヲ撰ハズ粟大ノ疹諸處ニ集合シ其周圍ハ色素沈着シ肘ノ伸側ハ厚キ落屑片ヲ附着シ龜裂ヲ生ズ腕關節ハ左右共ニ腫脹シ運動ニヨリ痛アリ手掌ハ皮膚肥厚シ乾燥粗粒トナリ恰モ松樹皮ノ如ク數クノ龜裂アリ指背モ同様ノ變化ヲ見ル

下肢ハ最モ變化ナキモ部位ヲ撰ハズ色素沈着シ足趾皮膚肥厚龜裂ヲ現ハス頭毛稀粗トナリ後頭ヨリ項部ハ灰白色ノ落屑片ヲ固着ス、爪ハ一般ニ粗粒トナル

肘腺頸腺鼠蹊腺ハ櫻實大ヨリ鳩卵大ニ達シ彈力性硬度ヲ有シ癒着セズ腰痛ナシ、心音不純、全胸「ギーメン」ヲ聽ク

自覺症、身体倦怠關節運動時ノ疼痛ト癢痒ニシテ癢痒ノ爲メニ晝夜安眠スルコトヲ得ズ寒熱往來ス

經過及治療、疲倦シ長時間ノ起立ニ堪ヘズ且ツ癢痒劇甚ナルヲ以テ全身二〇%カルボールメントール「亞鉛花」リニメント「チ塗布セシム、亞砒酸内服、入院後毎日夕熱三八、二分以上ニ昇リ第六日目ハ九、五分ニ上リ八日目事故退院其後ノ經過ヲ知ル能ハザレドモ恐クハ漸次衰弱増加セシコトナラン抑ク剝脱性皮膚炎トハ急性亞急性稀ニ慢性ニ皮膚潮紅シテ落屑シ經過ノ長ナルモノヲ云ヒヘブラ氏赤色糠秕疹トハ慢性ニ經過シ只皮膚ニ潮紅ト落屑トヲ呈シ終ニ皮膚萎縮シ無痛性淋巴腺腫ヲ發シ徐々ニ衰弱スルモノヲ云フコノ定義ニ從フトキハ第一例ハ成人剝脱性皮膚炎ニシテ第二例ハヘブラ氏赤色糠秕疹ニ一致ス只其胸部及四肢ニ存スル苔癬樣變化ヲ存スルヲ以テ異ナリトスレドモ總テノ症狀ヲ總合スルトキハ尖銳赤色苔癬ト診スベキ理由

少ナシ寧ロ赤色糠枇疹ト診スルヲ適當ト思考セリ

前述ノ如ク剝脫性皮膚炎ト赤色糠枇疹トハ共ニ潮紅落屑ト云フ兩種ノ症候ヲ共有シ病理解剖上何等特殊ノ点ヲ有セザルヲ以テ兩種ヲ同様ト見做ス人少ナカラズ今諸家ノ説ヲ記スレハ

プロツク氏ハ剝脫性皮膚炎ヲ五種ニ區別シ

(1)、急性良性剝脫性皮膚炎一名猩紅熱樣落屑性紅斑

(2)、亞急性剝脫性皮膚炎

(3)、慢性全身剝脫性皮膚炎

(4)、ヘブラ氏赤色糠枇疹

(5)、亞急性慢性良性赤色糠枇疹

トナシ

ペンエー氏ハ(1)原發性落屑性紅皮症(2)續發性落屑性紅皮症ノ二種ニ分テ後者ハ他ノ皮膚病ニ續發スルモノトナシ、テレーク氏ハ

(1)、急性及亞急性剝脫性紅皮症

イ、急性剝脫性皮膚炎

ロ、亞急性剝脫性皮膚炎

ハ、亞急性紅色糠枇疹

(2)、慢性剝脫性紅皮症

イ、ヘブラ氏赤色糠枇疹

ロ、慢性剝脫性皮膚炎

トニ區別セリ

之ヲ要スルニ諸大家ノ區別ハ其經過ト豫後ノ良否ニヨルモノ、如シ蓋シ其原因同一ナリト雖モ發症ノ点ナルモノ比々皆然リ又其經過ニ良否アルハ各病然リトスコレ予ガ兩者ヲ同名ノ下ニ報告スル所以ナリ

第一例ハ前臍下腿ニ豌豆大赤斑數ケヲ散在スルノミ其他全身皮膚色尋常ニ復シ落屑ヲ生セズ六月二日退院セリ

### 喉頭乳嘴腫ニ就テ及其治驗

富山市加納耳鼻咽喉科醫院 加納景成

喉頭ノ良性腫瘍中屢々來ルモノヲ乳嘴腫トス、單發若クハ多發ス、此他「パピテルミー」(厚皮症)モ亦發生上本腫瘍ト同様ニ見ナサル即チ瀰蔓性ニ來ルヲ「パピテルミー」トシ其限局セルヲ「パピローム」トス、發生部位ハ聲帶ノ前隅ヨリ後部ニ向テ隨所ニ好發シ、其色帶赤灰白色ニシテ表面凹凸アリ莓實又ハ鷄冠狀ヲ呈ス、大サハ粟粒大乃至豌豆大又ハヨリ以上ニ達スルコトアリ、本腫瘍ハ前述ノ如ク喉頭良性腫瘍中屢々見ルモノニテ歐米ノ報告少カラズト雖、本邦ニ於ケルモノハ甚ダ少數ナリ、試ニ最近十五年間(明治二十八年以後)ノ報告ニ徵スルモ僅ニ數例アルニ過ギズ、(多發性ノ醫事新聞「田代博士及單發ノ耳鼻咽喉科學會雜誌」大久保氏ノ報告アリ)蓋シ本腫瘍ノ少ナキニ非ズシテ、部位ノ關係上不知ノ裡ニ看過サル、カ、若クハ完治セルモノ少ナキニ由ルナラン乎、今本腫瘍ニ因ル官能障礙ヲ述ブルニ當リ、聲音嚙嘶(高度ナレバ無聲)ノ發生機轉ニ就テ畧言センニ、聲音ノ發生点ナル聲帶(眞)ハ造構上一ノ粘膜皺襞ニシテ内ニ多量ノ彈力纖維ヲ含ミ、他喉頭域内ノ頸毛圓柱狀上皮ヲ被ムルニ反シ聲帶面ハ扁平上皮ヲ備フ此ノ聲帶ト兩披裂軟骨及附隨小軟骨間ニ形成サル、畧三角形ノ空間ヲ名ケテ聲門ト云ヒ、其前部即兩聲帶間ハ發聲時ニ密閉サン此レヲ發聲部ト唱ヘ後部ハ開放サン此レヲ呼吸部ト稱ス、而シテ此發聲部ノ閉鎖密着換言セ