

喉頭乳嘴腫ニ就テ及其治驗

メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2017-10-04 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: メールアドレス: 所属:
URL	http://hdl.handle.net/2297/38332

少ナシ寧ロ赤色糠枇疹ト診スルヲ適當ト思考セリ

前述ノ如ク剝脫性皮膚炎ト赤色糠枇疹トハ共ニ潮紅落屑ト云フ兩種ノ症候ヲ共有シ病理解剖上何等特殊ノ点ヲ有セザルヲ以テ兩種ヲ同様ト見做ス人少ナカラズ今諸家ノ説ヲ記スレハ

プロツク氏ハ剝脫性皮膚炎ヲ五種ニ區別シ

(1)、急性良性剝脫性皮膚炎一名猩紅熱様落屑性紅斑

(2)、亞急性剝脫性皮膚炎

(3)、慢性全身剝脫性皮膚炎

(4)、ヘブラ氏赤色糠枇疹

(5)、亞急性慢性良性赤色糠枇疹

トナシ

ペンエー氏ハ(1)原發性落屑性紅皮症(2)續發性落屑性紅皮症ノ二種ニ分テ後者ハ他ノ皮膚病ニ續發スルモノトナシ、テレーク氏ハ

(1)、急性及亞急性剝脫性紅皮症

イ、急性剝脫性皮膚炎

ロ、亞急性剝脫性皮膚炎

ハ、亞急性紅色糠枇疹

(2)、慢性剝脫性紅皮症

イ、ヘブラ氏赤色糠枇疹

ロ、慢性剝脫性皮膚炎

トニ區別セリ

之ヲ要スルニ諸大家ノ區別ハ其經過ト豫後ノ良否ニヨルモノ、如シ蓋シ其原因同一ナリト雖モ發症ノ点ナルモノ比々皆然リ又其經過ニ良否アルハ各病然リトスコレ予ガ兩者ヲ同名ノ下ニ報告スル所以ナリ

第一例ハ前臍下腿ニ豌豆大赤斑數ケヲ散在スルノミ其他全身皮膚色尋常ニ復シ落屑ヲ生セズ六月二日退院セリ

喉頭乳嘴腫ニ就テ及其治驗

富山市加納耳鼻咽喉科醫院 加納景成

喉頭ノ良性腫瘍中屢々來ルモノヲ乳嘴腫トス、單發若クハ多發ス、此他「パピルミー」(厚皮症)モ亦發生上本腫瘍ト同様ニ見ナサル即チ瀰蔓性ニ來ルヲ「パピタルミー」トシ其限局セルヲ「パピローム」トス、發生部位ハ聲帶ノ前隅ヨリ後部ニ向テ隨所ニ好發シ、其色帶赤灰白色ニシテ表面凹凸アリ莓實又ハ鷄冠狀ヲ呈ス、大サハ粟粒大乃至豌豆大又ハヨリ以上ニ達スルコトアリ、本腫瘍ハ前述ノ如ク喉頭良性腫瘍中屢々見ルモノニテ歐米ノ報告少カラズト雖、本邦ニ於ケルモノハ甚ダ少數ナリ、試ニ最近十五年間(明治二十八年以後)ノ報告ニ徵スルモ僅ニ數例アルニ過ギズ、(多發性ノ醫事新聞「田代博士及單發ノ耳鼻咽喉科學會雜誌」大久保氏ノ報告アリ)蓋シ本腫瘍ノ少ナキニ非ズシテ、部位ノ關係上不知ノ裡ニ看過サル、カ、若クハ完治セルモノ少ナキニ由ルナラン乎、今本腫瘍ニ因ル官能障礙ヲ述ブルニ當リ、聲音嚙嘶(高度ナレバ無聲)ノ發生機轉ニ就テ畧言センニ、聲音ノ發生点タル聲帶(眞)ハ造構上一ノ粘膜皺襞ニシテ内ニ多量ノ彈力纖維ヲ含ミ、他喉頭域内ノ頸毛圓柱狀上皮ヲ被ムルニ反シ聲帶面ハ扁平上皮ヲ備フ此ノ聲帶ト兩披裂軟骨及附隨小軟骨間ニ形成サル、畧三角形ノ空間ヲ名ケテ聲門ト云ヒ、其前部即兩聲帶間ハ發聲時ニ密閉サン此レヲ發聲部ト唱ヘ後部ハ開放サン此レヲ呼吸部ト稱ス、而シテ此發聲部ノ閉鎖密着換言セ

ハ兩聲帶ノ正中線運動及震動(波動)ガ直接、間接ニ妨ゲラル、場合ニ聲音嘔嘶ガ來ル、中樞性例ハ、腦脊髓疾患ニ基因スルモノヲ除キ末梢性ニ大別スレバ嘔嘶ハ

一、聲帶ヲ支配スル神經及筋肉ノ麻痺障礙 例ヘバ廻歸神經麻痺ノ際聲帶ハ閉閉ノ中間位即屍體位ニ固定シ、後筋麻痺ニ有テハ兩聲帶間ニ間隙ヲ殘スガ如キ等

二、聲帶ノ實質的變化若クハ癍痕結成 炎性腫脹、肥厚、創後ノ癍痕結成等震動ノ妨ゲラル、場合

三、聲帶ノ閉閉運動ガ器械的ニ妨ゲラル、トキ 聲帶自己ニ發生セル腫瘍、若クハ附近ニ發生セル腫瘍ノ嵌入、近圍組織ノ癍痕牽縮等

ノ場合ニ來ルモノニシテ、本腫瘍ニ因ル官能障礙亦上述第三者(時トシテ一、二者ヲ併合ス)ノ場合ニ於ケル聲音ノ嘔嘶ヲ以テ主トシ、時々咳嗽略痰ヲ併發スルコトアリ、其ノ異常ニ大ナルモノ又ハ多發スルモノニ有テハ呼吸障礙ヲ來シ或ハ窒息死ヲ招クコトアリ

治驗、富山縣上新川郡〇〇町 患者某男子、三十五年

既往症、生來健、幼時種痘麻診經過、近時眼疾ニ因リ醫治ヲ受ケタル外著患ナク、血族ニ遺傳的疾患ナシ

病歴、二年前即チ一昨々年四月頃ヨリ認ムベキ原因ナクシテ徐々ニ聲音ノ嘔嘶ヲ來シ、昨年七月上旬頃迄時々消長アリ、同月中旬頃漸進シテ談話殆ンド不能トナレルニ因リ醫治ヲ受ク、同年十月下旬來院治テ乞フ

現症、體格營養中等、高度ノ聲音嘔嘶アリ談話殆ント不能、熱候ナシ、胸腹部理學的検査變狀ヲ認メズ、口腔異常ナク、咽頭粘膜稍ク充血セリ

喉頭鏡検査ヲ行フニ會厭斜位ヲ呈シ、前半部ノ鏡檢稍ク明瞭ヲ缺クニ因リ「キリアン」位ヲ取ラシメ「ルブリンスキー」ヲ用ヒテ檢スルニ、聲帶ノ前隅部即チ兩聲帶ノ前端ニ滲リ小豆大ノ帶赤灰白色ニシテ表面粗ナル小腫瘍ヲ認メ、其基底ハ中腹ヨリモ稍ク小サク、消息子ニ因テ中等度ノ硬サヲ觸知シ僅ニ移動シ得

全十一月上旬局所麻酔ノ下ニ喉頭内摘出術ヲ施スコト前後二回、全部ヲ除去セリ、(喉頭鉗子及自案蹄系ヲ用フ)術後ノ經過良好、十餘日ニシテ聲音舊ニ復シ毫モ談話障礙ヲ認メザルニ至レリ

摘出セル腫瘍ハ知人ニ托シ切片標本トナシ、鏡檢スルニ樹枝狀結構組織、上皮ノ暴殖等乳嘴腫ナルコトヲ確定シ得タリ(標本供覽)

終リニ余ハ頑固ナル聲音嘔嘶アル場合、常ニ聲帶ノ良性腫瘍ノ忘ルベカラザルモノ、一ナルコト及毎候喉頭鏡検査ノ勵行サレンコトヲ望ム

● 定期性四肢麻痺

金澤病院神經科 福田 美 明

定期性四肢麻痺ハ成書ニヨル時ハ稀有ノ疾病ニシテ文獻モ亦多數ナラザルガ如シ予等ハ昨年來金澤病院神經科外來ニ於テ三名ノ同病患者ニ相遇セリ今本病ノ一般學說及ビ文獻ヲ略記シ終リニ予ガ例ヲ述ベテ大方諸賢ノ教示ヲ乞ハムト欲ス

定期性四肢麻痺タルヤオスラー氏內科書ガワロ―氏及ヒオッペンハイム氏神