乳兒期ニ於ケル所謂脾疳ニ就テ

メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2017-10-04 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: 岡本, 京太郎 メールアドレス: 所属:
URL	http://hdl.handle.net/2297/38373

乳兒期ニ於ケル所謂脾疳ニ就テ

岡本京太郎

私ハ一昨年來所謂脾病症狀ヲ有スル乳兒ヲ四例實見致シマシタ、ソノ第一例　ハ山田某ト申ス三ケ月ノ男兒デ農家ノモノデアリマス、豫定ノ時日ヨリ二十日許リ早ク生レタカ併シ十分ニ哺乳シ活潑ニ號位シテ大サニ於テモ他ノ初生兒ニ劣ラナカツタソーデアリマス、生後三週間ハ母乳デ養ハレマシタガ其後ハ全ク米粉汁ノミデ育テ居リマシタ、所カ便通ニハ別ニ著シキ變動ガナク只其量ト硬サヲ增シタ許デアルガ、子供ノ樣子ハ不安トナリマシテ二十日程前カラ持續的ニ中等度ノ熱ト咳嗽ガ出テ聲音ガ嗄嘶シテ參リマシタ、又始メ毎日千五百立方仙迷モ取テ居ツタ米粉汁ヲ漸次呑マヌ樣ニナリマシテ昨今ハ辛シテ四百立方仙迷位シカ取リ得ヌ樣ニナリマシタ、其他十日以來毎晩號泣發作ガアル又熱ノ出タ時分カラ患兒ノ兩眼外皆ガ潮紅シテ居マシタガ近來右眼瞼カ腫脹シテ其角膜ガ白クナツタト云フコトデス、夫レニ尿利ハ稍減少シテ嘔吐ハ一回モナイト斯フ云フ餘往症デ四拾二年ノ七月二十七日ニ診察ヲ受ケニ來タノデアリマス、」患兒ハ一見羸瘦シテ顏色ハ蒼白、皮膚ハ浮腫狀ヲ呈シテ兩眼ニ結膜及角膜ノ「キセローシス」ガアリ左眼ハ其上ニ「ケラトマラチー」ニナツテ居ル、大顖門ハ少シク陷凹シテ頰ハ垂頰ノ形ヲナシ口粘膜ハ乾燥シテ舌ハ白苔ヲ帶ビテ居ル、腹壁ハ甚タ弛緩シテ腸蹠系ハ觸レ易イ、肝臟ハ稍小サクテ硬ク脾臟ハ觸レマセナンダ、臀部及大腿ノ內側ニ上皮層片ヲ有スル紅斑ガアル、腺デハ只鼠蹊腺ガ僅ニ腫脹スルバカリデ肺ニハ呼吸音ノ粗裂ト僅ノ笛聲ガアル他ニハ異常ヲ認メヌ、心音ハ高調デ清イ、大便ハ有形淡黃デ酸性ヲ呈シテ居リ、尿ハ藁黃透明酸性デ蛋白及糖ハナイカ「インヂカン」ハ陽性デアル、體重ハ三千五百三十瓦シカアリマセヌ」依テ米粉汁ヲ止メテ「コンデンスミルク」ニ代ヘマシテ肝油ヤ「カンフル」ヲ與ヘタ所ガ、二日ノ後ニ患兒ハ安靜トナリマシテ夜泣ハ少クナリ顖門ノ陷沒モ腹壁ノ弛緩モ減シマシタ、脈ハ強クナリ食思モ佳良トナリ「キセローシス」モ輕快ニ向ヒマシタガ左角膜ダケハ潰瘍ニナツテ仕舞マシタ、

第二例　ハ村井某ト云フ四ケ月ノ女兒デ仕立職人ノ子デアリマス、生來米粉汁ノミデ養ハレテ居マシタガ外觀上克ク生長致シマシテ大便モ一日三回位黃金色軟膏稠度ノ工合ノヨイノガ出テ、嘔吐モ下痢モアリマセヌデ安靜ニ育ツテ居タソーデスガ、六月ノ三十日ニ1/2ノ牛乳ヲ與ヘマシタ所ロ、急ニ熱ガ出テ大便ガ青クナツテ、ソーシテ目ヲ廻シタ（眼球上竄）カラ直樣牛乳ヲ止メテ前ノ通リ米粉汁ノミニ致シマシタガ尙時々一過性ニ熱ガ出タリ大便ガ青クナツタリスルノミナラズ、夫カラ子供ノ食慾ガ減ジマシテ嚥下スル際ニ咳ガ出ル樣ニナリ且ツ無慾狀嗜眠狀ニナツテ七月ノ四日ニ又再ビ子癇發作ガ起ツタソーデアリマス、其時診察致シマシタ同僚ノ話デハ熱ガ三十九度五分アツテ呼吸困難眼球上竄ナドノ症狀ガアツタト云フコトデアリマス、私ハ此子癇發作カラ二時間後ニ見タノデアリマスガ、患兒ノ皮膚ハ蒼白デ稍朽葉黃色ヲ帶テ居ル、顏面前膊及下脾ニ著明ノ浮腫ガアリマシテ頰ハ垂頰デ「ペルガメント」樣ノ光澤ヲ放テ居リマス、之ニ反シテ軀幹ハ著ク羸瘦シマシテ眼ハ醒覺時ニ於テモ閉鎖シテ兩方トモ結膜角膜ノ乾燥症ヲ有シテ居リマス、兩口角ニハ「ラガーデン」ガアリマシテ口內ノ粘膜ハ乾燥シテ居ル、腹部ハ中等度ニ膨隆スルニモ拘ラス腹壁ハ弛緩シテ teig.g ニ感シマス、肝臟ハ比較的大キクテ硬イ脾臟ハ觸レヌ腎臟ハ殆ント普通ノ大サノ樣ニ思ハレマシタ(?)、心音ハ强クテ稍不純デアリ肺ニハ格別ノ變狀ハアリマセヌ、四肢ノ筋ハ稍 derb ニ觸レル膝蓋腱反跡ハ通常デアリマス、脈搏ハ百三十八デ不整デナイ呼吸モ亦整然トシテ二十七ヲ算ヘマシタ、熱ハ更ニアリマセヌ、聲音ハ低クナツテ居ルカ眞ノ嗄嘶ハアリマセヌ、其他嘔吐モナク

「チアノーゼ」モ見ヘマセヌ、淋巴腺ノ腫起シタモノハ一ツモ觸レマセンデシタ、其際尿ヤ大便ヲ檢スルコトガ出來マセヌデシタカラ同僚ト謀テ實芰浸、酢剝、「カンフル」等ヲ與ヘマシテ、榮養ハヤハリ米粉汁ノミニシテ置キマシタ、其後三日目ニ母ガ大小便ヲ持テ參リマシタカラ檢査致シマシタ所ガ、糞ハ帶褐黃色濃粥狀デ酸性デ、ソーシテ糞臭ガ少イ粘液ヤ顆粒ハアリマセヌカ澱粉反應ガ著明デアル、氣中ニ放置スレハ綠色ニ變シマス鏡檢上ニハ多數ノ澱紛粒片、鵞口瘡樣菌、圓形細胞、植物細胞、多數ノグラム陰性菌カ見ヘマス、尿ハ藁黃色デ著シ混濁シテ居マス、弱酸性デアリマスガ四時間ノ後ニハ既ニ强度ノ亞爾加里性トナリマシタ、蛋白ハエスバ　ハ氏法ニテ一‰ヲ含ンテ居マス、糖ハアリマセヌ鏡檢上ニハ多數ノ膿球、「スタヒルコツケン」、「ストレプトコツケン」、僅ノ卵圓形ノ上皮、硝子圓柱、及顆粒圓柱ガアリマシタ夫カラ七日ノ午後ニ又診察致シマシタカ、某時ハ熱ガ三十九度デ口內ニハ鵞口瘡ガアリ左角膜ハ壞疽ニ陷テ右角膜モ軟化ヲ始メテ居リマス、両腎共ニ增大シテ居マシタ、ソコデ乳兒脾疳或ハ Reisnährschaden 兼膀胱腎孟腎炎ト診斷致シマシテ、實芰浸、「サロール」、肝油ナドヲ投シマシタ、ソーシテ榮養ハ母ノ希望ニ從テ矢張米粉汁ノミニシテ置キマシタ、所カ七月八日ニハ熱ガ下リマシテ九日ニハ食思カ佳良脉モ强實トナツテ百二十至ヲ算ヘマス体溫ハ三十六度八分デ腹部ノ弛緩モ浮腫モ減シマシテ精神モ稍透明ニナリマシタガ右角膜ハ又遂ニ壞疽ニ陷リマシタ、而ノ十日カラ又少ク熱ガ現ハレマシテ十二日ニハ両方ノ虹彩脫出ヲ來シマシタカラ、全身狀態ハ左程惡クナツタ樣ニモ見ヘマセナンダガ試ニ米粉汁ノ外ニ每日牛乳百立方仙迷ヲ與フルコトニ致シマシタ、所ガ全身狀態ガ一層惡クナリマシテ七月十五日ニ呼吸困難、脉搏細弱トナツテ遂ニ死亡致シマシタ、

第三例　ハ谷內某ト申ス六ケ月ノ男兒デ正規ノ時日ヲ經テ健康ニ生レタノデアリマスガ、母乳不足ノ爲メ始メ三週間ハ「コンデンスミルク」ヲ足シテ居タソーデスガ、三週後ニ母乳全ク出ナクナツタ故二百立方仙迷ノ米煎汁ニ一茶匕ノ「コンデンスミルク」ヲ加ヘテ養フコトニシタノデアリマス、夫デ以テ他ノ健康兒ヨリ劣テハ居タガ併シ次第ニ發育スル樣ニ見ヘマシテ、特ニ大便ノ都合ガヨク一日一回位軟膏稠度ノモノカ出タソーテス、六月ノ中頃ニ「コンデスミルク」ノ代リニ米煎汁ニ牛乳ヲ加ヘテ見タトコロガ、直ニ强度ノ下痢ヲ來シマシテ一日僅カ百立方仙迷位ノ少量ヲ以テシテモ尙下痢ヲ招キマシタ故再ヒ前ノ如ク米煎汁ト「コンデンスミルク」ヲ以テ養フコトニ致シマシタ、夫デ彼ノ下利ナドノ消化變狀ハ速ニ無クナツテ仕舞マシタカ生長ガドーモ思ハシク行カナイ所カラ、七月五日ニ到リ再ヒ彼ノ「コンデンスミルク」ヲ牛乳ニ代ヘテ見マシタ勿論米煎汁ハ前ノ通ニヤツテ居タノデアリマス、所ガ今度モ矢張下痢ガ起テ一日四回位水樣便ヲ出シ哺乳量ハ減少セヌニモ拘ラス益羸瘦シテ來ルト云フノデ、七月二十九日ニ診療ヲ乞フタノデアリマス、但シ嘔吐ヤ發熱ハ一度モナカツタ樣ニ申シテ居マシタ」、其時ノ狀態ハ比較的矮小ナ兒デアリマシテ、皮下脂肪ハ中等度ニ存シテ皮膚ハ着ク乾燥セス、頭部ハ比較的大デ顱門ハ陷沒シテ居ナイ、腹部ハ中等大ニ膨隆シテ稍弛緩シテ居ル、肝臟ノ下緣ハ乳線ニ於テ助骨弓下一指半徑ニ位シテ質ハ尋常デアル、脾臟ハ僅ニ觸ルヽコトガ出來、膕蹄系ハ常態デアリマス心音ハ淸ク高調デ境界ニ變常ハナイ、肺ニハ所々「ギーメン」ヲ聽ク許デアリマス、頸部及耳後ノ水脉腺ハ豌豆大ニ腫大シテ居マシタ、其他聲音嗄嘶、「チアノーゼ」等ハアリマセヌ、呼吸ハ促迫シテ居ナイ、脉ハ醒覺時百三十八至ヲ算ヘテ整且ツ實デアル、體溫ハ三十七度六分體重ハ五千百七十五瓦デアリマシタ、大便ハ鮮黃濃粥狀デ酸性ヲ呈シ酪酸臭ヲ帶ビテ居ル平等ニ同質デ粘液ハアリマセヌ、澱粉反應ハ著明デアルカ鏡檢上ニハ差シタル異常物ヲ認メマセヌ、尿ハ水樣弱酸性デ蛋白、糖幷ニ「アセトン」反應ナドハアリマセナンダ、此際携帶シテ居タ常用ノ米煎汁ハ普通ノ「ウロメー

テル」其比重ヲ計ルコトカ出來ヌホド甚タ濃厚ナモノデアリマシタ、依テ Reisnährschaden ト診斷致シマシテ、藥劑トシテハ單ニ稀鹽酸百布聖ヲ與ヘマシテ米煎ノ濃度ヲ著シク稀薄ニシ「コンデンスミルク」ノ量ヲ漸次增加スル樣ニ命シテ置キマシタカ、次第ニ輕快致シマシテ八月ノ三日ニハ既ニ體重五千三百二十五瓦ニ上リ八月七日ニ至リ體格ノ矮小ヲ除クノ外ハ異狀ノナイ樣ニ見ヘマシタノデ休藥致シマシタ、

然ルニ同年九月二十三日ニ再ヒ其兒ヲ連レテ參リマシテ申シマスニハ、其後ハ幸ニ健康デアリマシテ同ク米煎汁、「コンデンスミルク」（一日全量五茶匕）榮養ノ下ニ漸次發育シテ居リマシタガ、數日前頭部ニ大ナル皮下膿瘍ガ二三個現ハレマシタ故胎毒ト考ヘテ所謂「胎毒下シ」ナル或ル民間藥ヲ與ヘマシタ、所ガ下痢始リマシテ一日五回モ液狀便ヲ漏ス樣ニナリマシタト訴ヘテ來タノデアリマス、但シ其外ニハ格別ノ變狀ガナク嘔吐ハ「コンデンスミルク」ノ量サヘ增サヲハ起ラス、尿利ハ通常デ熱ヤ浮腫ヤ又ハ聲音嗄嘶ヤ眼脂、腹滿等ノ症狀カナイト云フテ居マス、依テ「胎毒下シ」ヲ與フルコトヲ禁シマシテ稀鹽酸、百布聖ナドヲ投シマシタガ翌二十四日ニ尙下痢便ガ四回アツテ氣分ガ惡ク嘔吐ガ加ハリ體溫ガ三十七度七分ヲ示シテ居マシタカラ「サロール」硝菅ナドヲ加ヘマシタ、而ルニ二十六日ノ朝突然眼球上竄、四肢弛緩ナドノ腦的現象ヲ呈シマシタガ大便排出ト共ニ直ク緩解致シタソーデアリマス、嘔吐下痢ハ尙前ノ通デアリマシタ、二十九日ニモ嘔吐下痢ハ矢張同樣デアツテ其上ニ尙啼泣發作、聲音嗄嘶、睡眠不安ナドノ症狀ガ加ハツテ參リマシタ、此日始メテ兩眼結膜ニ「キセローシス」ノ存在スルコトヲ氣付イタノデアリマス、腹部ハ少ク膨隆シテ甚シク弛緩シテ居ル體溫ハ三十八度八分ニ上リマシタガ脉ハ之ニ平行セスシテ比較的緩徐デアリマシタ故ニ、前ノ處方ニ更ニ肝油「パンクレアチン」ヲ加ヘテ見マシタガ、次第ニ嗜眠狀ニ嗜リ四肢ハ厥冷シテ翌三十日ノ午後遂ニ死亡致シタノデアリマス、

第四例　ハ吉田某ト申ス八ケ月ノ女兒デ農婦ノ子デアリマス、母ハ健康デ流早產ヲヤツタコトハアリマセヌ、患兒ノ兄弟ハ二人アリマシタガ一人ハ胃腸障害デ死亡シ一人ハ健存スルソーデアリマス、患兒ハ生後三週位迄ハ母乳デ養ハレテ居マシタガ其後母乳ノ分泌ガ不充分ニナリマシタ故一日三回位濃厚ナ米粉汁ヲ與ヘテ居マシタ、其他ニ生來「胎毒下シ」ヲ含マシテ居リマシテ大便ハ常ニ下痢ノ傾キニナツテ居マシタ、夫ヤ是ヤデ患兒ノ發育ハ充分デハナカツタノデアリマス、所ガ二十日前ヨリ嘔吐ガ始リマシテ特ニ米粉汁ヲ取ルト直クニ吐キマス、又大便モ帶白綠色トナリマシテ粘液ヲ混シ一日五六回モ出ル樣ニナリマシタ、但シ排便時ニ腹痛ヲ伴フ樣ナ模樣ハナイト云フコトデス、聲音ハ眞ニ嗄嘶シテハ居ヌガ餘程低クナツテ來テ且ツ少シク咳嗽モ出テ參リマシタ、ソーシテ四肢ハ厥冷シテ十日以來嗜眠狀ヲ呈シマシテ醒覺スレハ呻吟スルト云フ樣ナ狀態ニナリマシタ、又八日以前カラ母ガ此兒ノ兩角膜ノ白クナツテ居ルコトニ氣ガ付キマシタソーデス、其他尿利ナドニハ變狀ガナカツタト斯フ云フ樣ナ既往症デ八月ノ五日ニ診ヲ乞フタノデアリマス、但シ「胎毒下シ」ハ發病以來一タビモ與ヘナカツタソーデアリマス」、現症ハ比較的小サキ萎縮兒デアリマシテ嗜眠狀態ヲ呈シテ居リマスガ醒覺スレハ不絕頭ヲ左右ニ振テ居マス、皮膚ハ乾燥シテ居マセヌカ下脚ト背部ニハ輕キ浮腫ガアリマシタ、顱門ハ著ク陷沒シマシテ頰ハ垂頰ノ狀態ヲ呈シテ居リマス、兩眼ニハ高度ノ結膜及角膜乾燥症ガアリマシテ腹部ハ甚タ弛緩シテ肝臟ノ下緣ハ右ノ乳線デ肋骨弓下二指橫經ノ所ニ觸レ質ハ尋常ノ樣デアリマシタ、脾臟ハ觸レマセヌガ腸ノ蹄系ハ攣縮ノ狀態ヲ呈シテ居ル、心搏動ハ一般ニ強イ樣デアリマスガ特ニ肺動脉ノ第二音ノ亢進ガ著イ、併シ打診上右室ノ擴張ヲ證明スルコトガ出來マセナンダ、肺ニハ異常ガナク膝蓋腱反射ハ少ク減退シテ居マス、四肢ノ筋ニハ「ヒペルトニー」ガアリマセヌ、臀部ハ「エリテマトエス」ニナツテ居テ頸部及鼠蹊部ノ淋巴

脉ハ稍腫脹シテ居マス、「チアノーゼ」ハ更ニアリマセヌ、脉ハ睡眠中百〇八至テ正調デアリマス、呼吸モ亦正調デ睡眠中三十六ヲ算ヘマシタ、體溫ハ三十七度デ體重ハ僅ニ二千七百瓦シカアリマセヌ、大便ハ黄色液狀デ酸性ヲ呈シ膩脂樣デアリマス、酪酸臭ヲ帶ヒテ粘液ヲ混シテ居ル澱粉反應ハ陰性デ鏡檢上多數ノ脂肪球ヲ認メマス細菌ハ「グラム」陰性菌ノ方ガ多イ、尿ハ水樣デ少ク灰白色ノ混濁ヲ有シマシテ酸性ヲ呈シテ居ル、蛋白ハ痕跡ニ存在シマスガ糖胆色素及ヒ「インヂカン」反應ハアリマセヌ、鏡檢上ニハ唯タ粘液球ト僅カノ上皮ヲ認ムルノミデアリマス、其時與ヘテ居タトコロノ米粉汁ハ非常ニ濃厚ナモノデ普通ノ「ウロメーテル」デ其比重ヲ計ルコトガ出來ヌ程デアリマシタ」、ソコデ所謂脾痢或ハ Reisnährschaden 或ハ Fettdiarrhoe ト診斷致シマシテ、米粉汁ハ餘程稀薄ニシテ與ヘルコトニ致シ、藥劑トシテハ肝油硝蒼「タンナルビン」ナドヲ投シ尚生理的食鹽水五十瓦ノ皮下注入ヲ行ヒマシタ、然ルニ翌日カラ頭部ヲ振ルコトガ止ミマシテ七日カラ八日ニ懸ケテ大便ガ四回嘔吐ガ一回アリマシタ、睡眠中脉ハ百三十至呼吸ハ四十二ヲ算ヘマス、幽門ノ陷沒ハ少ク減シ角膜ハ少ク光澤ヲ現ハシマシテ腹壁ノ弛緩モ稍減シテ參リマシタ、母乳ノ脂肪量ハマルシヤン氏法ニテ二、五六三%アリマシタ、八月八日ニ熱ハ下リ氣嫌モ少シ良クナリ八月十日ニハ下痢ハ尚同樣デアルカ食思ハ佳良ニナリマシタ、尚輕キ嘔吐ガアリマスガ脉ハ百二十至デ角膜ハ透明ニナリ始メ始メマシタ、此日前藥劑ニ尚「パンクレアチン」ヲ加ヘマシタ、其夜ハ安眠致シマシテ八月十一日ニハ眼乾燥症ハ餘程良クナリ下肢ノ浮腫ハ全ク無クナリマシタ、ソーシテ肝臟ノ下緣ハ少ク下リテ弓下三指橫經ニ達シテ居マス、八月十四日ニ睡眠中脉搏百二十呼吸三十二デ、眼ノ「キセローゼス」ハ益々良クナツテ肺動脉第二音ノ强盛モ減シ嘔吐モ少クナリマシタガ時々號泣發作ガアツテ睡眠ハ不安デアル、十三日ニ施シタ「ツベルクリン」皮膚反應ハ陰性デ尿中ニ「アセトン」ハ證明出來マセナンダ、此日ノ体重ハ二千四百瓦、八月十六日ニハ最早ヤ嘔吐ハアリマセヌガ下痢ハ尚持續シテ居マス、號泣發作モ同樣デ矢張夜間安眠致シマセヌ、併シ「キセローゼス」ハ全ク無クナツテ仕舞マシタ、腹部ハ著シク弛緩シテ肝臟ノ下緣ハ臍ノ地平迄達シ其硬度モ硬クナリマシタ、臀部ノ潮紅モ又廣クナリ便ハ矢張液狀デ多數ノ脂肪球ヲ有シテ居マス、八月十七日ニハ睡眠中ノ脉搏百〇八至デ再ヒ嘔吐カ現ハレマシタ、此日米粉汁ヲ止メテ「コンデンスミルク」ニ代ヘテ見マシタカ少シモ之ヲ飲ミマセヌシ且ツ食思減退シテ母乳丈ケデ十分ノ樣ニ見ヘマシタカラ母乳ノミニ致シマシタ、八月十九日ニ號泣發作及下痢ハ依然トシテ變リマセヌデシタカラ、處方カラ硝蒼「タンナルビン」ヲ去リ「サロール」、黃宕越幾斯、蓚酸「セリユム」ナドヲ投シマシタ、八月二十二日ニ至リ食思ガ少ク進ミ吐嘔下痢ハ減シ號泣發作モ少クナリマシタガ全身狀態ハ變リマセヌ、八月二十三日ニ或ル事故ノ爲メ退院致シマシタガ九月五日ニ又再ヒ連レテ參リマシテ、其後母乳ノミデ養フテ居タニ拘ラス兩眼ガ再ヒ白クナリマシテ流淚及膿樣ノ眼眥カアル、加フルニ數日來夜間發熱シテ眞ノ吐乳ハナイガ吐動カアル、大便ハ日ニ二回デ時トシテ帶白粘液樣ノモノヲ出シ口内ニ白斑ヲ生シ一昨日ヨリ嗜眠狀態ニ陷ツタト申シマシタ、其時ノ狀態ハ大抵前ト同樣デアリマスガ皮膚ハ熱灼シテ體溫ガ三十八度五分、口粘膜ニ多數ノ「ゾール」斑ガ出來マシテ眼ハ再ヒ高度ノ「キセローゼス」ヲ現ハシテ「ケラトマラチー」ガ始マラントシテ居リマス、肝臟ノ下緣ハ腸骨櫛ニ迄達シテ居マシタ、肺ニハ更ニ變狀カナイ睡眠中ノ脉搏ハ百四十デ正調デハアルガ甚タ弱イ呼吸ハ三十體重ハ二千二百六十五瓦ニ減シ到底絶望ノ狀態ヲ呈シテ居リマシタ、其後ノ經過ハ分リマセヌ、私ノ實見シタノハ先ツザツト斯樣ナ病狀ヲ呈シテ居タノデ、各多少ノ相違シタ點ハアリマスカ引クルメテ申シマスレハ、年齡ハ三ケ月カラ八ケ月ノ乳兒デ、榮養ハ主トシテ米粉汁デ、發病時季ハ六月カラ九月ノ夏季デアリ

ス、症狀ニ於キマシテハ食思ガ皆減退シテ、便通ハ多ク下痢ニ傾キ、嘔吐ノ有ルモノモ無イモノモアリマス、尿利ノ減少スルモノガアル、羸瘦ハ皆著明デ氣分ハ不機嫌或ハ嗜眠、無慾狀ニナツテ居ル、聲音ハ低クナルガ或ハ嗄嘶致シマシテ又輕咳ヲ有シテ居ス、顏貌ハ蒼白皮膚ハ多ク浮腫シテ両眼ニハ「キセロ―ジス」及角膜軟化ヲ現ハシ、腹部ハ膨隆弛緩シテ肝臟ハ質硬クナリ、脾臟ハ不爾、心音ハ多ク高調トナツテ肺ニハ著變ガアリマセヌ、膝蓋腱反射ノ稍減スルモノガアレ𪜈又通常ナルコトモアル、又四肢ノ筋ノ硬ク觸ルヽモノガアリマス、脉搏呼吸ニハ一定ノ變化ナク、體溫モ合併症ノナキモノニハ普通デアリマシテ、多クハ號泣發作或ハ子發作疳ヲ來シマス、大便ハ硬軟不定ヲ多ク酸性デ澱粉反應ヲ呈スルモノカアリマス、尿ハ合併セル腎臟炎ノ爲メニ蛋白ヲ有スルコトモアリマスガ、普通ハ透明酸性デ蛋白、糖、「アセトン」ガナイ、但シ「インヂカン」反應ノ陽性ノモノガアリマシタ、合併症トシテ腎盂腎炎ヲ有スルモノガアル、豫後ハ甚タ險惡デ四例中二例ヲ失ヒ、尙他ノ一例モ多分死ンダモノダロ―ト考ヘマス、療法トシテ米粉汁ヲ廢スルノガ合理的ノヨ―デアリマスガ、病歷デ見ラルヽ如ク本病兒ハ牛乳ニ對シテ過敏デアリマシテ、夫カ爲メニ下痢、發熱ヲ來シ時トシテハ爲ニ腦症ヲ誘發シテ不幸ノ轉歸ヲ取ルコトガアル、又米粉汁ヲ廢シテ母乳ノミニ致シマシテモ第四例ノ如ク脂肪下痢ガアリマシテ病機ノ鎭靜セヌモノモアリマスカラ米粉汁ヲ廢シテ乳汁榮養ニ代フルノカ甚タ容易デハアリマセヌ只彼ガ有スル「キセロ―ジス」ニ對シテ肝油カ著効ヲ奏スルコトハ疑アリマセヌ、……マ―斯フ云フ樣ナ工合ナノデアリマス、

扨テ是ニ依テ見マスレハ、此四例ハ皆主トシテ含水、炭素榮養兒デアリマシテ、ソ―シテ夏季ニ發病シテ全身榮養障害ニ因スル「キセロ―ジス」ヤ「ケラトマラチ―」ヲ有シテ居リマシテ、其眼症ハ肝油ニヨリテ輕快若クハ全治スルト云フ特異ノ點ガアリマスカラ、之ヲ所謂乳兒ノ脾疳ト名ケマシテ差支ガナカロ―ト考ヘマス、ケレ𪜈是ガ其症狀經過ニ於テ果シテ彼ノ斷乳期後ノ脾疳ト一致スルヤ否ヤヲ精細ニ比較シマスレハ相違ノ點ガ中々多イノデアリマス、私ガ本年ノ內科學會總會ニ於テ報告致シマシタ斷乳期以後ノ小兒ニ來ル脾疳ノ重ナル症狀ハ、食慾及嗜好ノ變化、下痢、煩渴、羸瘦、遊戲不活潑、皮膚乾燥、浮腫、筋「ト―ヌス」減退、膝蓋腱反射減退、眼乾燥症、夜盲、腹壁ノ弛緩、胃ノ「アトニ―」、肝ノ萎縮、慢性氣管支加答兒、脉搏呼吸ノ遲徐、尿ノ「インヂカン」增加、大便ノ酸性、澱粉反應等デアリマシテ、只今申上ケマシタ症例トハ特ニ膝蓋腱反射及肝臟ノ狀態、聲音及心音ノ模樣、其他豫後ノ關係ニ於テ相違シテ居リマス、然レ𪜈御存知ノ如ク確ニ同一ノ疾病デアリマシテモ年齡ニ依テ則チ乳兒ト長兒若クハ大人トノ間ニ於テ、其症狀經過ニ甚シキ徑庭ヲ有スルコトハ決シテ稀ナラサル現象デアリマシテ、結核ノ如キ樣毒ノ如キ比々皆然リデアリマス、就中榮養ト關係アル疾病ノ多クハ年齡ニ依テ其形態ヲ變スルハ殆ント普通ノコトデアリマスカラ、此脾疳ノ如キ榮養ト密接ノ關係アルモノハ乳兒ト長兒ニ於テ症狀經過ニ差違ヲ來スコトハ寧ロ必然ノコトヽ考ヘマス、則チ榮養品ノ形態ニ於テモ種類ニ於テモ消化管ノ構造ニ於テモ官能ニ於テモ乃至全身抗抵力ヤ反應力ニ於テモ、其他種々ノ要約仮令ハ腸內ノ黴菌、各臟器ノ官能、精神、神經ノ狀態ニ於テモ其間ニ非常ノ相違ガアリマスカラ、從テ病機ニモ各種ノ變態ヲ生シ得ルノデアリマス、故ニ私ハ本症例ノ如キハ之ヲ乳兒脾疳ト見做スモ不當デハナカロ―ト信シマス、

ケレドモ玆ニ一ツ類似ノ疾病ガアル、則チ西洋ノ Mehlnährschaden ト似テ少ク非ナルモノデ、私カ假リニ Reisnährschaden ト名ケテ居ルモノデアリマス、則チ此「ライス子―ルシヤデン」ハ米粉榮養ノ乳兒ニ起ル病機デ、私ノ調査ニヨリマスト、其主ナル症狀ハ食思減損、嘔吐、羸瘦、聲音嗄嘶、嗜眠、顏色蒼白、「チアノ―ゼ」、浮腫、眼乾燥症、腹部澎隆弛緩、心音高調、大便ノ澱粉反應、尿ノ無蛋白、無熱、啼泣發作等デアリマシテ、

私ノ只今乳兒脾疳トシテ述ベマシタ病例ハ、所謂長兒ノ脾疳ヨリハ寧ロ此「ライス子ールシヤデン」ト申スモノニ酷似シテ居ルノデ、其他經過及豫後ノ關係モ殆ント同一デアリマスカラ之ヲ又「ライス子ールシヤデン」ト診斷セ子ハナラヌコトニナリマス、扨テ一方ニハ乳兒脾疳ト診斷シナガラ一方ニハ「ライス子ールシヤデン」デアルト云フノハ甚タ曖昧不可思議ノ樣ニ聞ヘマズガ、私ハ是ヲ大變興味ノアルコト、考ヘルノデアリマス、御存知ノ如ク彼ノ脾疳ヤ「ライス子ールシヤデン」ハ何レモ其本態ガ未タ明デナイノデアリマシテ、此両者ハ果シテ異種症ノモノデアルカ或ハ同種病ノモノデハアラヌカ更ニ分ラヌノデアリマス、故ニ私カ今乳兒脾疳ト題シマシタ病例ノ如キ、何方ヘデモ編入シ得ル所ノ中間物ヲ研究スルノガ両者ノ異同及本態ヲ推測スルニ必要デアロート考ヘマス、丁度彼ノ「ラヒチス」ト「オステオマラチ―」ノ異同ヲ研究スルニ所謂侈行型ナルモノガ重要ナ參考トナルノト同樣デアリマス、夫デ私ガ今所謂乳兒脾疳ト名ケマシタモノハ、一方脾疳ニ相違ナク又一方「ライス子ールシヤデン」ニモ相違ナイトスレハ、「ライスネールシヤデン」ト脾疳トハ同一病種デアツテ又甲ヲ乳兒ノ脾疳乙ヲ長兒ノ「ライス子ールシヤデン」トモ名ケ得ルモノデアロー、只種々ノ要約ヲ異ニスルガ爲メニ症狀經過ノ差異ヲ來スノデハアルマイカト斯タ考ヘルコトガ出來マス、例令ハ脾疳ナルモノハ「ライス子ールシヤデン」ノ上ニ一種ノ醱酵菌ナドノ作用ガ加ハリテ或ル毒物ヲ生成シ其毒物ガ病機ニ參加シタモノトモ想像シ得ルデアロー―シ、或ハ又脾疳ハ「ライスネールシヤデン」ガ年齡ノ差異、輕重ノ度合ニヨリテ變形シタモノデアルトモ説明シ得ラレヌコトハナイ、勿論之ヲ確ニ解決スルニハ將來多クノ研究ヲ要シマスガ、今日ノ處ニテハ私ハ乳兒ノ脾疳モ長兒ノ脾疳モ同ク「ライス子ールシヤデン」ノ基礎ノ上ニ立ツモノテ、特ニ本病ノ夏季ニ多キハ之ニ醱酵菌ナトノ作用カ參加スルモノデハアルマイカト想像シテ居ルノテアリマス。

孤録

●組織染色液中ニ含マレタル酒精ノ意義ニ就テ

（中外醫事新報第七二〇號）

波多腰正雄

著者ハ普通染色液中ニ存スル「アルコホール」ガ實際上如何ノ意義ヲ有スルヤヲ檢センガタメ種々ノ試驗ヲ企テタルガ其概要左ノ如シ

(一)「ヘマトキシリン」(或ハ「ヘマテン」)ヲ使用スルトキハ、水溶液ヨリモコレニ一定ノ酒精ヲ加味スベシ、コレニヨリテ過染ヲ防禦シ得ルト同時ニ、「ツエロイドイン」ノ染色ヲ殆ンド全ク防止スルコトヲ得ベシ

(二)同上ノ作用ハ例ヘバデラフイルド氏及ビハンゼン氏「ヘマトキシリン」液ヲ單ニ水ヲ以テ稀釋スト雖モコレヲ期待スベカラズ、コノ場合ト雖モ「ツエロイドイン」ハ明白ニ染色セラレ、從テ全染色結果鮮明ノ度ヲ缺ク

(三)加味スベキ酒精ノ適當量ハ四〇乃至五〇%ノ間ニ在リ、六〇%以上ノモノハ結果ノ見ルベキ無シ

(四)某ノ色素ガ水溶液トナリ得ルニモ拘ラズ、コレニ一定量ノ酒精ヲ加味スルカ、或ハ強キ酒精溶液トシテ使用セラルヽコトハ、コレニ由リ染色作用ヲ一定ノ組織或ハ構成分ニ限局セシムルカ、(即チ孤立染色)或ハ染色作用ノ漸進的秩序的ニシテ、過染ヲ防止スルカノ點ニ於テソノ一意義ヲ求ムベシ