

擇促免拉爾義ノ一例

メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2017-10-04 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: メールアドレス: 所属:
URL	http://hdl.handle.net/2297/38422

シ彼ノ矢毒 Peilgift. ノ如キモ然リ、則チ百分ノ一密瓦ノ純「クラリン」ニ相當スル「クラレー」ヲ蛙ノ皮下ニ注射スルトキハ蛙ハ全ク運動麻痺ニ陥ルモノナリ、夫レ斯ノ如ク殆ンド視力ノ及バザル僅微ノ毒物ニシテ化學的反應ハ詳ニ鑑識シ能ハザルモノト雖之ニ生理的證明即チ動物試驗ヲ施ストキハ其ノ毒物ナルヤ否ヤヲ確証シ得ラル、モノトス。

斯ノ如ク生理的證明ナルモノハ毒物ノ生理的作用ヲ承知スルトキハ其ノ方法ハ極メテ簡單ニシテ然モ極メテ微量ナルカ或ハ化學的ニ鑑識以テ證明シ能ハザルモノト雖既ニ確實ニ證明シ得ラル、モノナレバ法醫學上或ハ裁判化學上ニ貢獻スルコト亦大ナリト言ハザルベカラズ、故ニ余ハ聊カ毒物ノ生理的證明ナルモノ、愚見ヲ述ベテ諸士ノ續々研究アラシムコトヲ切望スルモノナリ

○擇捉免拉爾義ノ一例

特別會員 吉尾開道

(澤金)

本病ハ時ノ古今ヲ論ゼズ洋ノ東西ヲ問ハズ稀有ナル者ニシテ我ガ石川縣金澤病院既往十二年間(明治二十九年ヨリ四十年迄)ニ於ケル内科患者總數實ニ五万八千四百五十九人中四人尙ホ下平教授ノ報告ヲ合シテモ僅カニ五人ナリ以テ如何ニ其ノ稀有ナルカヲ窺フニ足ル余今春偶々本病者ニ逢遇セシヲ以テ此處ニ報告セントス

本病ハ發作性ニ肢筋ノ末端部ニ對側のニ現ハル、疼痛潮紅腫脹ヲ以テ特徴トス一八四三年始メテ Graves 氏ハ此ノ種ノ症狀ヲ具有スル一例ヲ報告セシコアリシモ是レニ命名シ學界ニ發表シタルハ Weir Mitchell 氏ナリ然レモ從來

數多ノ學者ノ實驗ニ憑レバ元來本症ハ一種特立ノ疾患ニ非ラズシテ輕重種々ナル原因ニ基ク中樞神經又ハ末梢神經ノ疾病ニ歸スベキ一個ノ複雜症狀ニ外ナラズ

遺傳的關係 通例無シ然レモ Eulenburger 氏ハ實母ニ高橋剛吉氏ハ父妹姉ニ來タリシ例ヲ報告セシヲ以テ見レバ絶對的無シトハ云ヒ難シ(?)

原因 Lannois 氏ハ寒冷作用ニ歸シ、Eulenburger 氏ハ或ル他ノ疾患ノ反射作用ナリト爲シ、Cahn 氏及ビ Sturz 氏ハ頭部及ビ脊柱ノ負傷ニ、Levin 氏ハ右肘關節等ノ銃創ニ、小池亮琢氏ハ茸ノ中毒ニ、下平教授ハ茸腫ノ反射作用ニ來タル一例ヲ舉ゲ Pethayyini 氏ハ血中ニ Micrococcus tetragenus ヲ發見シ傳染性ヲ有スルモノトナセリ、Dehio 氏ハ血管擴張神經ノ異常ニ歸セントセリ Levin 氏 Benda 氏ハ其ノ原因ニ從ヒ本病ヲ三種トス即チ第一ハ神經中樞ノ器質的疾患ニ因ル者、第二等シク亦中樞器管ノ疾患ナルモ唯官能的障害ト認ムベキ者ニ因ル者、第三末梢神經ノ疾患ニ因ル者トセリ、本病ニ罹ル素因ヲ有スル者ニハ種々ナル器機的外傷的温熱的中毒の有害作用ニヨリテ本症ヲ誘發スルコト有ル者ニシテ、マラリア、微毒、淋疾、ロイマチス、酒精中毒、寒胃、日射、濕潤、過勞等ニ實ニ是ガ誘發原因タルコトアリト云フ

男女ノ關係 Gerhardt 氏 Seelig. Müller 氏 Senator 氏 Bernhardt 氏等ハ男子ニ多シト又 Gerhardt 氏ニ依レバ二

十八—四十歳ノ間ニ多シト云フ
病理解剖 デヒョー氏ハ尺骨動脈ノ内膜ニ、ウエルミツチエル氏ハ神經及ビ動脈管ニ變化ヲ見タリト云ヒドモ尙未ダ確實信憑スベキ剖見所見ヲ聞カズ

症狀 發作性ニ四肢ノ末稍殊ニ對側的ニ來ル疼痛潮紅腫脹ヲ以テ特徴トス而シテ發作間歇時ニ於テハ以上ノ症狀

全ク消失スト云フ

一、疼痛 最モ多キハ火傷時ニ於ケルガ如キ灼痛或ハ神經痛様ニシテ潮紅部ニ局限ス疼痛ハ輕壓觸接溫暖運動ニヨリテ増劇シ寒冷地平位ニヨリ輕快ス從テ夏ハ増惡シテ冬季ハ輕快ス發作時ハ爪甲ノ剪除スラ疼痛ヲ増惡センメ何レノ運動モナスコト能ハズ然レモ Lowth 氏ハ時トシテ疼痛ナキコト云フ

二、部位 最多數ハ下腿足、前膊手ニシテ極ク稀レニハ耳頰ニ來ルト云フ是等ノ部位ニ於テハ一側又ハ兩側ニ同時或ハ時ヲ異ニシテ來タル或ハ一側ノ手ニ初マリテ他側ノ足次デ初發ト同側ノ足ニ來タルコトアリ而シテ變化ハ趾指ニ初發シ漸次上方ニ侵襲シテ下肢ニテハ膝迄、上肢ニテハ肘迄、蔓延ス

三、潮紅 發作時ニハ蓄微紅色或ハ暗赤色ニシテ間歇時ニハ褪色ス健康部トハ銳ク境界セラルル而シテ局所ニハ靜脈ノ擴張スルコト多シ

四、腫脹 輕重アリテ甚シキハ健康時ノ靴手袋ヲ穿ツコト不能ニシテ健康部ニハ自然ニ移行ス

五、灼熱 發作時ニハ顯著ニシテ病足ハ健足ヨリ温度高キヲ常トス Allenstrunge 氏ハ九度(C) Strauss 氏ハ二一四度四分ノ一(C)高カリシヲ實檢ス間歇時ニハ全ク消散ス

局部皮膚ハ通例脆ク衰弱乾燥スレモ時トシテハ Hyperidrosis アリテ且ツ出血シ易キ傾向ヲ有ス又皮下結締織ノ増殖小結節ヲ見ルコトアリ

皮膚ノ知覺機及ビ反射機ハ變化無キコトアリ或ハ僅少ノ變化アルコトアリ

關節殊ニ趾指ノ關節ハ屢々疼痛腫脹ノ爲メ屈伸運動防ゲラルコトアリ尙ホ爪甲毛ノ萎縮スルコトアリ其他發作時ニ限リテ趾指ニ蟻聚スル感アルコトアリ又同感覺ハ口唇舌ニモ來タルコトアリ

其他併發症狀トシテ胃腸障害偏頭痛脊髄性及ビ惱性失調運動、發作性ニ來ル神經障害視神經疾患等來タルコアリ
 診斷 局部特異ノ疼痛潮紅腫脹灼熱ニヨリ明カナレトシテハ、Raynaud'sche Krankheit 粘液水腫アクロメ
 ガリ、鞏皮症、流行性潮紅斑、滲出性紅斑、Symmetrische Erythrodermie der Extremitätenarterien 等ヨリ區別
 シ難キ事アレヒ精細ニ檢スル時ハ大抵明カナリ

經過 一般ニ慢性ナレヒ稀レニハ短時日ノコアリ

豫后 多クハ不良然レヒ治癒シタル例ナキニ非ラズ下平教授 St. Personal 氏柳澤氏等ノ例是レナリ

療法 特效藥一ツモ無シ然レヒ確實ナル原因ノ存在スル時ハ第一原因療法ヲ執行ス其他對症のニ患部ノ地平位安
 靜寒冷作用（氷罨法冷罨法冷浴）鎮痛健胃便通誘導ヲナスノミ接電麥角ヲ稱用スル者アレヒ卓効無シ

例

金澤市石引町

無職業 中 島 某（女）

三十三才

血族的關係 祖父母及ビ實母ハ患者ノ幼少時ニ死シ病名不詳、父ハ健存ス兄弟四人皆健全ナリ患者ハ昨年十月始
 メテ結婚シ爾來今日ニ至ルマテ舉子無シ

生活法 特ニ嗜好品ト稱スベキ者無シ患者ハ農家ニ生レシヲ以テ小學校卒業后ハ時々農業ニ從事シ時ニハ水田中
 ニ足ヲ沒セシコモアリト云フ

既往疾病 生來健全ニシテ著患ヲ知ラズ唯ダ種痘麻疹ヲ經過セシノミ

現病病歴 本年三月頃ヨリ認ムベキ原因無クシテ時々兩側ノ全趾ニ輕度ノ刺痛ヲ覺エタリ其后間モ無ク全趾ニ鈍痛及ビ下肢后面全部ニ倦怠感アルニ至レリ是等ノ症狀ハ暖ヲ取ル時ハ増劇セシモ患者意トセザリキ然ルニ約半ケ月程前朝起時ニ突然兩側ノ全趾ニ知覺異常ヲ覺エ其后間モ無ク同部ニ灼熱感續テ疼痛ヲ感ジ潮紅腫脹ス該症狀ハ日ヲ經ルニ從ヒテ漸次上行シ目下ニテハ下腿下三分ノ一以下前膊下三分ノ一以下ニ灼熱灼痛(時々神經痛樣刺痛)潮紅始終アリ前膊ニ於ケル症狀ノ發セシ時日不明ナレモ確カニ下腿ノ后チニ起レリト云フ疼痛ハ夜間ニ甚シクシテ安眠スルコト能ハズ晝間ハ稍々輕快ス手足溫暖トナル時ハ以上ノ症狀ハ増劇スト云フ(疼痛等ハ皮膚ニ感ズト云フ)其他時々戟劇ナル刺痛アリ下腿及ビ前膊ノ内側ニ運動時牽引樣疼痛アリ其他足趾ニモ牽引感アリ常ニ發作前該部ニ知覺異常アリ發作中ニハ兩趾趾屈感アリテ他動的ニ舉上スルコト屢々ナリ且ツ下肢振顫ス爲メニ全身モ多少之レニ與カル發作中足趾ニハ蟻走感及ビ趾全体ニ緊張感アリ近來疼痛ノ爲メ爪ノ剪除モ不能ナリ疼痛ハ寒冷ニ逢フ時ハ輕快ス依ツテ十日程前ヨリ水桶中ニ兩足ヲ垂レ以テ其ノ病苦ヲ除去セント務ムルニ至レリ其他二週間前ヨリ前頭部后頭部ノ髮際部ニ僅カニ搔痒アル粟粒大ノ膿疱ヲ生ジ暫時ニシテ破壊結痂ヲ被ムルニ至レリ同時ニ頭髮脫毛シテ鬚粗トナリシト云フ

頭痛眩暈耳鳴視力障害等無し

食慾通常便通通常月經正調

現 症

視診体格營養共ニ中等皮膚彈力ニ富ミ滑澤ナリ呼吸運動變化無シ

頭部毛髮脫毛シ鬚粗ニシテ頭部殊ニ髮際部ニ數箇ノ小豆大黃褐色ノ痂皮ヲ被ムル發疹アリ以前ハ多數アリシト云フ

治后癩痕無シ

顔面一般ニ潮紅ス瞳孔反應眼瞼結膜通常、舌ニハ中等度ノ灰白色ノ苔ヲ被ムル、輕度ノ咽頭加答兒アリ、頸部胸部腹部等變化無シ

体位、發作時ニ於テハ唯膝ヲ擁シテ號泣スルノミ且ツ下肢振顫シ自カラ之レヲ制スルヲ能ハズ

上肢、前膊下三分ノ一以下一般ニ發赤稍々腫脹ス、手ヲ把握セシムルニ指ノ第一第二指節緊張感アリテ十分ナラズト云フ發赤部ハ健康部ト明カニ界ス

下肢、下腿下三分ノ一以下及ビ足部ニ於テハ稍々蓄微紅色（足背中央部ハ暗赤色）ニシテ漸次上方ニ進ムニ從ヒテ減退ス然レモ境界明カナリ又該部ハ腫脹シテ足背ニハ數箇ノ皮膚皸裂アリ且ツ同様ニ趾全体腫脹發赤シ爪甲暗黑色ヲ呈ス足蹠亦腫脹發赤ス然レモ背面ニ比シテハ極メテ僅微ナリ

觸診 頭部發疹ハ容易ニ深部周圍ヨリ移動シ得ル頸部ニハ兩側共ニ數箇ノ淋巴腺ノ腫脹ヲ觸ル、肘腺亦腫脹ス、是等ハ皆共ニ周圍深部ト癒着ナク壓痛等無シ

胸腹部變化無シ

腱反射、上肢ニ於テハ左右共ニ亢進ス膝蓋腱反射モ亢進ス足現象ハ疼痛ノ爲メナスヲ能ハズ

四肢ノ腫脹部殊ニ足關節以下ニハ灼熱及ビ壓痛アリテ輕度ノ壓痕ヲ留ム、手ニ於テハ下肢ニ比シテ輕度ナル灼熱壓痛アレモ壓痕無シ

足關節趾關節ニ於テ背屈セシムル時ハ足全部殊ニアヒリス健部ニ牽引様疼痛有リ足蹠反應明カナラズ趾ノ運動ハ大ニ困難ス

打診聽診變化無シ

檢尿透明淡黃色ニシテ別ニ變化ヲ見ズ

經 過

五月十四日体温三十七度二分脈搏八十四便通一回

上下肢ノ腫脹稍々減退ス然レモ疼痛灼熱潮紅依然タリ且ツ左足背面ニ小膿疱數箇右ニ一箇アリテ共ニ帽針頭大ニシテ鼻水ニテ清拭シ臭剝内服及ビ水糞法ヲ命ス此ノ日ヨリ驅梅療法ヲ始ム

五月十五日体温三十七度二分脈搏九十二便通一回

局部ノ腫脹發赤前日ニ比スレバ稍々減退シ熱灼亦他覺的ニ減少ス疼痛ハ自發痛及ビ壓迫屈伸スルモ減少ス然レモ自覺的ニ灼熱感アリ

五月十六日体温三十七度脈搏百十便通一回

唯灼熱前ヨリ減退シテ水糞法ヲ止ム

五月十七日体温三十七度三分脈搏百二十便通二回

前日ト異サラズ

五月十八日体温三十六年度二分脈搏百二便通一回

腫脹變色無ク唯ダ夜間ニ於テ足蹠灼熱疼痛アリテ苦悶ス此ノ日ニ至リテハ水糞法ニヨリ足蹠疼痛増劇シテ不快感アリ輝裂消失セズ時々左足脊ノ外側及ビ同側跖趾第二趾ノ中央ニ刺痛アリ入院以來今日迄テ足蹠ノ疼痛腫脹灼熱ノ爲メ起立不能ナリ

五月十九日体温三十六度四分脈搏百便通一回

足背足蹠共ニ通常トナル然レモ足蹠ノ凹陷部ニ於テハ灼熱疼痛アリ后者ハ壓迫ニヨリ増劇ス起立尙ホ不能然レモ凹陷部ニ於テモ他覺的ニハ灼熱ナク輝裂全治ス

五月二十日体温三十六度脈搏九十四便通四回

局所前日ト異ナラズ檢便蛔虫卵アリ驅虫ス一條ヲ得ル

五月二十一日体温三十七度脈搏九十便通十回

左足蹠ハ自覺症無シ其他壓痛無ク健全時ト異ナラズ右足蹠ハ疼痛甚シク多少灼熱ス壓痛アレモ腫脹發赤無シ

五月二十二日体温三十六度六分脈搏九十四便通八回

左右足蹠輕快セシニ正午頃ヨリ左趾背ヨリ足蹠ニカケテ疼痛アリ且ツ他覺的ニ灼熱アレモ自覺的ニハ無シ前述ノ部位ハ僅カニ嚮微紅色ヲ呈ス右側ハ褪色寒冷ナリ療法驅黴療法含嗽臭剝ノ内服及ビ罨法氷罨法ヲナス

以上ノ經過ニヨレバ症狀大ニ輕快セシテ明カナレモ十分治癒セズシテ退院セシハ誠ニ遺憾トス

St. Personah 氏ハ最モ興味アル二例即チ第一ハ本病ト同時ニ口腔ニ扁平コンジロームヲ併發セルモノ第二ハ遺傳黴毒ヲ有シ脊髓癆ニ罹リ且ツ本病ヲ有スル小兒是等ニ驅黴療法ヲ行ヒテ本病ノ消散セシヲ報告セリ又柳澤貞郎氏ハ遺傳黴毒ノ疑ヒアル患者ニ本病ヲ實見セリ余ノ一例モ又兩者ニ併發セシ者ナリ是等ニヨリテ見レバ兩者ノ間ニハ恐ラク未ダ確知セラレザル關係ノ潜在スルモノナラン其他ノ深淵ノ理論ニ至リテハ吾輩焉ゾ黃吻ヲ容ル、ヲ得ン

參 考 書

十全會雜誌第二第二第二二十八號

好生館醫事研究會雜誌第十五卷第二號

Deut. med. Wochenschrift 1892 P. 865, 995, 1043.

Deut. med. Wochenschrift 1893 P. 1352

Mering, Lehrbuch der inneren Medizin 1907

○色素性乾皮症ニ就テ

Ueber Xeroderma Pigmentosum

特別會員 齋藤義雄 (吳)

諸君、余ハ去ル五月東京醫科大學皮膚科教室ヲ去リ當地天章堂醫院ニ來リ皮膚科ヲ開設シテ日尙淺キニモカ、ハラズ本邦ハ勿論西洋ニ於テモ稀有ノ疾病トシテ報告少ナキ色素性乾皮症患者ヲ實驗セシヲ以テ空シク之ヲ公ニセザルハ斯道ノ爲メ不忠實カト思ヒマシテ菲才ヲ願ミズ今日此席上ニ於テ之ヲ報告スルヲ得ルハ余ノ光榮トスル所ナリ

色素性乾皮症ハ諸君モ御承知ノ通り一八七〇年 Kaposi 氏ノ始メテ記載シタル稀有ノ疾病ニシテ雀斑様或ハ夏日斑様ノ色素斑、毛細管ノ擴張、白色ノ癩痕様斑點及皮膚萎縮等ガ本病ノ主徵候デアツテ早晚癌腫或ハ肉腫ノ如キ惡性腫瘍ヲ發生スル皮膚病デアル、而シテ上記ノ如キ症狀ガ已ニ初年(一歳或ハ二歳)ヨリ發生シ初期ニアツテハ顔面及手足等ノ如キ外部ニ露出シタル部分ニ先ヅ其一二徵候ヲ現ハシ進行性ノ性質ヲ有ツテ居テ年ト共ニ漸々蔓延シテ終ニ殊ンド全身ノ皮膚面ニ來ルヲガアル、ソレノミナラズ患者ハ多クハ惡性腫瘍ノ爲メニ不良ノ轉歸ヲトルノデア