

死後八週(?)ヲ經テ娩出セル女性死胎ノ一例

メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2017-10-04 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: メールアドレス: 所属:
URL	http://hdl.handle.net/2297/38623

凝膠狀ヲ取リテ使用ニ適セザルニ至ル故ニ之レガ取扱ヒハ實地醫家ニ取り實ニ不便ニシテ而モ綿密ニ注意ヲ須キルモ猶ホ永時ノ保存ニ困難ナリ、然ルニ「フェニールヒドラチン」ノ鹽酸鹽ハ淡灰色細微鱗片狀無型ノ粉末シテ若シ瓶口密閉セラレザル場合ニハ往々分解シテ帶紫褐色シテ微ニ濕潤ヲ帶ヒ厭フベキ臭氣ヲ放ツテアルモ本品ヲ使用シタル后毎常小蒸發皿中ニテ熔解セル「バラフン」ヲ筆ニテ密閉際ニ塗布シ置カバ永時ヲ經フルモ能ク保存ニ堪ユルモノナリ、之ノ故ニ實地醫家ニ取リテハ鹽酸「フェニールヒドラチン」ヲ用フルト其純品ヲ用フルヨリモ便利ナリト云ハザルベカラズ、其他ノ試藥ニ至テハ何レニシテ便否ノ相違甚ダシカラズ。

右ニ述ベタルガ如クンバ、鹽酸「フェニールヒドラチン」ヲ取リ長時間蒸水浴ニ致シ自然ニ冷却スルノ式ハ試藥ノ取扱ヒ保存上ニ利益アリ且ツ學理上完全ナルヲ得ベキモ實用上ニハ不便ナルヲ免レズ、純「フェニールヒドラチン」ヲ取リテ短時間煮沸シ急速ニ冷却スルノ法式ハ實用上ニハ便利ナルベキモ試藥ノ取扱ヒ保存ニハ困難ナルト學理上結晶拆出ノ点ニ於テ完全ヲ欠クルノ失点アリ、夫レ一得一失ハ數ノ免レザル所、蓋シ吾人ガ期スル所ハ糖尿鑑識ノ確實ナルニアリ、サレバ檢糖上成績ノ確實ナルモノニハ多少ノ失点アルモ猶ホ忍テ満足セザルベラカズ、而シテ其何レノ方法ガ檢糖の成績確實ナルヤハ余蓋ガ實驗ト共ニ次項ニ論定セントスルノ主題タリ。

誌數ノ都合ニヨリ其ノ全文ヲ載スル能ハズ次號ニ割讓スルヲトセリ記者

○死後八週(?)ヲ經テ娩出セル女性死胎ノ一例

特別會員 八 田 智 證

(澤金)

明治三十六年十月二十二日外來初診、〇〇〇〇ト云ヒ年齡二十才(十二月生)ノ初妊婦ニシテ、十六才三月經血初潮

正順ニシテ三四日持長シ、十五才十二月大禮ヲ舉ク、今春貳月拾五日ヨリ最終月經三日間アリ、爾後妊娠ノ徵アルモ何等ノ異狀ナク安靜ニ經過セリ、二三日前ヨリ時々咳嗽アリテ咽頭部不快ナル搔痒異物ノ感アリ、配偶ハ院丁ニシテ二十七歳、豫備兵役ニ在ル強壯健全ナルモノ、淋疾梅毒等ノ証明ナシト云フ、

体骼營養共ニ常態ヲ保チ皮下脂肪層及筋肉ノ發育先ツ佳良ナリ、咽頭ヲ檢スルニ軟口蓋及咽頭后壁稍著シク充血シ粘膜面粗糙ニシテ、胸部聽診上呼吸音少シク粗烈ナルモ他ニ、異常音ヲ認メズ、打診及觸診上又變狀ナク、乳房ハ能ク緊滿シ、妊娠前半期ノ終ヨリ乳汁分泌ノ多量ニ困メリト云ヒ乳暈ノ着色亦著シク、左右前腋窩線ニ於テ各副乳ヲ有シ右方ノモノヨリ乳汁ヲ搾出スルヲ得、腹部ハ一樣ニ膨大シ下腹部ニ於テ妊娠癢痕ヲ顯ハシ子宮底ハ劍尖下四指橫徑部ニ在リ、羊水ハ稍多量ニシテ胎兒ハ第二頭位ヲ取り心音ハ明ナラザルモ右側臍下ニ於テ微カニ聽取ス、十一月二日再診、咽頭部快癒、胸部亦異變ナシ第二頭蓋位ヲナシ心音百四十五至明瞭ニシテ又胎動ヲ觸ル、全十七日妊婦ノ云ク從來胎動ノ自覺活潑ナリシモ去七日ヨリ之ヲ感ゼサルニ至レリ、當時更ニ轉倒蹉跌衝突打撲ノ覺ナク又恐怖鬱悒懊惱感激ノ跡ナシ、初妊ノ身ノ晝夜恙ナカレカシトヒタスヲ祈ルノミニシテ聊ノ障害ダモ看過スル所アラズト、就テ診ズルニ腹部ノ大小形狀ハ以前ト格別異リタル所ナキカ如クナルモ、子宮ノ硬度ハ一體ニ等シクシテ胎兒ノ大小部分判明セズ、從テ耻骨縫際上ニ於テ兒頭ヲシキモノヲ觸ル、モ之トテ通常妊娠高期ニ於ケル兒頭ニ觸ル、感ト比スベクモ非ズシテ、多分兒頭ナルベシト推知スルニ過キズ、体向ハイカン體勢ハイカンノ如キ全ク不明ノ状態ニ在リ、子宮雜音ハ確ニ聽取シ得ルモ心音及体動ハ之ヲ証シ得ズ、診察中子宮ノ收縮ヲナスコト兩三回ナリ、乃チ家人ニ告クルニ胎兒ノ死ニ陥リ居レルヲ以テスル所アリ、試ニ腹部ノ測定ヲナセシニ臍圍八十八、臀圍八十七、五耻骨縫際臍窩十八、臍窩劍尖二十、臍子宮基底十四、高六、乳頭間二十二、五cmナリ

其後來診毎ニ數回ノ測定ヲ爲セシモ臍圍ハ或ハ八十九、或ハ九十或ハ八十八等ヲ示シテ増減ノ度著シカラズ、十二月二十一日最后ニ測リタル時ニハ臍圍八十六、耻膺十六、五臍劔十九ヲ示シ初ニ比シテ少シク減少スルヲ見ルニ至レリ、其自覺的症狀トシテハ十一月末ヨリ左膈背窩下部ニ當テ觸接ニ際シテ壓痛ヲ感スト云ヒ、十二月七日診察ノ際ハ胎兒ノ大小部ハ素ヨリ判然セサルニ至リシカ、全十六日頃ニ及ンテハ腹部ノ牽張感ト共ニ間々劇痛ヲ發ストノ外、訴ナク、加之胎動ヲ覺エサルニ至リシ後ハ身體舊ニ倍シテイヨク健康ニ、日常ノ動作倦怠疲勞ヲ起スコト少ナク精神快活ニシテ食慾進ミ、宛然妊娠前ト等シクシテマタ腹内胎兒存在セザルガ如ク覺ユト云ヒ、其何故斯ル狀態トナレルカヲ訝ル事瀕ナリキ、

三十七年一月元日午后四時當直醫ノ出張ヲ乞ヒ産機ノマサニ進ミツ、アルヲ報ス、往テ之ヲ診ル、曰ク朝來少シク腹痛アリシガ正午過ヨリ烈シク發作性トナリ三時破水セリト、スナハチ臂ヲ炬燵臺ニ支ヘ上休ヲ稍前屈シテ之ニ倚リ灰ト藁トヲ累テタル上ニ坐シテ僅ニ愁色ヲ帶ブルノミ極メテ平居安然タリ、其屋ヤ九尺二間ノ矮舍、路行ク人ハ窓ヲ透シテ直ニ産褥ヲ見得ベク、醫士ト産婦ト家族ト車夫トハ互ニ尺ヲ隔ツルノ餘地ダモナシ、破膜后ノ内診ハ直ニ施スノ必要アリトハ兼子テ師ヨリ深ク聞ク所ナルモ、今ヤ心ノミアセル斗ニテ之ヲ施サンニ由ナシ、寧口病院ニ送ランニ如カズト爲シ自ラ驅リ行キタル車ニ投シテ即時入院セシム、

世ノ文明ノ高低ト社會階級ノ上下ニ從テ分娩機轉ニ難易アルハ一般ニ認メラル、所、彼ノ街上分娩ノ如キ下層勞動者ニ於テ往々之ヲ見、或ハ野蠻種族ニ於テ單身山林ニ入り之カ所置ヲモ仕末シテ平然タルガ如キ自ラ之ヲ証シテ餘蘊ナシト謂フベシ、本産婦ノ如キモ自ラ衣服ヲ着換ヘテ裕々乗車シ、病院ヲ關ヨリ人手ヲカラズシテ數丁ニ余ル産房ニ步行シ至リタル、ゲニ飽食ノ徒ノ克クシ能フ所ニ非ス、

六時一定ノ仰臥位ニ於テ之ヲ診ルニ、劍尖下一掌幅部ニ違セル宮基底ハ右側ニ偏シ、卵圓形ナル宮体ハ斜ニシテ、胎兒ノ大部分ハ不明ナルモ、左腸骨窩部ハ過敏ニシテ壓痛アリ、微ナル子宮雜音及腸管雜音ヲ聽取シ得ルモ心音ハ全然聽取シ得ラレズシテ、破膜後一時沈靜ナリシ陣痛ハ五六分間ノ間歇ヲ以テ一二分宛稍強ク發作シ、内診上子宮口ハ一圓銀貨大ニ開大シ、卵膜ハ既ニ破裂シタルヲ以テ胎胞ノ發生ナキモ、宮口ヲ通シテ殆ント中央ニ高ク僅ニ恰モ舌骨形ナル骨片ノ一部分ヲ觸レ、(胎兒軟化ノ爲離開シタル顱頂骨内緣ノ一部ナリキ)更ニ宮口ノ右側ニ接シテ指掌ノ脱出セサルモノアリ、内手ト能ク一致スル所アルカ如ク覺ヘシモ、縫合及顱門ハ骨片移動ノ爲メ其位置ヲ變シ、且ツ指頭ヲ以テ擡擧スルニ當リ抗抵抗弱ク兒頭ノ形狀位置判然セズ、而モ前腕脱出ヲ伴フ不正ナル頭蓋位ナルベシトノ考ヲ以テ時ヲ移シ其經過ヲ觀望セリ、

七時半頃ヨリハ發作一層強ク起リ來ルト共ニ間歇時短縮シ、其都度苦痛ノ色ヲ表ハシ低聲泣鳴ヲ含ムニ至ル、十時再ヒ内診ヲ行ヒシニ子宮口ハ既ニ全ク開大スルモ、サキノ前進部ナル兒頭ハ下降シ來ラズシテ之レヲ觸ル、ニ由ナク、却テ脱出セル前腕ハ能ク其肘部及腋窩迄モ觸レ得ルニ至リ、且ツ肩胛部ハ下垂シテ骨盤入口ニ壓入シ、閉鎖ヲ左ニ開放ヲ右ニ顯ハス所ノ腋窩ハイヨク右腕ノ脱出ト右肩胛ノ壓入トヲ確メ得ルニ至ラシメタリ、而シテ陣痛發作スルヤ宮体著シク前方ニ膨出シテ硬キ事右ノ如ク、或ハ恐ル前腕脱出ヲ伴ヒタル横位ノカクハ變轉シ來レルモノニシテ時トシテ子宮破裂ヲ起スノ憂ナキカト、而モ是レ杞憂ニ過キスシテ。此際ニ於テ試ムヘキ唯一ノ手段ト看做サル、足位内廻轉術ヲモ施スニ及ハズシテ、強キ陣痛發作ニツレ兒ハ *sogen. Selbstentweckelung* 即チ自家解脫ヲ營ミツ、須臾ニシテ先ツ右手ヲ陰門外ニ脱出シ、更ニ肩胛部ヲ越ヘテ弓形ヲ畫キツ、同側ノ胸部腹部臀部ヲ廻轉シテ下肢ヲ出シ、次テ順次左側ノ下肢臀部胸部肩胛部上肢ニ及ヒ、最後ニ容易ク頭部ヲ娩出セリ、其狀多クノ産

科書ニ於テ自家解脫ノ圖ヲ示シタルモノト同シクシテ、我等ノ如キ初學者ニハ奇異ノ感ノ下裨益スル所尠カラザリキ、此際胎兒ノ頸部ニハ臍帶ノ纏絡二回ニ及ヘリ、時ニ十時廿五分ナリ、后十五分ヲ經テ陣痛發作ニヨリ后産全ク娩出、膻及會陰ノ損傷ノ如キ殆ント會陰保護ヲ要セサリシ程ナリシヲ以テ何等ノ障害ヲモ蒙ル事ナク、其后子宮ノ收縮惡露ノ排泄通常ニシテ、褥婦ハイト平穩ニ産褥ヲ經過シ十日ノ後欣然退院セリ、

産出シタル胎兒ハ著シク軟化セル女性死胎ニシテ淡キ暗赤色ヲ呈シ、全身ノ大部分ハ表皮剝脫シテ滑澤ナル眞皮ヲ顯ハシ胎脂ノ附着殆ントナク、長サ二仙迷突ニ達スル毛髮ヲ有スル頭皮ハ弛緩シ、腦質軟化ノ爲メ頭骨互ニ離開シテ褶動シ易ク顚門及縫合ノ如キ認メ易カラズ、鼻ハ通常ナルモ眼目イタク混濁シテ唇口シマル所ナク、四肢ノ發育ニ異狀ヲ認メサルモ軀幹稍、羸瘦シテ肋骨交々間溝ヲ顯ハシテ歷然算セラレ、腹部少シク膨大シテ陷凹セズ、外陰部ハ常ノ如クニシテ肛門哆開スル所アルヲ見ズ、其身長四十二、上肢(中指)間四十一ニシテ体重二百七十九匁ナリ、臍帶ハ長サ七十一ニ餘リ暗赤色ヲ帶ヒ、其形全部扁平ニ近クシテワルトン氏酸肉少ナク、捻轉大小三十四、仮結節九ニ上リ、其臍窩端ヨリ一仙迷突ヲ隔テ、糸ノ如ク甚シク絞振スル所アリ、

胎盤ハ橢圓形ニシテ周緣裂痕ナク、臍帶殆ント其中央ニ附着シ卵膜飛展シテ存在ス、長徑十五、短徑十二、厚徑一、五周徑四十二、重量六十四匁ナリ、

以上述フル所ニ由リ之ヲ觀レバ本産婦ハ以前梅毒ノ患ナク、又妊娠時惡吐、熱性病心、肺、腎臟病、アルハ肉体的並ニ精神的外傷等ノ証明スベキモノ一モ之ナク、只羊水ノ少シク過多ニシテ、扁平ニ近キ臍帶ノ稍捻轉多キ過長性ナルヲ以テ、ヨシ初妊婦ニ於テ其強弱ノ度ハ判明セサルモ活潑ニ胎動ヲ感セリト云フニ因リ見レバ、或ハ過激ナル胎動ノ爲ニ自ラ再度マデモ臍帶頸部纏絡ヲナシ、且ツ捻振ヲ烈シクナシテ糸ノ如ク絞縊セル部ヲ生シ、之ガ爲ニ臍帶

ノ血行障害ヲ惹起シ自亡自滅ヲ遂ケシモノニハアラサルナキカ、而シテ分娩時ニ當テ卵膜ノ早期破裂ヲ起シ、初メ前腕脫出ヲ伴ヒタル頭蓋位ナリシモノ、軟化セル不生熟胎兒ノ爲メ容易ニ自家解脫ノ轉機ヲ取り、尙胎動不感、心音不聽后殆ント八週(?)ノ久シキ何等ノ障碍ヲモ生セザリノミナラズ、却テ身心ノ健全ヲ増シタル、且ツ最終月經後妊娠日數三百十八日ニ亘リ通常平均日數二百八十日ヲ踰ユル産科の一ヶ月ニ及ベル等實ニ我等ニ稀有ナル一實驗ヲ與ヘタルモノト謂フベシ、

前號正誤

頁	行	誤	正
三七	十	後轉右傾	後轉后傾
四〇	五	強力纖維	彈○力纖維
四一	二	疣狀ノ下	「隆」ヲ脫ス
四七	十六	診斷確定シタナラバノ下	「手術」ノ見込ナキ重症ナルヲ脫ス

