

## 急性羊膜水腫症ノ一例

メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2017-10-04 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: メールアドレス: 所属:
URL	<a href="http://hdl.handle.net/2297/38618">http://hdl.handle.net/2297/38618</a>

シタルニ患者ハ手術ヲ受クルノ決心ヲナシ八月十五日疲憊ノ極ニ達シタル身ヲ以テ余ガ許ニ投シ來レリ。然カモ患者ノ生命ニ對スル豫後ノ良否ハ未ダ必ズシモ知ルベカラザリシモ翌十六日注意シテ切開爬除シタルニ前ノ豫言ハ偶然ニモ的中シ尿失禁ハ頓ニ止ミ創モ亦善良ナル經過ヲ取リテ八月下旬第二期癒合ヲ營爲シ九月一日患者ハ欣然トシテ退院セリ而シテ患者ノ健康ノ漸次恢復シタルハ論ヲ俟タズコレ蓋シ膿ハ切開ニヨリテ充分腹壁ヨリ排泄セラル、ニ至リシカ故ニ臆瘻孔ハ此稀有ナル肉芽癒合ヲ營ミテ自治シタルモノナラン

右一編ハ特別會員藤岡氏ヨリ小川教授ヘノ書簡ノ一節ナリ、編輯子乞ヒテ茲ニ載ス、記事中誤謬ナシトセズ是レ生ノ迂遠ノ罪藤岡氏及ヒ見ン人之ヲ宥セヨ……………有 壁 生

## ○急性羊膜水腫症ノ一例

特別會員 平 田 一 若

(摩薩)

余ヤ開業日淺ク從テ實驗スル所亦尠ナシトス殊ニ余ガ淺學以テ斬新ノ說ヲナス克ハズ只一小實驗ヲ記シテ大家諸彦ノ指導ヲ仰カント欲ス

此ノ症ヤ甚ダ稀有ナラズ本症ノ詳細ハ己ニ佐藤先生ノ報告其他金澤市止善堂病院長山田先生ハ東京醫事新誌千三百四十號中外醫事新報五百四號ニ記載セラレタルヲ以テ今之レガ原因ヲ喋々スルニ足ラズト雖也只原因ノ大畧ヲ述ベテ余ガ實驗ニ移ラントス

抑モ本病ノ原因ニ就テハ Yungbluth, Levison, Küstner, Charpentier, Nübeudung, Baum, Rünge, Encyklopädie der Geburtshilfe u. Gynäk-kologie ニ依ルモ不明ナリ要スルニ母体又ハ胎兒ニ血行障害アル時ハ卵膜腔中ニ羊水ノ分泌ヲ多クスコレ本症ノ起ル所以カ殊ニ母体ニ於テハ Circulationsstörung u. Anämie ニシテ身体腔中水腫又ハ Transsudatヲ起ス時ハ脫落膜ヨリ絨毛膜ヲ通シテ卵膜中ニ出テ以テ羊膜水腫ヲ形成スルニ至ル胎兒ニ於テハ臍帶靜脈ノ障害ニ依リテ來ル即チ胎兒ガ Syphilitische Hepatitisノ時門脈系ガ壓迫セラレテ腹水ヲナシ同時ニ羊膜管ノ位置變ゼントスル時ニ起ルト云フ殊ニ急性ノ本症ハ胎盤ノ慢性炎症又ハ Hüter 及ビ Byrat 氏等ノ經驗上 Eineige Zwilling ニ多シト軌近 Schatz 氏之ガ學理的説明ヲナセリトハ山田先生ノ記載セラル、所ニシテ佐藤山田兩先生ノ實驗セラレタル所共ニ Einei Zwillinge ニシテ Hüter, Byrat 氏ノ實驗ト同一ナリトス依之見之原因ノ大多數ハ那邊ニ存スルヲ知ルニ足ラム

宮崎縣北諸縣郡山ノ口村

患者

農

山下某ノ妻 三十三年

父ハ不明ノ病症ニ依テ去ル母ハ健在同胞三人皆健初經十四歳ノ春、經過整然乱レズ持續二日間ニシテ血量中等十六歳ニシテ婚ス妊娠四回分娩產褥皆正安女兒四人共ニ健存ス終産ハ患者二十歳ノ時ニシテ爾來健康甚ダ佳ナラズ顔色常ニ蒼白タリ經通亦不整トナリ血量稍減少ス明治三十六年五月來經通ナク月ト共ニ食氣減退シ心氣又平日ニ異ナルヲ以テ妊娠ヲ自覺スルニ至ル依テ一家舉テ嫡子ヲ得ント屬望セリ明治三十六年十一月十日頃ヨリ腹部漸次膨大スルヲ以

テ某產科醫ニ診ヲ乞ヒシニ卵巢囊腫ト診斷シ諭スニ手術ヲ以テセリ茲ニ於テ驚愕一ナラズ余ガ院ニ來ル實ニ明治三十六年十一月十八日ナリキ

患者体格中等營養不良顏容蒼白杞憂ノ狀滿面ニ溢レ起居歩行共ニ困難久時直立位ヲ保ツ能ハズ腹部ハ非常ニ膨隆シ衣服爲メニ狹ク襟ヲ正ウスル克ハズ腰卷ヲ以テ僅カニ被覆セリ之レヲ檢スルニ腹壁緊張シテ薄ク滑澤光ヲ放チ靜脈ノ怒張著シク側腹部ハ所々ニ皮膚ニ龜裂ヲ生シテ出血セリ乳房ハ寧ロ妊娠ヲ否認シ患者モ又常時ニ異ナルナキヲ云フ觸診上稍小波動ヲ呈シ少シク按壓スレバ呼吸促進ヲ訴ヘ充分檢スル能ハズト雖モ抗抵部ナキガ如シ打診上一汎濁音ニ一側ニ手掌ヲ當テ他側ニ直打ヲ加フル時ハ波動著シ臍圍一三五cm 劍尖臍間二三cm 臍耻骨縫隙間三〇cm 聽診上更ニ心音様ノモノナシ外陰ノ狀態モ又妊娠ヲ否認シ舟狀窩部ニ血性粘液様分泌物ノ附着ヲ認ム内診上宮体非常ニ膨大卵巢ノ狀態不明宮腔部ハ柔軟ニシテ前上方ニアリ宮口一指横徑開大ス危險ヲ犯シテ尙ホ少シク示指ヲ進ムレバ膜アリ茲ニ於テ獨自ラ囊腫ニアラザルヲ確知セリ示指ヲ去レバ全指血液様粘液ニ染ム思ヘラク鬼胎カト

依テ明日入院スベキヲ約シ且ツ彼レガ宿所ヲ記シテ別ル同夜熟々思ヘラク余カ診斷ニ誤ルナカランカト心氣騒然同夜十一時見舞フガ如ク彼レガ宿所ヲ訪問スレバ晝間ニ比シテ苦悶ノ狀愈甚ダシ依テ再ヒ内診ヲ試ム然ルニ宮口ヲ通ジ膜ヲ隔テ、バロッテマン様ノ抗抵アリ此ノ抗抵物ヤ圓キガ如シ依テ以テ知ル余ガ診斷ノ誤リニコレ急性羊膜水腫ナリシヲ心中私ニ快絶翌十九日入院苦悶前日ニ増シ安眠ヲ得ズ常ニ夜具ヲ高クシテ之レニ憑ル内服ニ硝酸ヲ試ムモ

奏効ナキガ如シ二十五日一方ニ「チキタリス」醋剝ストロファン「丁」幾ヲ投シ一方ニ硫麻ヲ與フ寸効ナシ二十七日苦悶愈甚ダシ殊ニ安眠ヲ得ザルヲ以テ身体疲勞ス時ニ臍圍一三六cmヲ算シ愈病勢ノ加ハルヲ知ル患者ハ呼吸促迫ニ堪ヘス屢々手術ヲ切望ス依テ明日ヲ待テ早産術ヲ行ハント心潜カニ之レヲ決シヌ然ルニ二十八日午前六時來診ヲ乞フ到レバ患者跪踞夜具ニ憑リ顔容喜色平然タリ曰ク昨夜十二時頃ヨリ水下リ夜具疊皆浸サレタリト驚キ見ルニ實ニ其言ノ如ク羊水漏出ノ音恰モ尿利ノ如シ玆ニ於テ直ニ仰臥位ヲ取ラシムルニ羊水漏出止ム看護婦ニ準備ヲ命シテ診スレバ心機元進呼吸安靜腹部ハ三分ノ一ニ減少シ腹壁非常ニ弛緩シテ小皺巽ヲ生シ胎兒ノ大小部分明カニ觸ル其ノ位置第一頭蓋位ニシテ心音ハ臍下一寸位ニシテ左方ニ聽取シ其音幽微ナリシヲ記憶スルモ事急ナルヲ以テ數ヘ得ズ直チニ内診スレバ宮口ハ殆ント三指横徑開大宮緣ハ尙二三cm存シ卵胞ハ尙存在シテ緊張セズ子宮内口ヲ膜狀ニ閉塞ス之レガ中央ニ示指頭大ヨリ尙ホ小ナル裂傷ヲ有ス而シテ其ノ卵胞非常ニ厚クシテ堅ナリ而シテ卵胞ヲ隔テ、兒頭ヲ觸ルニ未ダ固定セズ患者ハ呼吸促迫一時ニ去リタルヲ喜ビ親戚知己皆欣然タリ獨リ憂ルハ余ノミ未ダ陣痛起ラズ然レモ早ク分娩ヲ終ラシムルノ得策ナルヲ思ヒ尿ヲ排シ臆ニ強壓單保ヲ施シ腹部ニ熱法ヲ試ミ傍ヲ少シク宮底ヲ按ス間モナク漸時陣痛起ル依テ腹壁ヨリ兒頭ヲ固定ス遂ニ陣痛強盛トナリ單保ト共ニ第一頭蓋位ヲ以テ男子出產會陰破裂挫傷ナシ宮体ノ収縮甚タ遲從テ出血稍々甚ダシキヲ以テ宮底ヲ擦摩スル三十分時然モ後産ナシ依テ「クレデ」氏法數回反復ノ後挽出出血甚ダシ直チニ鹽化「アドリナリン」二筒後「エルゴチン」二筒ヲ注入シ

宮底愈下ル丁字帶ヲ施シ茲ニ全ク分娩ヲ終レリ母体實ニ安然分娩後一回ノ熱發ナク子宮収縮  
又可ニシテ經過佳良ナリシハ体温表ノ示スガ如シ后二週ニシテ退院セリ

生兒ハ出産スルヤ恰モ窒息様ナリシモ人工呼吸ニ依テ蘇生セリ胎兒身長二八cm頭圍二三cm胸  
圍二二cm体量八三〇瓦ニシテ畸形ヲ有セズ胎盤ハ恰カモ小瓢狀ニシテ厚ク臍帶ハ側在性ニシ  
テ其長サ三十五仙迷右轉シテ浮腫狀ヲ呈セリ生兒ハ生後三日ニシテ死亡其ノ死因タル畢竟七  
ヶ月有余ノ胎兒哺育農人ニ不適當ナリシ爲メナランカ

余ハ羊水ノ分量ヲ計ル能ハザリシハ遺憾トスル所ナリ Kustner ハ五ヶ月ニシテ一五リール  
Schneider ハ六ヶ月ニシテ三〇リール Runge ハ五ヶ月ニシテ百ccmノモノヲ實驗セリト云フ余

ノ實驗又之レニ近カラシカ

右述ブルガ如ク余ガ實見スル所單卵双胎ニアラズ其原因ノ何レニ歸ス可キヤ記シテ以テ高教  
ヲ乞フ所以ナリ

右ノ外ニ体温表送附アリシモ紙面都合上掲載スルヲ得ズ著者之レヲ了セヨ……………あ、か、生

○兩側性卵巢囊腫(左卵巢囊腫大右第)ニ妊娠(第月初)ヲ

兼タル者ニ開腹術ヲ施シタル一例

特別會員 八田 智 證

(澤金)