

十二指腸虫病ニ就テ

メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2017-10-04 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: メールアドレス: 所属:
URL	http://hdl.handle.net/2297/38610

十全會雜誌

(第參拾壹號)

原 著

〇十二指腸虫病ニ就テ

明治三十六年十一月十九日金澤醫會ニ於テ開演セシ大意

特別會員 米村吉太郎

(澤金)

〔原因〕本病患者ノ大便ニ依テ汚浸セラレタル生水及ヒ野菜肉類等ヲ飲食シ爲メニ虫卵腸胃内ニ入りテ孵化シ十二指腸粘膜ニ吸附シ晝夜血液ヲ吸飲セラル、ニ由リ漸ク貧血ヲ來スニ依ルモノナリ

〔誘因〕未ダ一定ノ學說ニキカズアイヒホルスト氏内科各論ニ十二指腸虫病患者ハ肺結核ニ罹ルモノ多キヲ諸ガ唱導セラル、コヲ記載セリ然レモ余ガ實驗ハ之レニ反對ノ結果ヲ見タルアリ

〔職業及地方別〕本病ハ各國共ニ散在性ニ存在スルモノニシテ特ニ山間及村落ニ散在性ニ存シ從テ農夫、鑛夫、瓦匠、墜道工夫等主トシテ外役勞働ヲ取ルモノニ多シ(生水ヲ飲用シ野菜肉類等ノ

煮沸不完全ナルカ洗滌水ニ虫卵ヲ包含スル物ヲ食用スルニ依ル)

學校衛生第五號ノ載スル所ニ從ヘバ山形縣師範學校生徒二百五十二名ニ就テ檢便ノ結果九十八名即チ其ノ三分ノ一弱ハ十二指腸虫病患者ナルトヲ發見セラレタリ而シテ其内市内ノ生徒六名ハ健全ニシテ郡部ハ各郡ニヨリテ多少ヲ區別セシニ二二%ヨリ六二%ノ差異ヲ生セリト云フ以テ同地方モ市内ハ僅カニシテ郡部ニ多ク特ニ散在性ニ存スルノ一端ヲ窺フニ足ル

余ガ病院ニ於テ明治三十三年ヨリ三十五年ニ至ル三年間ノ統計ニ依ルニ縣下石川郡松任地方六名金澤長田町郊端ニ至ル村落九名石川郡金石附近ノ村落二十名河北郡小金村附近三名羽咋郡羽咋町及其附近五名合計三十三名ニシテ何レモ農業家ナリ又金澤市内ノ者七名アリシモ皆兩三年前迄ハ村落ニ在テ農業ニ從事シタルモノナリ之ヲ以テ推考スルニ或ハ村落ニ居住ノ際本病ニ罹リ身體虛弱ノ爲メニ市内へ移住セシヤノ疑点ヲ存シ又實際患者ノ問診ニ之レヲ徵スルトアリ而シテ本院患者ノ五分ノ四ハ市内ニシテ五分ノ一ハ市外ノ住民ナリ特ニ前陳十二指腸虫病患者ノ所在ハ比較的來患少數ノ地方ナリ之レニ依テ極論スレハ當地モ散在性ニ存シ且ツ農家ニ多キ徵ナリ然レモ前陳少數ノ患者ヲ以テ全般ヲ推測スルハ早計ニ失スルノ嫌アリ茲ニ賢明ナル諸君ノ御判斷ニ讓ルコト、セリ

〔現病〕本病固有ノ現症ナシ胃疾患ノ症狀貧血狀態等ナリ頸動脈ノ雜音及胃酸ノ増加ハ確實ナル統計ヲ得ズ

〔繼發症〕大西克知氏ハ十二指腸虫貧血ニ因スル視神經網膜炎ノ一例白血病性網膜炎ニ酷似ス

ルモノ(中外醫事新報)、井上通泰氏ハ球後視神經炎ノ一例(醫事新聞第六百十五號)ヲ報告セラレタリ

一千八百九十二年フイッセル氏以來網膜貧血出血視神經未梢ノ損傷ヲ來スノ報告多數アリ

内科的ニハ熊谷玄且氏癩癩ヲ繼發セル一例(明治三十年第十四回東京醫學會總會)ヲ報告セラレタリ

其他アイヒホルスト氏内科各論ニ肺結核ヲ來スコアリト記載アルノ外余ノ寡聞未ダ報告ニ接セズ然レモ胃擴張胃潰瘍胃癌糖尿病萎黃病黃疸ヲ來スコハ實地上散見スル所ナリ

〔診斷〕患者ノ大便ヲ鏡檢シテ十二指腸虫卵ヲ發見スルカ又ハ肉眼的ニ該虫体ヲ發見スルキハ本病患者ナルヲ確實ナルモ茲ニ最モ注意スベキハ合併症ノ有無ナリ余ハ嘗テ檢便上本虫卵ヲ發見シテ十二指腸虫病患者ナルヲ速斷シ驅虫法ヲ施行スルキハ速ニ全快スベキヲ豫告シタルニ驅虫後益々患者ノ衰弱ヲ來シタルヲ以テ熟診スルニ胃癌ヲ合併スルコト四名腸癌ヲ合併スルコト一名肺結核ヲ合併スルコト二名糖尿病ヲ合併スルコト一名ニ接シタルコトアリ故ニ檢便上本虫卵ヲ發見スルモ尙合併症ニ再三注意シ若シ合併症不治的ノ疾患ナレバ驅虫藥應用上取捨スベキハ勿論患者ニ此ノ旨ヲ豫告スベキナリ

又檢便上本虫若シクハ卵ヲ發見セザルモ左方ニヨリテ再三檢便スベシ即チ糞ヲ二三日間温所ニ放置シ更ニ檢便シ果シテ本虫卵ノ存セシモノナルキハ糞便中發育シタル子虫ヲ發見スベク尙不明ナルキハ驅虫藥ヲ投ジテ檢便スベシ

〔區別診斷〕前陳ノ如ク本病ト胃癌肺結核糖尿尿病等ノ合併症ノ有無ヲ檢ス檢便上本虫卵ニ類似スルモノハ別表圖欄ニ示スガ如ク裂頭蠓虫卵槍狀二口虫卵、鏡形二口虫卵、ウイノグラドフ氏二口虫卵、蠓虫卵等ナリ本虫卵ハ表面滑澤ニシテ橢圓形ヲ呈シ〇、〇五乃至〇、〇六密迷ノ長經ト〇、〇三乃至〇、〇四密迷ノ短經ヲ有ス其内部ニ二乃至三個ノ胎体ヲ具フ此胎体ハ体外ニ於テ速ニ孵化スル性アリ排便後二十四時間乃至四十八時間ニシテ子虫ト成ル其大サハ蠓虫卵ニ類似スルモ被膜ハ二層若シクハ三層ヲ具有シ且ツ虫体ハ大ニ異レリ又第十四回東京醫學會總會ニ於テ近藤繁次氏曰ク十二指腸虫卵ヲ檢センガ爲メ多數ノ糞便ヲ鏡檢セシガ未ダ一回モ蠓虫卵ヲ發見セザリキ而シテ大小人ニ論ナク比較的多少ク蠓虫ヲ現存セリト三浦博士ニ質問セラレタリ、ライデング氏ハ二百三十名ノ蠓虫患者中檢便上該虫卵ヲ發見シタルヲナシト云フ以テ區別診斷上必要ヲ認メザルヲ証スルニ足ラン

余モ亦蠓虫卵ヲ見タルヲナシ

〔療法〕之レヲ別テ象防法及根治療法ノ二トス

(甲) 既ニ本病因ハ明瞭ニシテ傳播及侵襲モコレラ、ベスト、赤痢等ノ如ク猛惡ナラザルヲ以テ傳染病中豫防ノ最モ容易ナルモノナラント信ズ余ガ考案ハ醫會、市町村醫及校醫ニ命ジ各戸若シクハ學校ニ就キ健康診斷ヲ施行シ疑ハシキ者ニハ檢便シ本病患者ナルヲ發見スルキハ驅虫藥ヲ投スルハ勿論本患者ノ排便ハ昇汞水石炭酸煮沸法等ヲ施行スルカ或ハ石灰乳ヲ混ズベシ特ニ石灰乳ヲ賞用スルハ現今醫界ノ輿論ナラン其他生水野菜生肉ハ充分煮沸セザレハ危險ナ

ルヲ公開演說等ヲ以テ素人ニ知ラシムルヲ要ス

(乙) 本病ニ應用スル藥品ハ一長一短未ダ有効無害ナル者ヲ發見セズ其内最モ有効ナルハ依的兒製綿馬越幾斯ナルガ如シ然レモ中外醫事新報三百七十三號ニ於テ檜村清德氏ハ左ノ如ク極端有害說ヲ公ニセラレタリ即チ各綿馬越幾斯二〇ヲ二名ノ患者ニ服用セシメタルニ共ニ數時間内ニ吐瀉人事不省視力朦朧四肢痙攣ヲ呈セリ依テ大學教授高橋順太郎氏ニ依托シテ其毒質ヲ檢査セラレタルニ無結晶性フイリキス酸ナルコトヲ發見セラレ爾來サントニ一子及チモ一ルヲ應用セシニ之レモ亦無効ナルヲ認メ石榴根皮五〇〇二〇〇煎ヲ二回ニ分服シ次テリチ子油ヲ投シタルニ犬ニ有効無害ナルヲ認メ其後此ノ法ニ依テ驅虫セリト云フ

サレド檜村氏ノ大敵ハ本能寺ニ非ラズシテ金澤醫學會雜誌第六卷第四十三號ニ在リ即チ同號ニ於テ德本有鄰氏ハ檜村氏ノ所說ヲ驗撃シテ其ノ大畧ニ曰ク本越幾斯ノ爲メ惡心嘔吐ヲ發シ屢々視力障害等ヲ來スコトハ諸家ノ報導ニ接スルモ檜村氏ハ僅ニ二〇位ニシテ死ニ顯スルガ如キハ患者ノ特異質ニシテ最モ不幸ト謂ハザルヲ得ズト若シ同越幾斯ヲ措テ更ニ他ノ安全無害ニシテ確効ヲ奏スルモノヲ發見スルコトヲ得ルモハ實ニ彼我ノ便ト謂フベシ近時檜村博士石榴根皮ヲ應用シテ十分ニ虫体ヲ驅出シ得ベキ者トナシ數名ノ實驗ニ由テ無害有効ノ藥品ナリト稱呼セラルモ是レ疑点ナキ能ハズ同氏ノ實驗セシ石榴根皮ハ風氏藥物書ベンチエリン氏ノ動物試驗ノ一トナーゲル氏ノ所說愛氏內科書等ニ依テ其害毒綿馬越幾斯ニ讓ラズシテ効力遙ニ綿馬越幾斯ニ劣ルヲ立証セラレタリノ一トナーゲル氏ハ知母兒、珊瑚寧、石榴根皮、屈蘇花、加麻刺、等

ハ無効ニシテ綿馬越幾斯ノ右ニ出ヅルモノナシ依テ再ビ綿馬越幾斯ノ世トナレリト稱セラル
ベルケルマン、フェツシエル氏ハ綿馬越幾斯八、〇—一〇、〇、嘔囉仿謨一〇m—一五m、旃那舍一五、
〇ノ合劑ハ嘔吐ヲ來サズト云フ

中條資俊氏ハ葫越幾斯五、〇ヲオブライトニ包ミ頓服セシメ三十分後リチチ油一五、〇ヲ投ジ副
作用ナク驅虫スルヲ賞用セラレタリ(醫事新聞第六百三十二號)

余ハ先ツ準備療法トシテ前後消化シ易キ滋養物ヲ與ヘ翌朝ヨリ絶食ヲ命ジ鹽里母二〇〇、〇ニ
硫酸麻屈涅矢亞三〇、〇乃至六〇、〇(各人便通ノ難易ニヨル)ヲ加溶シ三四回ニ分服(早朝ヨリ午前
十時頃迄)セシメ二三回ノ下利ヲ認メタルキハ午后四時頃ヨリ知母兒二、五乃至三、五ニ那布多里
涅一、五乃至二、〇ヲ混和シ之レヲ「オブライト」五六個ニ包ミ凡ソ三十分間内ニ分服セシメ爾後一
時間ヲ經テ「リチチ」油一五、〇ヲ頓服セシム然ル後二三回ノ下利ヲ認ムルキハ患者ノ好ミニ從フ
テ消化シ易キ滋養ノ攝取ヲ許シ、若シ下利ヲ催サザルキハ灌腸ヲ施行ス、而シテ翌日ハ鹽里母、赤
酒及ビ「ピスミット」ヲ與フ、以上ノ如ク施療シ翌々日ヨリ糞便ノ鏡檢ヲ行フ斯クシテ虫卵ヲ見認
スルキハ再三該療法ヲ反覆ス若シ四回以上同法ヲ施行シテ猶虫卵ヲ認ムルキハ知母兒、那布多
里涅合劑ニ換フルニベルケルマン氏ノ法ヲ以テセリ、然レモ余ガ三ヶ年間ノ該病患者即チ四十
名中三十五名ハ知母兒、那布多里涅合劑ヲ以テ二回乃至四回ニシテ全ク驅虫スルヲ得、二名ハ綿
馬越幾斯ノ力ニ依テ驅虫ヲ遂ゲ(知母兒、那布多里涅合劑ヲ服用セシムル)四回ナリシモ其目的
ヲ達スル能ハザリシモノ、一名ハ知母兒、那布多里涅合劑四回、綿馬越幾斯丸一回投與セシモ尙虫卵

ヲ認メ終ニ患者ハ來院セザリキ他ノ二名ハ一回知母兒那布多里混合劑ヲ投ジタルモ其ノ後來院セズ爲メニ檢便スル能ハザリキ

上述セル如ク知母兒那布多里混合劑ヲ投ゼシ患者四十名中一名モ中毒患者ヲ見認メズ唯僅カニ一名ハ一時間計リ酩酊ノ狀ヲ感ゼシガ如キ自覺症ヲ訴ヘシノミ、又綿馬越幾斯ヲ投ゼシ三名ニ於テモ幸ニ敢テ特記スベキ中毒症狀ヲ呈セザリキ、然レモ是レ實驗ノ僅カナルト、且ツ本院ノ如キハ來患少數ナルヲ以テ小心翼翼々注意ヲ怠ラザル結果ナランカ(完)

○先天梅毒ニ因スル脊髓病

特別會員 岡本京太郎

(澤金)

病歴(外來經過録—ニヨル)

第一例梅野某女兒齡三ヶ月明治三十六年一月十八日初診

一婦人体格矮小筋肉羸瘦顔面蒼日ノ兒ヲ抱キ來リ告テ曰ク「此兒生レテヨリ別ニ變ツタ様子ノナカツタ兩腕ヲ七八日前ヨリ更ニ動かサヌ又之レニ觸レハ泣クヨウニナリマシタ故外科デ診察ヲ願イマシタガ怪我ナドテハナイト申サレマシタ」下兒ノ眼險縁ハ糜爛シ上唇ニハ「ラガーデ」アリ胸背ニ帽針頭大ノ銅色斑散發シ頤部及兩肘關節ノ内面ハ表皮剝脫色素沈着シ臀部陰唇ハ小圓斑狀ノ潰瘍ヲ以テ滿サレ諸腺腫硬、脾亦硬且大、咽頭ハ限酒性ノ慢性充血アリ何レモ先天