

死后一時間ノ狀態顔貌ハ不穩ノ狀ヲ呈シ顔面ハ殆ント鬱血シ眼瞼結膜充血腫孔散大四肢ノ指趾先ハ稍々「チアノーゼ」ヲ呈シ糞便ヲ洩出セリ（普通黃色ニシテ軟）

舌ハ悉ク苔ヲ帶ヒ白布ヲ引ク如ク舌乳頭ハ鬱血ス胸部理學的變狀ハ著シカラス下顎關節稍々強直ヲ呈シ股關節膝關節モ僅カニ強直ヲ呈ス而シテ他ノ腺ニ於テハ腫起ヲ觸レズ創面ハ皮膚ノ切面暗紫色ニ變シ靜脈ハ爵血シ周圍組織ハ一般浸潤ス即チ稍々壤坦ニ陷ルノ狀態ヲ呈セリ

●一種ノ發作性ヒステリー性震顫ノ一例

金澤病院內科室ニテ

藤井助雄

余輩元トヨリ謫劣薄識ニノ實見ニ乏シト雖モ只頃日我が金澤病院內科第一部外來「クリニツク」ニ於テ一病婦ノ奇異ナル震顫發作ヲ訴ヘツ、來レルヲ實見セリ當時余ハ彼ニ入院治療ヲ懇諭セリト雖患者ハ家事ノ多端ナルト亦自己ノ病ノ久シクシテ治愈セサルトヲ知り服從セス只僅ニ數日登院スヘキヲ約セシノミ是レニ由リ余ハ直接ニ患者ニ接スルノ機會少ナク満足ナル研究ヲ得サリキ故ニ只余ハ記憶ニ存スル既往ノ病歴ト發作ニ狀況ヲ單易ニ記述セント欲ス遺脫誤謬ノ罪ハ余ノ甘受スル所諸氏幸ニ其ノ研究ノ粗漏ナリシヲ囁笑スルナカレ

一病婦 今井某 年齡四十七才 石川縣能登郡富來村 僧侶家族

血族ノ關係 叔父ハ卒中ニテ死去シ父ハ肺勞母ハ産后ノ爲メ共ニ黃泉ノ客トナレリ兄弟二人一妹己ニ肺患ニテ鬼籍ニ入レリト其他血族中神經系遺傳ヲ認メス

稟賦及既往病歴 生來强健十二三才ニシテ麻疹ヲ經過セシモ其症極メテ輕ク數日ニシテ治癒セリ間歇熱ニ罹リシコアリ其他著明ノ疾患ニ犯サレタルコナク只時ニ寒胃ヲ患フルノミ而シテ患者生來神經質ニシテ甚タ過敏上衝シ易ク些事ニ精神ヲ勞スルコ多シト

月經ハ十三才ノ時潮來爾東整然規ヲ乱サズ其量中等嘗テ分娩セス又生殖器病ニ罹リシコナシト月經ハ現今尙存ス飲酒セス喫煙ス

本病々歴 明治二十九年十月十六日少シク腐敗ニ傾タル魚肉ヲ食シ數回ノ嘔吐下痢ヲナセリ次テ同月十八日醫藥ヲ取ラントセシニ右手ノ惡寒戰慄ノ際ニ於ケル如キ震顫ヲ來シ漸次全身諸部ニ波及シ横臥セシモ震顫益甚シク殊ニ下肢ハ著シキ蹴ルカ如キ運動ヲナシ強力ヲ加フルモ停止セシムルヲ得サリキト此發作ハ凡ソ三晝夜持續シ止マス患者ハ其間全ク睡眠シ得ザリシト其后發作ハ大ニ緩解シ全ク痕跡ナキニ至レリ然ルニ一昨年七月實父ヲ失ヒタリシカ當時患者ハ大ニ精神ヲ勞シ父ノ尙病褥中ヨリ己ニ強劇ノ震顫發作ヲ來シ且ツ頻々襲來シ凡ソ十數日晝夜共ニ發作シ父ノ死后佛事等ニハ全ク關係スルヲ得サリキト云フ此際ノ發作ハ只全身ノミナラス一二回口角左右ニ著明ノ運動ヲナセリト其后昨年三月迄ハ發作ナク同月ハ輕度ノ下肢ニ震顫發作ヲ來セリ次テ六月亦

中等度ノ發作アリタリト同年九月患者ハ最愛セル一養嗣子ヲ失ヒタリシカ茲ニ再ビ強劇ノ發作ヲ來セリト其後本年春夏ハ異常ナカリシモ十一月一日ヨリ再ビ強劇ノ震顛發作ヲ來セリ當時患者ノ夫ハ痔瘤ノ爲メ手術ヲ受ケ治療中ナリキ發作ハ一日數回起リ三日ヨリ各根部硬變ノ感アリテ舌ノ運動困難言語又大ニ障礙セラル但シ舌ヲ口外ニ出スニハ障害ナシト而シテ發作頻々來ルキハ間歇時尙多少ノ震顛アリ

發作ノ狀況ハ患者ノ言ニ依ルニ全身一時ニ起ルニアラス先ツ何レカ一部ニ起リ次テ他ニ及フト其ノ移行ノ狀特異ナリト而シテ發作ハ多クハ四肢殊ニ下肢ヨリ起ル即チ先ツ右側ニ初發ス右側肢ノ震顛ハ漸次増劇シ次テヤ、緩解ニ傾クヤ直ニ左下肢ニ次テ同一ノ狀體ノ下ニ腰部ヨリ右上肢軀幹次テ頭部ニ及フト云フ

上肢ニ初發スル際亦右方ヨリ起リ次テ軀幹下肢ニ及フ又頭部ニ初發スルトアリ即チ頭チ前後ニ運動スト而シテ眼球ハ上向固定シ眼瞼ヲ開大スルト云フ亦發作中大聲ヲ上ケ涕泣スルアリ發作中殊ニ近時ノモノニテハ手指ヲ掌上ニ屈シ拳狀トナシ強力ヲ用ユルモ之レヲ伸スト雖カリシト發作時ニハ患者運動困難ニシテ起立位ヨリ座位トナリ又ハ座位ニアルキ起立スル極メテ困難ナリト患者ハ自ラ發作ヲ停止セシムルヲ得ス強テ之レヲナスキハ却テ増惡ノ傾向アリ凡テ發作ハ四季氣候ノ變遷時肉體的若シクハ精神的過勞後隙風直接ニ身體ニ觸ル、キハ殊ニ著明ナリ

最モ奇異ナルハ發作停止ノ狀態ナリト云フ初期ニアリテハ發作時香氣ヲ嗅カシムルモ直ニ靜止セリ又傍人ヲシテ一定部ヲ壓迫按摩セシムルモハ一頓ニ靜止スト」排便排尿異常ナク食氣亦佳良ナリ

現在症 十一月二日之レヲ診スルニ患者ハ體格佳良營養亦中等筋肉皮下脂肪層ノ發育亦體格ニ適セリ

頭部頸部顔面ニハ一見異常ナク顔貌亦苦悶狀ナシ瞳孔異常ナシ口角ハ少シク突出シ口ヲ充分哆開スルヲ得ス言語大ニ澁滯ス舌ヲ口外ニ出サシムルモ震顫ナシ

胸部検査上肺心臟共ニ異常ナク心音正調ナリ腹部亦同一卵巢痛ナシ

上肢異常ナク下肢健反射亢進シ知覺異常ナシ

震顫發作ハ外來診察所ニ於テ或ハ診察中數回起レリ而シテ該發作ハ已ニ記述セル如ク或ハ下肢ヨリ又ハ頭部上肢ヨリ起リ種々ノ方法ヲ以テ之レカ靜止ヲ試ミシニ實ニ奇怪ノ感ヲナセシコ多カリキ然レ通院ノ短日ナリシヲ以テ他ノ電氣的試驗等ハ遂ニ行フヲ得サリシヲ遺憾トス、余ノ實見セシ發作ハ多クハ右下肢ヨリ發セリ

今發作ノ狀態ヲバ倚坐位ト坐位トニ分ツテ述ベン

第一倚坐位ノ發作 先ツ右下肢ニ戰慄狀震顫ヲナシ次テ左上下肢軀幹ニ及フ其ノ移行ノ狀甚々迅

速ニシテ手掌ヲ上腿上ニ置カシムルキハ極メテ強劇ニ且ツ殘酷ニ全身ト共ニ擦過狀一種ノ強迫運動ヲナス頭部ハ前後ニ運動ス此際患者ハ尙著シキ苦悶ノ狀ナシト雖モ震顫ハ漸次其ノ速力ヲ緩慢ナラシムルト同時ニ全身軀幹ノ劇シキ跳躍狀運動ヲナシ臀部ヲ劇シク倚子狀ニ衝突セシメ四壁ヲ震盪セシム其狀極メテ殘酷ナリ今ヤ患者ハ苦悶ノ顔貌ヲ呈シ口角ヲ突出ス此ノ際尙患者ハ發言スルヲ得ズ即チ其乞ニヨリアル部ヲ壓スルキ其ノ發作ハ直ニ靜止ス此ニ注目スヘキハ患者ハ震顫今ヤ下肢或ハ腰部ニアリ該部ノ強壓ヲ乞フノ際他部ヲ壓スルモ寸効ナク發作ハ進行スト雖モ患者ノ命スル所ヲ壓スルキハ中途ニシテ震顫ヲ中止セシメ得ルニアリ之レヲ以テ患者ノ夫ハ極メテ得意ニ其發作ヲ停止セシムルヲ見ル

アル一回ノ發作ニハ全身發作ノ停止後口角ノ左右ニ運動セルヲ實見セリ此際布ヲ以テ鼻口ヲ壓塞シ一時呼吸ヲ停止セシムル時ハ直ニ緩解セリ

下肢ノ震顫極メテ輕微ナル際顔面ニ起リ臉裂ハ開大シ眼球ハ上向ニ固定一種ノ顔貌ヲ呈ス今手掌ヲ以テ眼瞼ヲ上方ヨリ強く下方ニ摩擦シ下ス時ハ次テ來ル發作ハ停止ス頭部ハ亦獨リ前後ニ運動スルノミナラス左右ニ烈シキ回轉運動ヲナスヲアリ此ノ時ニ際シ兩耳前ヲ前ヲ指壓シ頭部ヲ固定スルキハ靜止ス一般ニ頭部ノ發作著シキ時ハ他部ノ震動ハ著明ナラサルカ如シ

斯ノ如ク震顫發作ト停止ノ狀体甚ク特異ニシテ恰モ故意的ニナスカ如シ

第二座位ノ發作 其ノ狀亦倚座位ノ時ト異ナルナク患者ハ亦著明ノ跳躍狀運動ヲナス此ノ際患者ハ自ラ横臥スルヲ得スト云フ

震顫發作間歇時ニ患者ヲ診スルモ尙口角ノ突出ト頭部全身輕微ノ震顫ヲ見ル患者ノ云フ所ニヨレハ發作頻々襲來スルキハ然リト雖久シク起ラサルキハ全ク靜止セルナリト云フ

診斷 震顫運動ヲ來スノ疾病ハ震顫痲痺、舞蹈病、老人性震顫、バセドウ氏病、多發性腦脊髓硬變症、痲痺狂、酒客震顫及ヒステリー等其種類少ナカラスト雖モ今本患者ニ就キ類症診斷上注意スヘキハ只震顫痲痺舞蹈病、多發性腦脊髓硬化及ヒステリーナリトス然レモ此等亦各特種ノ症狀ヲ具有セリ

多發性脊腦硬變症ハ震顫亦特異症狀ナリト雖モ發作性ナラス殊ニ注意震顫 Intentionstremor ニシテ其他眼球震盪症ナリ

舞蹈病ハ多クハ幼年者ニ來リ不隨意的運動ハ先ツ手ニ始マリ腕脚軀幹ノ奇異ナル旋轉運動舉揚等ヲナスモ本病ノ如キ震顫ナシ

震顫痲痺 Paralysis agitans ニ在リテハ本病ト大ニ類似セル如キモ震顫發作性ニシテ間歇時ニハ障害ナク震顫ノ不規則ナル手指運動ノ特異ナラザルコト及ヒ震顫發作靜止狀態ノ奇異ナル、身体保持的調節ノ著明ナラザル等ヲ以テ震顫痲痺ニアラザル可シ

然ラバ果シテ本患者ハ何病ナルヤシャルコー氏 (J. M. Charcot) ニモルニ歇私的里患者ニハ往々頑固著明ノ震顫ヲ來スコアリテ之レヲ歇私的里性震戰 Hysterische Zittern ト云ヘ其震顫ノ狀必シモ一定スルモノニアラスト氏ハ其神經病講義ニ於テ本病ノ數例ヲ記載セリ而シテ本患者ノ如ク生來神經質小譫ニシテ精神ヲ些事ニ勞スルコト多ク亦發作ハ常ニ精神ヲ過勞セル時期ニ起リ其ノ停止狀態ノ奇異ナル等其症實ニ變幻出沒ニシテ他覺的一ノ病的變化ヲ認メサル等以テ「ヒステリー」ト診斷スル敢テ大過ナクナカランカ殊ニ本患者今ヤ更年期ニ近ヅキシヲ以テ更ニ「ヒステリー」發作ヲシテ容易ナラシメタルモノナラン

豫後 本病治癒ニ至リテハ或ハ難カランモ從來ノ經過中ニ於ケルカ如ク一時自然ニ靜止ススルナラン而シテ生命ニ關スル豫后ニ至リテハ佳良ナルベシ

療法 一般「ヒステリー」療法トシテ規那煎臭素劑等ヲ用ヒシト雖モ其治療日數ノ短ナルヲ以テ茲ニ充分ナル奏効ヲ見サリシヲ遺憾トス

●按摩術ノ醫療上應用ニ就テ

(承前)

下平用彩述

余ハ前回ニ於テ按摩術ノ施用ニ最モ適應スル主要ナル外科的疾患ノ綱目ヲ舉ゲタリ今ヤ其各病ニ