

十全會雜誌 第九號

原著及實驗

●網膜剝離治療

(通常會獨乙語講演)

高 安 右 人

患者二十八才ノ小學校教員昨年十月二十一日本院ニ來リ診ヲ請フ曰ク九月十七日寒胃ニ罹リ稍高度ノ發熱アリ四日ニシテ治療セシモ爾後右眼視力障害ヲ覺ヘ漸々増惡シテ僅ニ明暗ヲ辨ズルノミニ至レリト又七年前ニ梅毒ニ感染セリト元來患者ハ幼少ヨリ稍強度ノ近視アリ數年前ヨリ眼鏡ヲ用ユト云フ但シ近視遺傳ノ有無ハ不明ナリ

現症ヲ見ルニ普通營養ヲ有スル男子ニシテ他ニ疾病ナク又梅毒ノ症徵ヲ認メズ眼ノ外部亦更ニ變狀ナキモ他醫ノ檢眼ノ目的ヲ以テ「アトロピン」ヲ点入セシタメ瞳孔散大シ又結膜ハ僅ニ充血スルヲ認ム

檢眼上 先ヅ徹照ニヨリ硝子体内ニ稍強度ノ塵末又ハ膜樣ノ混濁アリ多少檢眼ヲ妨クルモ患者ヲ

少シク下視セシメシニ乍チ眼底ヨリ一種ノ青帶灰色ノ反射ヲ認メ其表面波動アリ又一二ノ白色線條其ノ面ニ横ハル血管ハ多少蛇行セリ然レニ皺襞間ニ潛伏スルヲ見ズ故ニ皺襞ハ著シク深カラサルヲ知ル剝離面ハ内外殆ト同等ニ擴ルモ中央部ハ乳頭ヨリ其直徑ノ一倍半下方ニ止マル經界ニハ多少漿液滲出物アルモ出血ハ認メス乳頭黃斑部ニハ異常ナシ脈絡膜ニモ普通近視眼ニ見ル色素變化ノ他異常ヲ認メス尤モ半月狀「コーヌス」ハ兩眼ニ存在ス

視野ノ變化ハ視力減衰甚シキガタメ檢スル事ヲ得ズ

自覺的ニハ視力強度ノ減衰アルニモ係ラズ時々光火色彩閃發アリ光覺甚シク衰フ辨色力ノ如何ハ分明ナラズ視力右眼殆ト零左眼凹面六、D九分ノ六

經過 患者初診翌日即チ十月二十二日入院爾後二週間ハ變動ナシ尙ホ數日ヲ經テ檢ズルニ剝離全ク治シ痕跡ヲ止メズ恐ラク誤診ナリシヤヲ疑ヘリ患者モ亦大ニ視力ノ快復ヲ喜ベリ然レニ是一時ノ幸福ニ止マリ二日ヲ經テ檢眼的變化全ク以前ニ歸リシガ硝子体混濁ハ其内漸々減少シ中心視力亦大ニ回善セリ其後凡二週日ヲ經則チ十一月末頃ニ至リ硝子体混濁全ク消散シ剝離面亦著シク狹小トナリ殆ト固有ノ症狀ヲ失ヘリ十二月十四日ニ視力ヲ檢ゼシニ肉眼ニテ⁶⁰ナリシ檢眼的變化全ク消失シ爾來退院スル迄更ニ變動ヲ見ズ患者十二月末凹面六、五Dニヨリ視力⁶⁰ヲ以テ退院ス本年二月來院檢眼セシニ眼底視力等以前ト更ニ異スルヲナカリキ

治療 暗室ニ入レ安靜ニ保タシメ可成仰臥ヲ命シ壓抵帶ヲ施シ内服藥トノ沃度加里ヲ與ヘ十月三十七日ヨリ毎夜發汗療法ヲ行ヒ之ヲ退院スル迄持長セリ其間時々攪類下劑ヲ投セリ抑モ網膜剝離ハ稀有ノ疾病ニモアラズ又特別新規ノ治療ニモアラザルカ故ニ爰ニ報告ヲナスノ價值素ヨリ之ナキモ元來本病ハ豫后甚ダ不良ニシテ治スルヲ實ニ稀ナルガ故ニ一診以テ豫后ノ不良ヲ論シ患者ヲシテ早ク治療ヲ斷念セシメ萬ニ一ノ僥倖ヲ失ハシムルノ嫌アルヲ信ジ決シテ輕々シク放任スルモノニアラザルヲ爰ニ報ズルノミ

●腎臟水腫患者ノ供覽

(明治卅二年三月於金澤醫會)

醫學士 佐々木 達

本日諸君ニ供覽セント欲スル患者ハ腹腔内ニ於ケル著大ノ腫瘤ナリ腹腔内腫瘤ノ診斷時ニ容易ナラズト雖モ本患者ノ如キハ其現症著明ナルカ故ニ直チニ腎臟水腫ト診斷シ之レヲ内外ノ業績ニ照スモ其實驗稀ナルカ故ニ供覽ノ價值アルモノト信セリ其診斷ノ適否ニ至リテハ患者ノ既往現病ニ就テ判斷セラレンコトヲ希望ム

爰ニ患者ノ病歴ヲ述フルニ先チ腎臟水腫ナル名稱ニ就テ一言スベシ此名稱ニ從ヘハ恰モ靜脈鬱血血行障害等ニ基ク浮腫ナルカ如ク信スルモノアルベシト雖モ其病的機轉ハ全ク之レト異リ輸尿管