

尙ホ「シユロイデル」氏ハ曰ク兩側卵巢囊腫ハ乳嚙性ノモノ最多ニシテ皮様囊腫之レニ次ク但シ余ノ見ル所ニ從ヘバ腺性囊腫ノ兩側ニ來ルコトモ世人ノ信ズルヨリハ多キガ如シト

以上ノ記載ニヨリテ考フルニ余輩ノ本例ハ兩側ノミナラズ同度ノ腺性囊腫ナレバ或ハ幾分ノ興味アルモノナランカ

●長掌筋及びヒ上膊動脈ノ異常一例

〔承前〕

飯塚 忠 男

上膊動脈ノ高處分枝ハ又々次ノ如ク現ハル、トアリ

即チ一ハ小ニシテ一ノ分枝スルナク常位ニアリ或ハ通常ノ如ク分枝シテ総骨間動脈トナリ一ハ大ニシテ下行シ更ニ橈骨動脈及ヒ尺骨動脈トナル此ノ如キキハ骨間動脈ノ高處分枝ト見做スベキモノナリ此ノ骨間動脈ノ高分枝ハ六百屍千二百ノ腕中百〇三ノ變体中五回其ノ内二回ハ腋窩動脈三回ハ上膊動脈ヨリ分枝セリ

又々上膊動脈ハ肘關節窩ノ部ニ於テ三分シテ橈骨動脈尺骨動脈及ヒ総骨間動脈トナルトアリ

●原著及實驗

或ハ通常ノ經過ヲトリ尺骨動脈ヲ既ニ肘窩ノ上部ニ於テ分枝シ二頭膊筋ノ表層縫ノ上ヲ經過シ前膊ノ下三分一ニ至リテ稍ク通常ノ經過ヲ取ルモノアリ

或ハ分枝ノ一枝小ニシテ上膊動脈ノ位置ヲ保チ他ノ一枝ハ大ニシテ上膊動脈ノ前ヲ筋鞘ノ直下ニ上膊ヲ外下行シ肘窩ニ至リテ橈骨側ニ偏シ橈骨動脈及ビ尺骨動脈ニ分ル此ノ處ヨリ尺骨動脈ハ斜ニ尺骨側ニ向ヒ前膊ノ下三分一ニ至リテ尋常ノ經過ヲ取ルヲアリ

或ハ上膊ニ於テ一枝ヲ分ツナク又々二頭膊筋枝及ヒ肘窩ニ於ケル返廻橈骨動脈ヲ除クノ外他ハ通常ノ如ク分枝スルヲアリ

或ハ上膊ニ於テ一ノ短幹ヲ分チ肩胛廻旋動脈及ヒ前後ノ上膊廻旋動脈及ヒ筋枝ヲ出シ其ノ他肘窩ニ於テ尺骨返廻動脈及ヒ正中動脈ヲ出シ而シテ遂ニ前後ノ骨間動脈トナル此ク肘窩ニ分枝セシ尺骨動脈ハ表層ヲ通過シテ筋鞘ノ二板ヨリ圍マレ前膊ノ下三分一ニ至リ通常ノ經過ヲ取ルヲアリ此ノ如キハ比較的屢見ル所ナリ

又々上膊動脈ヨリ細小ナル迷走動脈ヲ出シ橈骨動脈ニ合スルヲアリ迷走動脈ハ上膊動脈ノ高分枝ニ伴フテ或ハ腋窩動脈或ハ上膊動脈ヨリ現ハル、ヲアリ檢者ノ報告ニヨレハ腋窩動脈ヨリ起リシモノ七百六十ノ上肢變体五十四中三回上膊動脈ヨリ起リシモノ一回

迷走動脈ハ又々單獨ニ現ハル、ヲアリ四百四十腕ノ變体四十九中二回ヲ見タリ或人ハ四十一ノ變

体中九回之レヲ發見セリト

迷走動脈ハ多クハ狭小ニシテ表層ヲ經過スルモ稀ニハ橈骨動脈或ハ尺骨動脈ト殆ント同大ナルノ
ミナラス上膊動脈ノ連續トシテ見做スベキ大サヲ有シ橈骨動脈及ビ尺骨動脈ヲ分枝スルヲアリ然
ルキハ固有ノ上膊動脈ハ通常ノ位置ニ於テ正中神經ト共ニ經過シ或ハ尺骨動脈ノ始部ニ開口シ或
ハ高分枝ヲナセシ橈骨動脈中ニ開口スルヲアリ

迷走動脈ハ遙ニ上方或ハ下方即チ前膊ニ於テ橈骨動脈及ビ尺骨動脈ニ開口スルヲアリ橈骨動脈ニ
開口スルモノ百〇三中五回尺骨動脈ニ開口スルモノ一回或ハ指背動脈ニ開口スルヲアリ或ハ尺骨
動脈ヨリ分枝スル處ノ返廻橈骨動脈ノ始部ニ開口スルヲアリ或ハ尺骨動脈ノ下端ニ開口スルヲア
リ斯ル迷走動脈ハ上膊動脈ノ始部ヨリ生シ表在尺骨動脈トシテ見做サル、モノナリ

迷走動脈ノ尺骨動脈ニ開口スルヲノ甚々稀レナルハ諸學者ノ同シク唱フル所ナリ而シテ其ノ迷走
動脈ハ通常二頭膊筋表層腱ヨリハ深部ニ位スルモノニシテ其ノ腱ノ表層ヲ走ルモノハ橈骨動脈ノ
表在セルモノト見做スベキモノナリ

迷走動脈ハ又々其ノ開口スル動脈ノ副根ト見做スヲ得ベシ即チ橈骨動脈ガ三根ヲ有スルヲアリ
一根ハ腋窩動脈ヨリ二根ハ前骨間動脈ヨリス或ハ腋窩動脈上膊動脈及ビ異常ニ延長セル前
膊正中動脈ヨリスルヲアリ或ハ腋窩動脈前骨間動脈或ハ正中動脈トシテ見做スベキ一幹ヨリスル

トアリ

若シ上膊動脈ヨリ出ツル迷走動脈ノ尺骨動脈ニ開口スルモノ上膊動脈ト僅少ナル距離ニ於テ經過スルキハ正中神經ハ上膊動脈ノ後ニアリテ互ニ交叉ス

迷走動脈ハ又々表在正中動脈ノ如キ關係ヲトルトアリ即チ其ノ全經過表在ニシテ橈骨動脈ノ上ニ

テ交叉シ掌側腕骨韌帶ノ下ヨリ手掌ニ達シ淺掌動脈弓ニ開口スルガ如キコレナリ

上膊動脈ヨリ出テシ迷走動脈ハ多ク尺骨動脈ヨリ起リシ返廻橈骨動脈中ニ開口ス

尙ホ古今ニ涉リ東西ニ獵セバ類例千百獲ルニ易カラムモ如何セン縱横學淺ク黑白親ミ難シ冗長モ

ト看官ニ忠ナル所以ニアラザルナリ

斯稿一ニ金子教授ノ示教ニ出ツ特筆其恩ヲ謝ス

◎「アテトジス」ト舞踏病ニ就テ並ヒニ「ロイベ」氏及ビ

「ベルンハルド」氏ノ所謂移行例之實見

醫學得業士 八田 外 二述

余ガ今將サニ報告セント欲スル疾病ハ甚ダ稀有ナラズトハ云ヘ蓋シ屢々ナル場合ニハアラサル可シ殊ニ可ナリ顯著ニシテシカモ當初ハ「アテトジス」ノ斷案ヲ與ヘ次テ舞踏病ノ性状ヲ帶フルニ至