

跡ヲ見ズ是レ頗ル異型タルヲ免レズ。尙該鑑定書ニ於ケル説明ノ項蛇足蜿蜒學者讀ンデ尙其煩ニ絶ヘズ況ンヤ素人ナル法官ニ於テオヤ甲醫ガ殊更其領解ヲ容易ナラシメントセル其勞蓋シ盡ク水泡ニ歸ス須ク斯ル項ハ最モ簡明ナラザルベカラズ其陰性結果ヲ得タル試驗説明ノ如キハ斷然除却シテ亦憾ナシ

余ハ此章ヲ綴ルニ當リ最モ敬重スベキ恩師村上教授ヨリ無限ノ教示ヲ拜受シタリ茲ニ特記シテ之レヲ深謝ス (未完)

乳嘴腫ヲ兼テタル卵巢皮様囊腫ノ Enucleatio

武田正壽

患者村田トヨ 二十七年 飛彈國舟津町酒造家々族患婦十七歳ノ春一月日華始メテ綻ビ其量通常常ニ一週間ヲ持續ス二十才ニシテ嫁シ未ダ一兒ヲ舉ゲス十七歳ノ頃ヨリ二十歳ノ頃マデ屢々子宮出血アリタリト云フ爾后壯健ナリシガ三年前左下腹部ニ於テ兒頭大ノ硬結ヲ觸知セシモ些少ノ障害ヲ感ゼズシテ經過セリ然ルニ本年六月遠行ノ際腹部膨大シ全身羸瘦セシモ硬結ノ増大ヲ感ゼス精神食欲等更ニ違常ナク又疼痛ヲ覺ヘズ常ニ便通秘決シ尿利少量ナリシモ現今ハ通常ナリ月經ハ九月中旬ニ潮來シ四日ヲ持續セリ常ニ遲速不定ニシテ一ヶ月ヲ隔ツルヲアリト依テ來院診ヲ乞フ時ニ明治三十一年十月廿八日全身ヲ檢スルニ休格年齢ニ適シ營養亦甚シク害セラレズ腹部ハ少

シク膨滿シ波動ヲ觸レ腫物ノ内容液及少量ノ腹水ヲ認ム下腹ヲ按ズルニ左方ニ於テ一小兒頭大ノ不動性且ツ無庸性ノ硬固ナル腫瘍ヲ觸レ内診スルニ子宮ト共ニ移動スルアルノミ茲ニ於テカ試驗的穿刺術ヲ施シ其内容ヲ檢セシニ液ハ帶黃色粘稠ニシテ「コレステアリン」ノ光輝アル結晶及毛髮ヲ混ズ依テ卵巢皮様囊腫ノ診斷ヲ以テ切除術ヲ勸告セシニ患者即日入院セリ

手 術

明治三十一年十一月四日午前第十時嚴格ナル婦人科防腐室ニ於テ開腹術ノ手術ヲ舉行セラル室内溫度二十五度五分午前十時三十五分患者手術臺ニ上ル脈搏百〇五至呼吸數二十六時三十七分「ゴロールホルム」ノ吸入ヲ始メ同時ニ莫比一箇ヲ右上臍前面ニ注射ス時ニ脈搏百二十三至十時五十分深麻酔ニ陥ル脈搏七十至呼吸數二十九、十時五十二分臍下部二三仙迷ノ部ニ刀刃ヲ下シ皮膚ヲ切開スルコト大凡八仙迷皮下脂肪層ハ菲薄ニシテ其色淡直腹筋ノ正中部ニ相當セリ十時五十四分腹膜ヲ功開セシニ稀薄琥珀黃色ノ液(腹水)ヲ噴出ス而シテ創口ヨリ剪刀ヲ以テ上下ニ開大セシニ正中線ヨリ少シク左方ニ偏シテ手拳大ノ灰白色ヲ呈セル腫瘍ヲ見ル其面平滑ニシテ諸所ニ不正ナル表在歛損部アリ僅カニ潮紅ス之レ腫瘍面ト腹壁内面トノ癒着セシ部ニシテ体動又ハ腸ノ蠕動ニヨリテ剝離セラレタル痕跡ナラン然ルニ其左方ニ當リテ尙ホ一ノ前同様ノ腫瘍ヲ發見シ稍深部ニ達シ右方ノモノト互ニ粗鬆ナル結締組織ニヨリテ密着シ恰モ孛子ノ如シ壁ハ緊張シテ硬ク僅カニ

波動ヲ觸ル其面平滑ニシテ周圍ノ臟器ト癒着シ其性不動ニシテ莖ヲ有セズ廣ク廣靱帶及子宮ニ密着シ能ク子宮ノ運動ニ伴テ其他左方ノ腫瘍面ニハ莖ヲ有スル胡桃大ノ小腫瘍ヲ有シ暗赤色ノ金米糖狀ニシテ其質弱ク觸ルレバ出血シ易シ而シテ其后面ニモ二三個ヲ觸知セリ之レ腫瘍内ヨリ崩潰シ外部ニ顯ハレタルモノニシテ腹水ノ發生ニ密接ノ關係アリテヲ乳嘴腫ナリ又囊腫ノ壁ハ腸管ト癒着スルコト大ナルヲ以テ容易ク剝離シ能ハズ暴力ヲ加フルキハ腸ノ穿孔ヲ招ク危險アリ故ニ先ヅ其内容ヲ檢スルノ必要アルヲ以テ十一時六分左方ノ腫瘍ヲ穿刺セシニ帶黃色粘稠液ヲ流出シ「コレステアリン」ノ光輝アル夥多ノ小結晶及ビ少許ノ毛髮ヲ混スルヲ發見セリ腫瘍ノ壁ハ柔軟ニシテ且ツ脆ク内面ハ平滑ニシテ暗赤色ヲ呈シ空洞ヲナス次ニ十一時九分右方ノ腫瘍ヲ穿刺セシニ前者ニ比シ其色稍淡ク粘稠ノ度モ僅カニ稀薄ナル前全様ノ「コレステアリン」結晶ヲ混スル液ヲ湧出ス其内面ニ數個ノ小ナル暗赤色ヲ呈スル乳嘴腫ヲ見ル斯ノ如ク内容ヲ除去シテ檢スルニ周圍ハ癒着大ニシテ剝離シ難ク且所謂廣靱帶内發生ニシテ到底全摘出ス可ラザルヲ以テ Enucleatio ヲ施スニ決セリ

十一時二十分左方ノモノニ Enucleatio ヲ施シ内外二板ニ剝離シ十一時二十五分其内板ヲ摘出シ外板ヲ縫合ス其數十二個時ニ十一時四十二分
十一時四十六分右方ノモノニ Enucleatio ヲ施シ十二時三分内板ヲ摘出セシニ該腫ハ尤モ困難ニシ

テ其内斗両板共ニ乳嘴腫ヲ發生シ内板摘出后其底部ノ内面ヨリ出血止マズ烙白金棒ヲ以テ燒灼スルコトハ漸クニシテ出血ノ量ヲ減セリ之レガ爲メニ大ニ時間ヲ浪費シ外板ノ縫合終ルヤ午后一時五分其縫合數十五個一時七分腹壁創口ノ縫合ヲ始メ其數大ナルモノハ個小ナルモノ三個之レニテ全ク手術ヲ終ル時ニ一時二十一分患部ハ法ノ如ク沃度仿護「ガーゼ」ヲ以テ被蔽シ式ノ如ク綑帶ヲ施サレタリ而シテ其摘出シタル内板ヲ以テ詳細ニ之レガ組織ヲ檢セント欲セシニ惜哉他ノ内容液ト共ニ放棄シ爲メニ顯微鏡検査ヲ行フヲ得ザリシハ實ニ遺憾トスル所ナリ

術後ノ經過

術後ハ更ニ異常ナク極メテ安靜ニシテ午后体温三十七度三分脈搏百〇三余至内外ナリシガ第三日ニ至リ午前第七時体温三十八度一分脈搏百十至ニ達セシモ午后ハ三十八度以下ニ下降シ別ニ他ノ症狀ヲ呈セズ其后經過可良ニシテ体温三十六度二三分ヨリ三十七度五分ノ間ヲ昇降シ脈搏ハ七十五至ヨリ九十至ノ間ニアリテ更ニ平常ニ異ナラズ第十一日目(十一月十四日)縫合絲ヲ解キシニ營養モ恢復シ創口ノ癒着完全ニシテ炎症化膿等ヲ認めザリシ其后益々身體強健トナリ十一月二十八日退院セリ

余寡聞未ダ弘ク書籍ヲ涉獵セズト雖モ卵巢ニ發生スル實體性新生物ニシテ乳嘴腫ハ其例饒多ナラザルコトハ諸家ノ認知スルトコロ而モ皮様囊腫ニシテ乳嘴腫ヲ合併スルカ如キハ其稍々稀有ニ屬ス

ルモノナランカ且ツ皮様囊腫ハ常ニ兩側ニ來ルヲ多シトセララルルニ一側ニシテ二個全形ノモノヲ生ゼルガ如キハ又以テ聊カ奇異トナスニ足ラン乎

右ハ恩師小川教授ノ執刀ニヨリ其示教ノ下親シク實驗スルノ好期ヲ得タリ依テ茲ニ報道スルコト如此矣

長掌筋及上膊動脈ノ異常一例

飯塚 忠 男

左ニ記載スルハ昨年十一月解剖實習ノ際實驗セル長掌筋及ヒ上動脈ノ異常ナリ此ノ異常タルヤ共ニ稀有ニ屬スルモノニアラス從テ既ニ先哲ノ報スル所少カラスト雖ヒ而カモ此ノ例亦タ小差ナキニアラズ依テ茲ニ「ヘンレー」氏解剖書ノ一節ヲ抄シ以テ對照ニ便ス學海ノ一滴固ヨリ掬スルニ足ラザルナリ

余ノ實驗セルハ營養稍中等〇〇〇歳ナル一女屍ノ右側ニ於テ此ノ兩異常ヲ認メタリ而シテ其ノ長掌筋ハ重複ニシテ内撓骨筋ト内尺骨筋ノ間ニ位シ撓骨側ノモノハ内上顆ヨリ起リ下行シテ細長ノ腱トナリ手掌腱膜ニ終リ尺側ノモノ即チ副筋ト見做スヘキモノハ前者ト同形同大ニシテ内尺骨筋ノ一部ト共ニ内上顆ヨリ起リ掌側腕骨靱帶ニ停止セリ

「ヘンレー」氏解剖書ニヨレハ此ノ筋ハ欠損スルヲ多ク兩肢共ニ欠損スルモノ三分ノ一一肢ニノミ