

殊ニ筋肉ニ作用ヲ及ホス者ナリ即チ之ニ由テ筋細胞ノ活力ヲ鼓舞振作シ以テ筋ノ榮養ヲ旺盛ナラシム故ニ該法ハ殊ニ筋ノ萎縮セル者ニ用非テ大ニ効アリトス又拍打法ハ或ハ局部ニ充血ヲ起サシメ以テ誘導ノ効ヲ奏シ或ハ局部ノ筋肉ヲノ收縮ヲ起サシムルノミナラス其收縮ハ延テ筋ノ全長ニ亘リ又不隨意筋ニ波及スルヲ以テ其効用ハ恰モ感傳電氣ノ如ク爾リ故ニ該法ハ又萎縮セル筋肉ヲシテ強實ナラシムルノ効アル者ナリ此他拍打法ハ神經ノ末梢ヲ鈍麻セシムルノ作用アルヲ以テ神經痛ヲ鎮止スルノ効アリ又所謂振顫法モ殊ニ興奮セル神經機能ヲ鎮靜スルノ作用アルモノトス斯ノ如ク按摩術ノ効用タル頗ル廣且ツ大ナルヲ以テ病症ニ應シ其用法ヲ誤ラスシテ之ヲ施用スルキハ其醫療上ニ及ホス鴻益ハ實ニ偉大ナル者ナリ故ニ該術ハ内科、外科、産科、婦人科、眼科等諸科ノ疾患ニ於テ應用セラレサルコト無シ尙左ニ是等各科ニ於ケル按摩術ノ應用ヲ畧述シ以テ此演說ヲ終ラントス

(未完)

◎ 婦人ノ腹水

岡田 剛 吉述

茲ニ婦人ノ腹水ト云フハ心肝腎腹膜ノ疾患ニ由テ發スル者ニ非スシテ婦人固有ノ者詳言スレハ婦人生殖器病ニ由テ發スル腹水ニ就キ二三ノ實驗ヲ畧述セントスルノミ

婦人ノ腹水患者ニ遭遇シ毎常吾人ノ念頭ヲ離ルヘカヲサルハ卵巢囊腫若ハ妊娠就中前者ニ非ル乎ノ疑ヲ以テ之ヲ診別スルニアリ其診別タルヤ臨床上敢テ難キニ非ス殊ニ囊腫ノ初期小ナル者妊娠

ノ末期大ナル者ニ於テ然リ即チ彈力性限局性腫瘍ノ單囊狀或ハ複囊狀ヲナシ一部硬固ナルアリ柔軟ナルアリ全部或ハ一部ニ波動ヲ觸知シ体位ヲ變更セシムルモ著シク變形スルヲナク他動的ニ腹蓋下ニ於テ上下左右或ハ其一ニ方ニ移動セシムルヲ得ヘク(殆ト全ク移動セサル者アリト雖モ)打診スルニ側腹鼓音中部濁音ヲ呈シ体位ヲ變セシムルモ鼓濁部位ヲ異ニセス又患者病初腫瘍ノ下腹ヨリ漸々膨大シタルヲ記憶スル等ニヨリ囊腫タルヲ知リ猶内診ニ由テ腫瘍ノ下部ヲ子宮外ニ觸知スレハ卵巢腫瘍タルヲ確定シ得ヘシ腹水ハ全ク之ニ反ス然レモ囊腫ノ穿刺或ハ自破シテ其内容漏泄シ囊壁弛緩シタル者ハ大ニ鑑別ニ苦ムコアリト雖モ數日ノ經過ヲ見レハ之又困難ナラサルナリ妊娠ト誤ルハ例外ナリト雖モ緊滿シタル多量ノ腹水中ニ妊娠シタル者ハ外部ヨリ子宮體胎体等一モ知ルヲ得ス經閉乳暈着色等ノ不確兆候ニ由リ内診ヲ行ヒ下向胎体ヲ觸知シ以テ之ヲ確定スルノ最モ注意スヘキハ卵巢腫瘍ニ因スル腹水ナリ吾人ノ遭遇スルコト敢テ稀ナラス最モ多ク腹水ヲ發スルハ乳嚙性囊腫及癌腫ニシテ肉腫及腺腫モ亦腹水ヲ發スルコトアリ之等ノ腫瘍ハ單發スルコトアリト雖モ囊腫(殊ニ多房性)ノ一部變性シタル者多ク病理解剖上甚複雜ナル名稱ヲ附スヘキ者アリ例之ハ癌腫性粘液肉腫、囊腫性腺癌、囊腫性腺肉腫等ノ如シ

腹水中ノ腫瘍ヲ診スルハ容易ト云フヲ得ス殊ニ多量ノ腹水小ナル腫瘍ニ於テ然リト雖モ精密ナル内診ニヨリ腫瘍ノ一部ヲ觸知スルコト恰モ妊娠子宮殊ニ多量ノ羊水中ニ浮遊シタル胎體ヲ觸知スル如ク又内診ニヨリ腔穹隆ヲ隔テ之ヲ觸知スルコトアリト雖モ穿刺シテ腹水ヲ漏シ始テ腫瘍ノ形

狀硬軟莖ノ關係癒着ノ有無及腹膜ニ轉移ノ如何ヲ精査シ得ルナリ
以上略陳セシ如キ腫瘍ノ如何シテ腹水ヲ發スル乎ニ至テハ或ハ血行障礙ニ歸シ或ハ腹膜ノ器械的
刺戟ニヨル炎症滲出ナリト云ヒ未タ一定ノ確説ナシ

腹水ノ源因果テ卵巢腫瘍ニアルヲ確知スレハ之ヲ切除シテ其病根ヲ除キ得ルヤ否ヲ考ヘサルヘカ
ラス即チ莖ノ關係癒着ノ狀態及ヒ全身症狀即チ惡液衰弱貧血ノ度等ヲ考慮シ之レカ斷定ヲ下スハ
實地上忽ニスヘカヲサルナリ要ハ病初ニ於テ切除スルニアリト雖モ如何セン患者ノ醫ニ來ルハ末
期腹水ノ度増進シタル後ニアリ左ニ二三ノ症例ヲ略陳ス

(一)多田某齡三十六醫師ノ妻十七才ニシテ月花開キ同年嫁シ十九才ニシテ早産(七ヶ月)シ二十四
歳ニ至ル迄二男一女ヲ産ム明治二十七年十二月(患者齡三十四)閉經三ヶ月自ラ薩比那ヲ服セリト
云フ明治二十八年二月下腹ニ塊狀物アルヲ自覺シテヨリ以來漸々膨大セシカ十月二十九日忽然腹
部弛緩縮平シ次テ半日間多量ノ尿利アリタルノミ特異ノ異常ナク經過セリ明治二十九年四月ニ至
リ腹部再ヒ膨大周圍百一珊迷ニ至リ呼吸及働作困難同月十六日穿刺シテ凡ソ七升計ノ液ヲ漏シ腹
圍九十珊迷ニ縮小セリト雖モ爾來再ヒ増大スト云フ大便一日數行尿利減少同年六月三日來院
體格佳良榮養中等胸部異狀ナク腹部一般ニ弛緩膨大シ臍部ニ於テ腹圍九十八珊迷左下方鼓音右下
方濁音ヲ呈ス觸診スルニ臍ノ右下方ニ腹水ヲ隔テ、一腫瘍ヲ觸知シ指壓ニ應シテ浮沈^{フロイトレン}ス内診スル
ニ子宮後轉シ左方ニ牽着シ宮腔九珊迷腫瘍ハ子宮ニ直接セス六月一日臍圍百一珊迷ニ達ス
六月十二日腹壁ヲ切開シ多量ノ腹水ヲ漏ラシ多房性兒頭大ノ囊腫左卵巢ヨリ發スルモノヲ摘出ス

(小川教授執刀)莖ノ長太中等手術困難ナラス摘出シタル囊腫ノ内面ニ數多ノ圓形或ハ不正形ノ豆大乃至桃大ノ凸隆アリ切面髓様ニシテ肉腫ノ觀ヲナス病理部ニ於ケル鏡驗ニヨレハ腺腫ニシテ密列シタル圓柱上皮ノ管狀或ハ分葉狀ヲナシ結締織基質中ニ灣入スルヲ見ル術后ノ經過平滑七月初旬退院ス

明治三十年一月夫ナル醫ヨリ郵信アリ曰ク妻ナル患者昨年十月迄ハ身体及腹部異狀ヲ見ス全治シタル者ト喜居タリシカ十月中旬ヨリ再ヒ腹部膨大ヲ始メ十二月ニ至リ緊滿堪ヘ難キニ至リ刺テ多量ノ腹水ヲ漏シタルモ榮養大ニ衰ヘ立ツヘカヲサルニ至リ翌一月再ヒ穿刺ノ止ムヲ得サルニ至リ施術ノ當夜就眠中刺孔ヨリ猶多量ノ漏液アリ二月初虚脱状態ヲ以テ死ス

(二)辻某齡五十五車夫ノ母明治三十年四月ヨリ腹部膨大六月ニ至リ緊滿甚シク一醫穿刺シテ五升計ノ液ヲ漏ス爾來同年十二月ニ至ル迄七八回ノ穿刺ヲナシ初ハ一ヶ月一回ノ穿刺ニテ堪ヘシモ九月ヨリ一ヶ月二回ニシテ猶堪ヘ難キニ至レリ病初ヨリ腹痛ナク食不振大便一日一行尿利減少スト云ヲ

同年十二月金澤病院婦人科ニ來ル体酪中等榮養不良脈數ニシテ軟弱呼吸淺表稍促迫ノ狀アリ腹部一般ニ膨大緊滿彈力性ニシテ皮膚蠟白光澤アリ鼓濁兩音ノ部位變化等腹水ナルヲ判明ナリ心音弱キモ清尿又清澄ニシテ褐色ヲ帶ヒ肝濁音界一助上昇スルモ下界明ナラス穿刺シテ微黃澄明液ヲ漏ス液中暫時ニシテ纖維ノ凝固ヲ生ス漏液後下腹ニ不正形ニシテ彈力性部及ヒ軟骨様硬部トヲ觸知スル腫瘍アリ左右及少シク上下ニ移動セシメ得ヘク上ハ臍ニ達ス腔狹硬子宮小ニシテ拮指大腫瘍

ノ下方少シク前ニ離在ス

十二月二十四日小川教授執刀著シキ困難ナク摘出スルヲ得タリ術後記スヘキ變化ナク一月下旬退院ス腫ハ多房性嚢腫ニシテ内面硬ク乳嚢ヲ見表面又二三ノ小乳嚢ヲ見タリ

本年四月十六日再ヒ來院シテ曰ク二月初ヨリ腹部又稍豊大食不振身體倦惰脱力甚ク大便或ハ結シ或ハ下利スト云フ之ヲ診スルニ一月退院ノ當時ニ比スレハ顔貌大ニ憔悴皮膚枯燥惡液ノ狀ヲ呈シ脈數弱呼吸又淺頻歩行等ニ際シ呻吟ス腹部弛緩皺襞ヲ現シテ稍膨大シ波動アリ上位鼓音ヲ發シ臍ノ右下方ニ掌大ノ限局性濁音部アリ胃部著シク限畫シテ膨隆シ壓スレハ痛ヲ訴フ即日入院以來日々體温三十六度ヲ越ヘス時々胃痛ニ苦ミ莫非注射ヲ要スルヲ三四回又時々嘔吐シ食慾殆ントナク唯日々口喝ノ爲メ牛乳一合粥汁一茶碗ヲ飲ムノミ四月末内科ニ送ル五月上旬衰弱ニ由テ死ス剖見上腹水アリ幽門及腹膜癌アリ腫莖ノ結紮部ハ能ク結痕萎縮シ再發ノ兆等ナカリシト云フ(余ハ他用ニテ傍觀セス)

(三)安原某齡三十八曾テ妓ヲ業トス生來弱公嫁セス十八歳ノ春月花開キ爾來整每經二日間未妊九年前三ヶ月間經閉胃部及下腹痛全身稍浮腫ス數日ニシテ治シタルモ爾來時々腹痛ヲ發シ下腹ニ小塊アリテ漸々増大シ昨年六月入院ス體格瘦長皮膚菲薄細靜脈ヲ透見シ得ヘク脈小弱百十至大便結不通七日ニ亘ル食稍不振腹部一般ニ緊張膨大臍部最大圍九十六珊瑚迷全ク腹水ノ症狀ヲ具備シ水ヲ隔テ、殆ント下腹ヲ充ス處ノ硬キ不正形ノ腫瘍ヲ觸知シ稍右方ニ偏ス壓スレハ痛ヲ訴フ

六月二十日穿刺約八千立方珊瑚迷ノ腹水ヲ漏ス透明微黃纖維素ノ絮樣凝固ヲ生ス穿刺後按診スルニ

腹壁甚々薄ク直ニ腫瘍面ヲ觸ル、如クニシテ其部痛ヲ訴フ腫瘍ハ不正ニシテ表面粗糙磊々稍左右ニ移動セシムルヲ得内診スルニ子宮小ニシテ硬ク右前方ニ屈シ腫瘍ニ密着セス在院一ヶ月榮養狀依然不長腹水再蓄セスシテ退院ス

本年七月再來曰ク一月ヨリ腹部又漸々膨大スト最大圍百〇四珊迷穿刺シテ淡褐色液六千五百立方珊迷ヲ得昨年ニ比シ榮養食慾脈狀共ニ佳ナリ

七月十二日開腹(小川教授)稍血色ヲ帶ル腹水多量ヲ泄ラス腫瘍ハ下腹小骨盤内ニ蟠居シ上部ハ腸間膜右方ハ一部腸骨ニ癒着シ表面ハ血管ニ富ミ乳嘴狀桑椹狀ノ物累累々相連リ指擦ニ由テ容易ニ出血シ根帶廣クシテ求極スルヲ得スシテ止ミ腹壁ヲ縫合ス術後經過平ニシテ二十三日繃帶ヲ去リ三十日退院ス

八月十六日再來穿刺八千五百立方珊迷濃厚黃褐色液

九月八日穿刺一万四千四百立方珊迷濃厚暗褐色

(四)橋本某齡十八機業主ノ妻生來輕麻疹ノ他記スヘキ病ナシ十四歲初經以來整正十七歲(昨年)嫁ス本年(明治卅年)三月中旬腹部緊痛一週間計ニシテ一旦緩解シタルモ數日ニシテ再ヒ全腹緊滿疼痛アルノミナラス腹滿漸々増劇セシカ六月初ヨリ醫治ニヨリ稍縮小セシモ病初ヨリ時々惡寒發熱シ食稍不振大便或ハ下利或ハ結スト云フ

六月下旬往診ス體幣孱弱榮養稍不良ナリト雖モ敢テ貧血ト云フヲ得ス腹部一般ニ緊滿シ按壓スレハ稍痛ヲ訴フ右下腹ニ於テ深部ニ抵抗物アルカ如ク感スルモ確實ナラス胸部異狀ナシ結核性腹膜炎

炎ノ疑診ヲ付シ主治醫ニ託ス七月二十一日來院曰ク七月初ヨリ腹部漸々縮小シ熱發セス心思又快ナルモ下腹ニ硬結物ヲ觸ル由テ更ニ診ヲ乞フト之ヲ診スルニ言ノ如ク腹部弛緩縮平スト雖正形ノ腫臍以下ヲ充タシ右方ハ腸骨窩部ニ於テ鏡ク限界スト雖上下及左方ハ其限界嚴然タラススルモ痛ナク平滑ナル表面ニ小凸角アリ少シモ移動セシムルヲ得スレハ帶鼓濁音ナリ内診スルニ子宮ハ異狀ヲ認メス後穹隆部ニ硬結ヲ觸レ雙合診ニヨリ腫瘍ト内外相應ス下腹ノ惡性腫瘍兼慢性腹膜炎ト診シ摘出シ難キ者ト察シ強テ手術ヲ勸メス九月ヨリ再ヒ緊滿發熱十月ニ至リ遂ニ死亡セリト云フ

右症例ハ金澤病院婦人科部ニ於テ部長小川教授ノ下ニ前醫員岡本京太郎等ト共ニ實驗セシ處ニ據リ其梗概ヲ記セシノミ

◎ 僞盲ノ鑑定

渡 孚 貞

「百讀一診ニ如カス」トハ嘗テ佐藤學士ノ實用產科學書中見出シタル箴言ナリトス宣ナル哉言ヤ余眼科學ニ將タ法醫學ニ懇懇ナル恩師カ高教誘示ヲ恭フスル實ニ久シカラストセス而モ面リ其實例ニ接スルノ機ニ乏シク轉々隔靴搔痒ノ感ニ堪エサル者多シ蠢愚素其大因ヲナスト雖正一診ヲ得サルノ不幸亦與ルナキ能ハス殊ニ彼ノ僞盲看破法ノ條ヲ繙ク毎ニ常ニ層一層其感深ク先學ノ士活眼一睨立所ロニ邪者ヲシテ畏縮セシメタル當時ノ快ヲ想フテ羨慕眞ニ措キ難シ偶々本年八月郷ニ歸