

コノ筋ノ臨床上ニ於ケル關係ハ生等ノ未タ學ハサル所固ヨリ先輩諸君ノ一考ヲ煩ハスヘキモノ然レモ膝膈ニ於テ脈管ヲ結紮セントスル場合ノ如キ或ハ注意スヘキモノニアラサルナキカ聊カ記シテ示教ヲ乞フ

因ニ記ス本件ニツキテハ恩師金子教授ノ指導ヲ辱フシ大ニ利スル所アリタリ因テコゝニ鳴謝ス又該筋ハ甚タ稀有ノモノニシテ同教授スラモ今回始メテ遭遇セラレタリト云フ

◎卵巢囊腫摘出術傍觀記事

藤井助雄

一千八百〇九年 Ephram Mc. Dannel 氏カ John Bell 氏ノ指導ノ下ニ初メテ規則的ニ卵巢囊腫摘出術 Ovario-kystomectomia ヲ實施シ佳良ノ成績ヲ得テ以來泰西ノ諸大家續々トシテ輩出シ嶄新ナル考案ト諸般ノ沿革ニヨリ此ノ術益々賞用セラレ遂ニ今日ノ盛ナルヲ至セリ而モ駿々タル醫學ノ進歩ト共ニ吾人又屢々之ヲ實見スルヲ得ルノ機運ニ達ス而シテ予カ今茲ニ記載セントスルモノ亦タ實ニ此一例ノミ固ヨリ敢テ珍奇ナルモノアルニアラス又特ニ價値アル所ノモノアルニアラサルナリ且ツ前號河合君ノ報告アリ貴重玉林ノ紙上再ヒ重複ノ記事ヲ掲クルハ或ハ識者ノ嗤笑ヲ招カン事ヲ恐ル然レトモ此卑近粗蕪ナル一小實見談偶々又手術ノ他ニ猶ホ臨床上甚タ注意スヘキ事ノ併有セルヲ覺知ス固テ淺學寡聞ヲ省ミス茲ニ其概要ヲ記シ以テ大方諸君ノ猛省ヲ乞フ所アラントス

患者

某婦

富山縣人

年齡五十三才

●原著及實驗

既往症 患者天賦強壯ニシテ嘗テ大患ニ罹リシコナク只數年前ヨリ腰痛ニ苦シメリト云フ齡十四才ニシテ嫁シ十五才ノ夏月華初メテ開キ爾來正順ニシテ嘗テ月經時ノ障害ナク其量少許ニシテ凡ソ二三日持長ス齡四十三才ニシテ月經閉止セリ未タ嘗テ妊娠セヌ五六年前月經時ニ多量ノ血塊ヲ混セシコアリト云フ

昨年二月頃腰部及下腹ニ疼痛ヲ感シ下腹中央部ニ當リ拳大ノ硬結ヲ觸知セリ其后漸次増大シ時々鈍痛ヲ發起スルニ至ル是ニ於テ三ヶ月前初メテ某醫ニ診ヲ乞ヒ治療ヲ受ク某醫時ニ下腹硬結ニ向テ藥液注射ヲ行フ然ルニ其後該部腫起潮紅シ遂ニ下腹一面ニ蔓延シ熱發疼痛ヲ來シ一ヶ月前自開排膿セリト云フ。便通一日一乃至三行稍々下痢性痙痛ヲ供フ排尿困難ナシ

現症 三十年六月十三日之レヲ診スルニ体格營養共ニ中等皮下脂肪層亦佳ナリ胞廓ノ造構通常ニシテ理學的檢査異常ヲ認メス

腹部ヲ視診スルニ臍下部ニ當リ長方形ナル七八仙迷ノ邊緣不正ノ暗紅色ナル潰瘍ヲ見ル觸診スルニ下腹ニ兒頭大ノ移動シ易キ腫瘍アリテ其面平滑ナリ腫瘍ハ臍ニ達ス。當時夏季休暇中ナリシヲ以テ單ニ潰瘍ノ所置ヲ施シ休暇終ツテ後手術ヲ受クヘキヲ諭シ一旦歸郷セシム。同年十月二十八日再來入院ス之レヲ檢スルニ腫瘍ハ著シク大トナリ測診上臍圍最大ニシテ八十二仙迷耻骨縫際臍間ノ巨離十三仙迷腫瘍ハ耻骨縫際上二十四仙迷ニ達セリ觸診上左下腹部ハ右ニ比シ稍々抗抵強シ腫瘍ノ面ハ平滑ニシテ稍々移動シ難シ内診上子宮ハ既ニ老人性萎縮ヲ呈シ前屈シ左方ニ偏倚ス稍固定セラレ僅ニ移動シ得ルノ外他部ノ異狀ヲ認メス下腹中央部ノ潰瘍ハ已ニ癬痕ヲ結ヘリ嘗テ下

劑ヲ服用セシコトナキモ三ヶ月前ヨリ尙下痢シ止マズ裡急后重アリ時トシテ夜間五六行ニ至ルト
(因ニ俗間所謂脹滿症ニ向テ往々妄リニ下劑ヲ持續シ爲メニ頑固ノ下利症ヲ起シ大ニ營養ヲ損シ
徒ラニ衰弱ニ滔ラシムルコトアリト云フ注意スヘキコト、ス)

入院後所置 先ツ下痢ニ向テ處置シ漸次治ニ傾クヲ待チ手術ヲ行フ

手術 十一月二日午前九時四十五分嚴重ナル消毒ノ後婦人科手術室ニ於テ恩師小川教授ノ執刀
ノ下ニ施術セラル(室温二十八度)先ツ式ニ從ヒ臍下白條ニ沿フテ凡ソ七仙迷腹壁軟部ヲ切開ス腹
壁脂肪層及ヒ筋肉ノ發育共ニ佳良截開ヲ進メテ腹腔ヲ開クニ腫瘍ハ蒼白色ニシテ其面滑澤ナリ腫
瘍ヲ截開セハ帶黃褐色粘稠液稍多量ヲ漏ス内部ヲ指診スルニ腫瘍ハ左卵巢ヨリ發生シ喇叭管廣汎帶
房壁ヲ破ルニ前全様ノ稍稀薄液ヲ漏出ス腹腔内ヲ檢スルニ腫瘍ハ左卵巢ヨリ發生シ喇叭管廣汎帶
ト一面ニ癒着スルノ外他ニ癒着ナク移動シ易シ莖ハ短且ツ廣ナリ腫瘍ヲ抽出シテ莖ハ三分シテ結
紮シ次テ一條ノ總結紮ヲナシ之レヲ切斷ス時ニ十時四十一分腹壁ニハ六條ノ縫合糸ヲ貫キ莖切斷
端ハ出血ノ有無ヲ檢シ清拭シ結紮糸ヲ短切シテ之レヲ腹腔内ニ還納セリ其後腹壁創ヲ縫合シ他ニ
尙四條ノ副結紮ヲナシ茲ニ手術終ル干時十時五十八分手術時間凡ソ六十三分

術後經過 極メテ佳良ニシテ体温六度半乃至七度ノ間ニアリ術后第七日ニ一回灌腸ヲナシ軟便
小許ヲ得タリ第十一日(十二日)ニ縫合糸ヲ拔去シ創面ハ全ク第一癒合ニテ治セリ第十二日ヨリ体
温漸次昇騰シ朝温八度夕温八度五分ニ至ル本日灌腸ヲ施シ少許ノ軟便ヲ得タリ越エテ翌日ニ至ル
モ尙下行セス亦創面ヲ檢スルニ少シモ異常ナシ少シク感冒ノ氣味アリテ胸壁前部ニ僅ニ氣管枝炎

ノ症アリ依テ水曹ヲ内服セシム、十四日朝体温下行シ三十七度五分トナレリ然ルニ夕刻ニ至リ再ヒ昇騰シテ三十八度五分トナル翌日更ニ上昇シテ夕温三十九度ニ及ヒタリ本日胸部ヲ精シク診セシニ右肺背下部ニ於テ輕度ノ濁音ヲ呈シ其他稍肺炎ノ症候ヲ呈セリ第十七日朝三十八度六分夕方三十九度四分第十八日朝三十八度五分夕方三十八度六分ナリシカ此所ニ体温ハ分利性ニ下行シ第十九日朝三十六度トナリ脈搏八十至、爾後体温漸次常ニ復シ營養回復シ十二月二日全治深ク再生ノ恩ヲ謝シテ退院セリ

上述ノ所見ニ據レバ予ガ此一例ニ於ケル恢復期間ニ發セシ輕症肺炎ハ實ニ意外ノ過發症ニシテ又詢ニ甚タ稀レニ見ル所ノモノナルベシ蓋シ手術后創面ノ炎症化膿ニヨリ熱發スル事ナキニアラスト雖モ本症ノ如キハ更ニ手術ニ關係ヲ有セス即チ純然タル肺炎ノ合併シタルモノニシテ創傷治癒ニハ毫モ影響ナカリシモ只之カ爲メ本病治シテ后猶數日患者ヲシテ院ニ止マルノ不幸ヲ見シテ憾ムノミ

余ハ尙終リニ臨ンテ一言讀者ノ注意ヲ喚起セント欲ス他ナシ患者カ腹壁中部ニ存セシ潰瘍卽是レナリ

抑モ卵巢囊腫ニハ主トシテ藥液注射ヲ行フ事ナシト雖モ稀レニ子宮筋腫ト誤マリテ「エルゴチン」ヲ注射スルモノナキニアラス該患者ニ施療セシ某醫又果シテ先キ「ミオーム」ト誤診シタルヤ否ヤハ予輩ノ知ル所ニアラスト雖トモ而モ彼ノ注射局部ニ續發セル化膿潰瘍ハ必ス當時(一)注射器ノ清淨不充分ナリシカ或ハ(二)局部防腐消毒ノ確實ナラザリシカ或ハ(三)製劑ノ不純ナシカニ基

因セスンハアラス換言スレハ之レ醫ノ不注意疎忽ノ至ス所ニシテ又安ソ其ノ罪ヲ負フヘキ所ナシトセンヤ。聞ク「エルゴチン」ノ製劑タルヤ其方法適當ナラサルカ或ハ純粹ナルトモ其容器ノ不潔ナル時或ハ製劑ノ新鮮ナラサル時ハ黴菌ヲ生シ藥液ノ分解ヲ促シ爲メニ注射部ニ劇甚ナル炎症ヲ發シ化膿ヲ呈シ遂ニハ懷疽ニ陥ル事アリト是故ニ吾人ハ麥角ヲ使用セントスルニ當テヤ頗ル注意ノ要スヘキモノナル事今ヤ一層深ク感スルニ至ル乃チ茲ニ之ヲ附記シテ以テ大方同好諸君ノ參考ニ供スト云爾

◎左卵巢ヨリ發生セル纖維筋ノ一例

渡 孚 貞

余輩無學ノ徒猥リニ不能ノ筆ヲ弄シテ先人猶未タ多ク見サルノ一實見ヲ報セント圖ル螻蛄ノ斧徒ヲニ貴重ナル誌上ヲ汚瀆スル其罪ヤ蓋シ重且大ナリ而モ進ンテ之ヲ犯ス所以ノモノハ一片ノ婆心「己レヲ益スル所博ク之ヲ頽タサルヲ得サル」ニ依ル讀者幸ニ諒セヨ

此稿ヲ草スルニ際シ恩師小川教授並ヒニ先達岡本京太郎君ヨリ幾多懇切ナル高教誘掖ヲ忝フセリ茲ニ特筆シテ其厚恩ヲ深謝ス爾云

シヨンハンター曰ク「一世ノ外科醫能ク其失誤ヲ世ニ表ハスニアラサレハ外科ノ進歩ハ得テ望ムヘカラス」ト豈敢テ外科醫ノミノ箴言ナランヤ内科ニマレ眼科ニマレ將タ亦婦人科産科ニマレ苟モ身ヲ治療醫學ノ一端ニ措ク者能ク已レカ失敗過誤ヲ世ニ表ハシ以テ先達ノ批判明教ヲ仰キテコソ始メテ斯學ノ進歩ヲ謀リ得ヘキナレ彼ノ徒ヲニ功ヲ誇リ失ヲ蔽フニ汲々タル者ノ如キハ名利ノ