

# 十全會誌

第貳號

(明治三十年三月十日發行)

## 原著及實驗

### ◎<sup>エリユトロメラルギ</sup>擇捉免拉爾義ノ實驗

會員 高橋 剛吉

明治廿九年六月七日、本縣石川郡三馬村農中川ヨリ、年齡十九、金澤病院ニ來リ予ノ診ヲ受ク  
問診 四日前ヨリ顔面及四肢ニ腫張ヲ來タシ、雙手ト兩下腿ニ紅色斑紋ヲ生シ、全部ニ熱灼疼痛ヲ  
覺フ、患者ハ數年前ヨリ毎年四五月ノ候ニ至レバ本病ヲ發シ、兩三日ヲ經レバ自ヅカラ治癒スルヲ  
常トシ、其父及女弟モ亦屢々全症ヲ患フ云々

望觸診 顔面ノ腫張ハ既ニ全ク散消セシカ之レヲ認メザリキ、兩手ハ背面手腕關節攣骨側ヨリ第  
一乃至第三中手骨部ト拇指、示指、及中指第一節ノ基根部ニ涉リ、掌面ハ全拇指球ニ蔓延セル腫起  
ニ伴フ紅斑アリテ、手腕關節ニ近キ部ハ其色淡紅ニシテ腫起モ亦タ著シカラズ、末梢ニ前ムニ從テ  
鮮紅トナリ、腫起ノ最モ著シキ腕前指節關節部ハ紫紅色ヲ呈セリ、該部ヲ按スレバ他部ニ比シテ溫  
廣高キヲ覺ヘ、指壓ヲ加フレバ褪色セリ、兩下肢ニ於テハ膝關節以下所々ニ赤色不正形ノ斑紋ヲ見  
ハセルモ其色双手ノモノニ比スレバ適カニ淡クシテ腫起ヲ呈セズ、灼熱疼痛ノ感モ既ニ去レリト  
云ヘリ

診斷 本症ニ固有ノ徵候ハ灼熱疼痛ヲ伴フ潮紅腫張ト其發現ノ發作性ナリトス、之レニ據テ所謂 Erythromelalgie ト診斷セリ

原因 不明ナリ、患者父子姉妹ガ屢々全症ヲ患フルハ或ハ遺傳ノ關係ニ由テ然ルカ、將タ彼等ハ衣食住ヲ其ニスルヲ以テ全一ノ外來有害感應ヲ蒙ムルガ故カ、斷言スベカラズ、然レモ若シ此ノ二者ヲ出デストスレバ、其發病ノ全時ナラザルニ據ツテ、予ハ寧ロ其前者ヲ疑フベシ

療法及經過 安靜ヲ命ジ、試ニ麥角越幾斯一、〇爲丸一日三回分服ヲ處方セリ、患者ハ再ビ登院セザリシ、故ニ後チノ經過ヲ知ラズ

本患者若クハ其父妹ハ屢々該症ヲ患フト云ヘバ必ズ他日來院シテ之レヲ學生諸子ニ紹介スルコトアレシ

予ノ本症ニ遭遇セルハ本例ヲ以テ嚆矢トス、予ハ予ノ及ブベキ限リ「リテラツール」ヲ涉獵セシモ獲ル所極メテ少ナカリシヲ憾ミトス、唯 Eulenburg's Realencyclopaedie Bd. II, pg. 692. Brachialisismus 對側ノ部ニ之ヲ舉ゲ其一般證候ト禾穀類ノ中毒證トシテ現ルト記載シ有ルニ過キズ、今 W. pg. 625ニ Woodnut 氏ガ「酒精毒者ニ於テ實驗セシ手足并ニ背部ニ現ハレタル疼痛性紅斑」ニ Erythromelalgie ナル名稱ヲ附セリ云々 (Journal of nervous and mental disease 1884 pg. 638) ノ數行ニ止マレリ、故ニ予ハ左ニ「アイヒホルスト」氏內科病理各論ヨリ抄出シテ聊カ學生諸子ノ參考ニ供セント欲ス

抑モ四肢脈管運動神經官能<sup>ノイロニ</sup>的障害ハ或ハ其痙攣ニ基キ或ハ其麻痺ニ因ス、隨テ spastische Formト Paralytische F.ノ兩様ニ區別スベキモノトス Weir Mitchell 氏ハ麻痺性ノモノニ希臘語エリニトロ

ス(紅)メロス(肢)アルゴス(痛)ノ三語ヲ探ツテErythromelalgieナル名稱ヲ附與セリ、痙攣性及痙攣性ノ兩症ハ共ニ片肢若クハ數肢ヲ侵シ其襲來ノ發作性ナルヲ特色トス、Eニ於ケル發作ハ、痙攣性ノモノニ全シク、患部ニ於ケル苛烈<sup>クワイベル</sup>灼熱、刺衝ノ感覺又々屢々劇痛ヲ以テ始リ、然ル後皮膚ニ潮紅腫張ヲ起ス患部ハ每常青蒼色ヲ呈セズシテ必ズ鮮紅色ヲ呈シ、之レヲ按スレバ熱ヲ感ジ、氣孔ハ非常ニ著大ニ見ハル、温暖ト患肢ノ直立位地ハ病苦ヲ増惡セシメ又發作ヲ喚起ス、痙攣性痙攣性兩者共ニ好シデ夏期ニ發シ、甲ハ特ニ上肢ニ、乙即チEハ屢々下肢ニ現ハル、經過ハ彼是共ニ數分時乃至數時間ナリ

病源 痙攣性症ハ婦女ニ、痙攣性症ハ二十五乃至四十歳ノ男子ニ最も多シトス、痙攣質斯并ニ神經過敏ハ本症ノ素因トナリ寒胃疲憊ハ之レカ近因タリ得ベキモノナリ、Eヲ精細ニ記述セシハ Duchenne 氏ヲ以テ最先トス氏ハ數多ノ銅工ニ就テ之レヲ實驗セリト云フ(中毒的感應?)

Eニ對スル療法トシテハ局部溫浴、感傳電流、水療法、安靜、水平位置、暖地ニ轉地、等ヲ良トス痙攣性症并ニ痙攣性症ハ共ニ之レヲ末梢性脈管運動神經ノ疾病トスルヲ最も信ニ近シトスベシ

(完)

### ◎虎列刺治療血清ニ就テ(通常會所演)

會員 野田 忠廣 講演

私ノ演題ハ虎列刺治療血清ニ就テト云フ立派ナル題ナレト諸君ニ向テ御話スル處ハ只私ガ三四ヶ月間動物ニ就テ虎列刺ノ免疫法ヲ實驗セシ方法ト成績ノ大要デアリマス

諸君モ知ラル、如ク免疫法ハ此五六年以來開ケタル事柄デアツテ「ベーリンゲ」及ビ北里氏ガ實扶