

ガ手元ニ無イ故ニ據ナク温熱的除菌法ヲ用ヒタノデアリマス、
(未完)

◎輪癬及ビ頑癬ノ療法ニ就テ

會員 岡部 忠述

輪癬 *Herpes tonsurans* ハ俗ニ「センダムシ」ト稱ス此皮膚病ハ *Trophophyton tonsurans* ナル黴菌其原因ニシテ *Gruby & Malinien* 氏ノ發見ニ係ル是レ頭部或ハ他ノ毛髮ナキ身体諸所ニ生ズ其形狀ハ甚々種々ニシテ或ハ鱗屑狀ヲナシ或ハ水泡狀ヲ呈シ或ハ班點狀ヲナス

頭部ニ發生スルモノハ一ニ又禿髮癩疹或ハ截髮癩疹ト稱ス *H. t. capill.* 是レ其毛髮ノ截碎シテ圓形ノ禿髮部ヲ生ジ又診斷ノ際容易ク毛髮ノ斷裂スル症ナリ而シテ其圓廓ノ部ハ少シク腫脹シアリテ稍光澤ヲ帶ビ且ツ汚黃色ノ鱗屑ヲ以テ被ハル時トシテ其圓板ノ周圍ハ微ニ赤色ヲ呈シ甚々稀レニハ水泡ヲ認ム此圓板ハ或ハ小ニ或ハ大ニ或ハ一箇或ハ數箇生シテ漸次蔓延ス而シテ數週數月ヲ經過スレバ一定ノ大サニ達シ而シテ遂ニハ治シ或ハ尙進ミテ全頭禿髮ニ成ル事アリ而シテ全頭ハ白色或ハ汚黃色ノ乾燥セル鱗屑ヲ以テ被包セラル其症恰モ鱗屑性濕疹或ハ頭部糠粃疹、或ハ圓形禿髮ニ彷彿タリ其自覺的症狀ハ只タ癢痒アルノミニシテ他ニ困難ヲ訴エズ此輪癬ノ爲メニ一時ハ其部毛髮脱落セルト雖モ時ヲ經レバ再ビ發生スルニ至ルモノナリ
他ノ身体諸部ニテハ軀幹、四肢、顔面及ビ頸部等ニ發生シ或ハ著シキ水泡狀トシテ顯ハレ或ハ赤色ノ鱗屑狀班點ヲ呈シ圓板及ビ輪狀ヲ形成ス

水泡狀輪癬 *H. t. vesiculosus*. ハ多クハ顔面、手背部、頸部及ヒ軀幹ニ生ズ是レ小ナル水泡ノ多ク集

合シテ以テ輪狀ヲ形成スルナリ此輪癬ニテハ中央部ハ褪色シ或ハ鱗屑狀トナリテ陷凹シ周圍ニハ新水疱ヲ生シテ漸次蔓延ス是レ灼熱ノ感及ヒ○痒アリ單發或ハ多發ス

班狀及ヒ鱗屑狀輪癬 *H. t. maculosus et squamosus* ハ始メハ小ナル赤色ノ輪狀ヲナシ冒針頭大ナリ而シテ指壓ニ據リテ褪色ス然シテ一ニ二日ヲ經過スレバ大ニ成リ尙日ヲ經ルニ從テ益擴張ス其中央ハ鱗屑ヲナシ或ハ又褪色シテ周圍ハ赤色輪狀ヲ呈ス此疹ハ背部、胸部、腹部、頭部、上肢及ヒ下肢ノ内面ニ生ス

治療法ハ表皮ト共ニ黴菌ヲ落シ或ハ黴菌ヲ殺スノ藥物ヲ用ユ其療法甚タ種々アレトモ從來最モ賞用セラル、ハ其局部ニ向テ $\frac{1}{2}$ 昇汞水ヲ塗布シ或ハ $\frac{1}{2}$ ナフトウル軟骨又ハ加里石鹼ヲ貼シ或ハ石炭酸ヲレフ油ヲ貼シ或ハ水揚酸及ヒ「チモール」溶液ヲ用ヒ或ハウイキンソン氏軟骨ノ貼用等ヲ主トス然レモ予ハ何レノ形狀ニ係ハラズ何レノ局部ニモ關セズ其限局ニシテ侵ス所ノ面大ナラザル場合ニハ常ニ沃度 $\frac{1}{2}$ 丁 $\frac{1}{2}$ ヲ用ユ其稠度ハ十 $\frac{1}{2}$ ノモノニテ足レリ輕度ノモノニハ只一回或ハ二回ヲ塗布シ以テ功ヲ奏ス但シ顔面ノ如キハ沃丁ノ色素ノ爲メニ少シク嫌惡スルモノナキニシモ非ザレモ敢テ意トスルニ足ラズ若シ或ハ不得止場合ニハ無色沃丁ヲ用ユルモ可ナラン是レ其處置ノ甚タ單簡ニシテ且ツ効驗ノ顯著ナル事ハ從來多數患者ニ施シテ知了セシヲ以テ此ニ諸君ノ參考ニ供セントス此沃丁療法ノ如キハ *Kaposi*, *Neumann* & *Rubend.* 氏等ノ皮膚病學書中ニ記載シアリト雖モ甚タ重キヲ措カズ *Loefer* 氏ノ如キハ一言ノ沃丁ニ及ボス事ナシ故ニ特ニ此ニ記載セル所以ナリ
頑癬 *Eczema marginatum* ハ又有緣濕疹或ハ寄生性濕疹又ハ俗ニ「インキンタムシ」ト稱ス其發生ノ

部ハ主ニ陰部及ヒ其周圍ニシテ殊ニ陰囊ト大腿ノ接着スル處及ヒ肛門ヨリ臀部ニ蔓延シ鼠蹊部ヨリ陰阜ニ擴ガリ遂ニ他側ノ大腿ニ移行ス其他尙軀幹、項部、及ヒ四肢等ニ單發或ハ多發ス

頑癬ハ始メ輪癬ト全シ形ニ來ル則チ小ナル圓廓ヲナシ小ナルハ五厘銅貨大ニシテ大ナルハ手掌大ニ達ス此圓廓ノ緣ハ稍不正ニシテ鋸齒狀ヲナシ小結節、小水泡或ハ黃褐色ノ鱗屑ヲ以テ包ミ其中心部モ暗褐色ニシテ鱗屑狀ヲ呈シ其部落屑シテ褪色スレモ尙浸潤ヲ殘ス此濕疹ニテハ癢痒甚シキヲ以テ常ニ搔爬シ爲ニ裂創ヲ生シ痂ヲ以テ被包スルニ至ル此鱗屑中ニ輪癬ニ似タル微菌アル事ハ既ニ Koehler & Pick 氏ノ証明スル處ナレモ全ク輪癬ノモノト全一ナルヤ否ヤハ不明ナリ然レモ其症狀ニ於テ輪癬ト區別アル點ハ(一)頑癬ニテハ甚シキ癢痒アリ(二)頑固持久性ニシテ十五年乃至二十年尙以上ニ達シ(三)療法甚タ困難ニシテ好ンテ再發スル性アリ(四)傳染力遲徐ニシテ假令夫婦間ニテモ直接ニ傳染スル事稀ナリ(五)其局所ノ毛髮ノ如キモ決シテ截碎スル事ナク又毛髮ノ光澤ヲ失スル等ノ事ナシ此等ノ點ニ付キ Koehler 氏ハ頑癬ハ輪癬ト濕疹トノ混交セルモノナリト云エリ或ハ然ラン

治療法ハ徒來用ヒ來リシモノ甚タ多ク「クリサロビン軟膏、ウイルクソン氏軟膏、一%ナフトール亞爾箇保兒、五%ナフトール軟膏、ナフトール硫黃石鹼、一%昇汞亞爾箇保兒、麥兒劑、沃度丁幾、加里石鹼、或ハ加里石鹼精、石炭酸溶液等トス予ハ數年多數ノ患者ニ向テ水揚酸ヲ用ヒ大ニ奏効ノ著明ナルヲ實驗セリ其用法ハ二%乃至三%ノ水揚酸亞爾箇保兒ヲ朝夕二回患部ニ塗布セシムルニシテ若シ其面廣ク殊ニ陰囊等へ蔓延セシ際ニハ三%乃至五%ノ水揚酸殿粉ヲ用ヒ來レリ此法ハ甚

タ單簡ニシテ輕症ノモノハ僅ニ一二回ニテ足り重症ト雖モ一週間持續スレバ殆ト其痕跡ヲ留メザルニ至ル然レモ二三ノ皮膚病學中此水揚酸ヲ使用セシ例ヲ見ズ故ニ特ニ此ニ記述シテ以テ參考ニ供セントス

此等ノ療法ニ付テハ四年生諸君中ニハ實際ニ目撃セラレタル事アルヲ信ズ

參考書

Kaposi, Pathologie & Therapie der Hautkrankheiten. (1893)

Behrend, Lehrbuch der Hautkrankheiten. (1883)

Lesser, Lehrbuch der Hautkrankheiten fuer Studierende & Arzte. (1888)

Neumann, Lehrbuch der Hautkrankheiten. (1880)

◎痙攣性脊髓麻痺ノ一實驗

河 合 生

昨年十月本校内科クリニクニ於テ該患者ニ就キ些カ取調ヘタル丈ノ事別ニ實驗トカ申ス生意氣然タルモノナラズ旁々大方諸君ノ示效ヲ仰ガント欲シテ茲ニ其儘

患者 橋本彌三吉 三十一歳 (米春職)

〔稟賦〕 患者生レテ數日他ノ養子トナリ、現ニ血族遺傳ノ關係等全ク不明ナリ、三歳ノ頃ニ於テ時々(時トノ三日間)痼疾ヲ發作セシヲ以テ病体ナルヲ知レリ、齒牙發生ハ尋常、種痘ハ二回行ヘリ、麻疹ハ七八歳頃經過ス、十歳ニシテ始テ不明瞭ナル談話ヲナセリ、然レモ智力ハ尋常人ト