

タ單簡ニシテ輕症ノモノハ僅ニ一二回ニテ足り重症ト雖モ一週間持續スレバ殆ト其痕跡ヲ留メザルニ至ル然レモ二三ノ皮膚病學中此水揚酸ヲ使用セシ例ヲ見ズ故ニ特ニ此ニ記述シテ以テ參考ニ供セントス

此等ノ療法ニ付テハ四年生諸君中ニハ實際ニ目撃セラレタル事アルヲ信ズ

參考書

Kaposi, Pathologie & Therapie der Hautkrankheiten. (1893)

Behrend, Lehrbuch der Hautkrankheiten. (1883)

Lesser, Lehrbuch der Hautkrankheiten fuer Studierende & Arzte. (1888)

Neumann, Lehrbuch der Hautkrankheiten. (1880)

◎痙攣性脊髓麻痺ノ一實驗

河 合 生

昨年十月本校内科クリニクニ於テ該患者ニ就キ些カ取調ヘタル丈ノ事別ニ實驗トカ申ス生意氣然タルモノナラズ旁々大方諸君ノ示效ヲ仰ガント欲シテ茲ニ其儘

患者 橋本彌三吉 三十一歳 (米春職)

〔稟賦〕 患者生レテ數日他ノ養子トナリ、現ニ血族遺傳ノ關係等全ク不明ナリ、三歳ノ頃ニ於テ時々(時トノ三日間)痼疾ヲ發作セシヲ以テ病体ナルヲ知レリ、齒牙發生ハ尋常、種痘ハ二回行ヘリ、麻疹ハ七八歳頃經過ス、十歳ニシテ始テ不明瞭ナル談話ヲナセリ、然レモ智力ハ尋常人ト

甚シキ差異ヲ見ザリキ、爾後上記疾病ノ徵ナキモ、身体ノ運動ハ緩慢ニシテ容易ニ顛倒ス、言語障害、顔面筋不隨意収縮ハ、依然トシ今日ニ至ル、而レモ平時甚強壯曾テ重病ニ罹ラス、(梅毒ヲ患ヒズ、又外傷ヲ受ケシ覺ナシ)、緩慢乍ラ孳々勞働ニ従事シ、専ラ患肢ヲ米舂ニ使用セリ、酒ハ平時半合斗リ用ヒ發病僅前ニ五合許リ用ヒシヨアリシト云フ

〔發病〕 昨年(即二十八)年七月頃、前驅症ト認ムベキモノナク、左下肢ニ於テ偶然疼痛ヲ發シ、時々發作性ニ同大腿内轉及屈筋攣縮シ、下肢ハ伸展スルコトヲ得ズ、十月頃ヨリ全ク歩行シ能ハザルニ至レリ、而レモ他側肢軀幹ニ於テハ一ノ變狀ダニナク、糞尿ノ排泄、及食思モ亦尋常、精神記憶力更ニ害セラレシコトナシ、先月頃(?)左眼ハ突然視力減衰シ、一m.<sup>t</sup>以外ノ物体ヲ明視スルコト能ハズ、近時ニ至リ、第五腰椎ノ高サニ一致シ帶狀鈍痛感アリト云フ、

〔現症〕 患者一男子、体格中等、營養稍不良、容貌痴鈍加フルニ苦惱ノ狀アリ、一汎外表皮膚ニ於テ、擽創若クハヘルベス等ノ發疹物ヲ目撃セズ

頭部顔面、頭部形狀ニ於テ異常ナシ、又癩痕及壓痛點ヲ見ズ、左顔面(殊ニ頰部)時々不隨意ニ少攣縮ス、嘯鳴ヲ行フ能ハズ、感覺範圍ハ兩頰ニ於テ大差ナシ、眼ハ稍大ナレモ震顛ヲ見ズ、左眼瞳孔ハ著シク散大シ(眼科ニ於テ后葡萄ノ診定ヲ下シ古加因點眼ヲ命ゼシ爲カ)左眼ハ視力一、五m.<sup>t</sup>ニ於テ漸ク指數ヲ辨ズ、右眼ニ異常ナシ、舌ハ右側運動ニ障害アリ、而モ咀嚼其他ノ機能ニ障害ナシト、但シ患者ニ對シ諸種ノ質問ヲ試ムルニ、一ノ完全ナル談話ヲ連續スルコト能ハズ、著シク澁難ノ狀ヲ呈スルノ後僅カニ口尖ヨリ、應否其他ノ單話ヲ與フルニ過ギズ、蓋シ質

問語ノ聽取及理解ニ於テ變化ナキカ如シ

胸腹部、前側ニ於テハ特ニ記スヘキナシ、背側ニ於テハ脊柱ハ一汎ニ右側彎シ、第十二胸椎ノ邊ニ於テ稍前彎ヲ兼ヌ、右肩胛ハ高ク隆起シ、同側胸部ハ右側ニ膨出シ、左肩胛ハ下降ス、而レモ脊椎全經過中壓痛又ハ自發痛ナシ、只第四胸椎ノ高サニ一致シ、腹部ニ巨ル帶狀感アリ、爾他ノ理學的症候ハ完ク通常ナリ、

四肢、左右ノ上肢ニ、麻痺、痙攣、筋肉瘦削等ヲ見ズ握力左右大差ナシ

左下肢ハ右ニ比シ稍羸瘦シ(殆<sup>m</sup>ニ差<sup>c</sup>ニ髀臼關節全ク伸展セズ、大腿ノ内面及屈側ニ於テハ著シク筋ノ緊張セルヲ認メ、加之轉臥壓迫等ノ小刺激ニ遭ヒ、時々疼痛ヲ以テ痙攣性ノ収縮ヲ認メ患者ハ苦惱ノ貌ヲ呈ス、縫匠筋附着部ノ稍内側ヲ壓スルニ過敏ナリ、併シ皮膚ニハ知覺等ニ變狀ヲ見ザリキ、同下腿ハ鈍角ヲ以テ屈曲シ尙羸瘦ス、膝蓋腱反射ハ著シク亢進シ、アヒルス腱反射亦亢盛ス、電氣反應ハ檢査ヲ欠ケリ、右下肢ハ稍反射亢進ノ他見ルベキナシ、即チ歩行ヲ營マシムルニ、杖ニ倚リ左足尖ヲ地ニ附シ該肢ヲ屈曲シ乍ラ辛フシテ、二三歩進ミ能フノミ、又格魯兒仿謨麻酔ニヨリ種々ノ檢査ヲ行ヒシニ、全ク股關節炎ヲ有セザルモ知ラレタリ、坐骨神經々過ニ壓痛ナク、排便排尿等ニ異常ヲ見ズ

[診斷] Paralysis Spinalis Spastica.

現今、患者ガ重ニ訴フル症候ヲ捉ヘ來レバ、實ニ本病ニ定型的ノ徵ヲ示セルヲ知ル、即チ年齡ト云ヒ、又一側肢ノ筋ノ麻痺、強直性痙攣、腱反射亢進、痙攣狀ノ步行實ニ特異ノモノナリ、加

之知覺機 膀胱直腸ノ官能障害ヲ蒙ザルト、腦神經ノ麻痺ヲ認メザルト、突然見ハレ來リシト  
ニヨリ益々診斷ヲ確タメシメタリ、彼ノ幼少ヨリ痲疾トナリシ輕易ノ Amblyopia 及顔面筋不隨意  
ノ収縮ハ、現今ノ症ニ完ク關聯セザルモノナルベシ、蓋シ其本源ハ如何ナル疾病ナリシヤハ、  
不明ノ既往症ニヨリ推察シ得ル能ハズ、或ハ小兒腦膜炎ニテモ罹リシモノナルカ、強テ追究ス  
ルノ必要ナケン、

鑑別診斷ニ於テハ、一々擧グベキ程ノ事ナク、却テ冗多ニ過グルヲ憂ヒ茲ニ畧ス

附加、本患者、現症中訴フル左眼ノ視力障害ニ就テハ、果シテ神經的疾患ニ懸聯スルヤ否ヤ  
疑ナキ能ハズ、但シ眼科醫ノ稱スルガ如キ後葡萄腫ノ如キニ於テハ、其原因神經的疾患ニ  
重キヲ措カズ、專ラ眼球后部ノ發育障害又ハ血行障害ニ歸セリ

〔原因〕 現今訴フル症ハ、之ヲ症候的疾病ト見做ス能ハズ、蓋シ他ニ其本病存在ヲ証スベキ徵候ナ  
ケレバナリ、故ニ或ハ特發性ノ者ナルカ、殊ニ治療ノ奏功アルガ如キハ益然リ、然レモ間接ニ  
患者幼少ノ際、發起セル神經的疾患ハ永續的ニ神經病ノ素因ヲ殘シ、其抵抗力ノ減弱、發炎ノ  
容易、變性ニ陥イリ易キ性ヲ感受シ、之ニ加フルニ、本病ヲ發起スベキ年齡ニ於テ、糊口ノ途ニ  
余儀ナクサレ、痿弱ナル下肢ニモ不係過劇ナル勞働ニ從事シ、過勞ヲ誘因ヨリ、本病ニ侵害サ  
ル、不幸ヲ見ルニ至レルカ、殊ニ發病僅カ前ニ常ヲ超ヘタル酒飲ヲ取リシカ如キハ、亦本病ノ  
原因トシテ價值アリシナルベシ

〔療法〕 本患者ニ、瓦爾華尼ノ脊髓及筋流通ヲ用ヒタリ、卽隔日ニ五分間許リ永續的ニ試ミシガ、

