

◎謀殺未遂犯鑑定實例

會員 澤田 定信

今此鑑定書ヲ記スルニ先ツテ其實ノ概略ヲ述ヘンニ富山市ノ近里ニ母及妻子ヲ有スル農夫某アリ妻ノ病死後某樓ノ馴妓某ヲ落籍シテ后妻トス此婦人ハ夫ニ貞ニ舅ニ孝ニ又タ繼子ヲ愛シ近隣ノ賞メ者ナリ然ルニ婦人ノ母ハ惡婦ニシテ某ニ無心難題ヲ掛ケ金品ヲ貪ルコト甚ダシ加之某ノ後妻ヲ計略ニテ金澤ニ引寄セテ隱匿ス某辛フシテ探リ得タルモ非常ニ逆待シ追拂ハントセリ某非道薄情ヲ憤リ生キテ故郷ニ皈ランコト世人ニ面目ナク寧ロ鬼ト成テ仇ヲ報セン者ト懷中セシ莫非ヲ頓服シ隱シ持タル刺身庖刀ニテ妻ヲ刺殺セントスルモ唯タ面部ニ刺傷セシノミニシテ他人ノ支フル所ト成ル今度ハ又懷中ヨリ「ナイフ」ヲ出シ自ラ喉頭ヲ刺スモ自殺未遂ト成ル此騒キニテ司法問題トナリ之カ鑑定ヲ要スルニ至ル

鑑定書

富山縣上新川郡○○村字○○○何○番地

○○○○

三十八年

明治廿八年三月八日右○○○謀殺未遂被告事件ニ付キ○○○地方裁判所豫審判事○○○○余等ニ左七項ニ據リ鑑定ヲ命ス依テ鑑定スルコト左ノ如シ

既往症

本人及叔父林宗右工門ノ陳述ニ由レバ○○○ハ幼時強壯ナラスト雖大患ニ罹ラス唯タ煤煙ヲ嗜食

●原著及實驗

スル他ニ惡戯殘害ヲ爲カス幼時ノ教育上ニ變常ナク品行方正常ニ同級ノ上席ヲ占メ教育程度ハ低シト雖新雜聞誌ヲ讀ミ通用文ヲ綴リ算術ハ四則ヲ解ス」八才ノキ五六尺ノ高所ヨリ落下シ頭部ヲ外傷シ一時氣絶ス遂ニ化膿シ今ニ其癩痕禿頭ヲ殘留ス」十三才頃ヨリ精神感動シ易ク或日憤怒ノ爲メ卒倒シ四肢搖擗シ人事ヲ辨セサル」二時間計ニシテ四肢麻痺ヲ貽后ス此麻痺ハ四五日ニシテ治ス」廿才頃ヨリ春情發動シ二十一才ニ妻ヲ娶リ十四年間親密ニ配偶シ三子ヲ舉ケテ妻ハ死セリ仍テ賣婦ヲ迎ヘ後妻トス之レ今度ノ騷動ノ根本ナリ」壯年ニ至リ一層短氣ト成ルト雖モ朋友ト爭論セス併シ精神感動ノ爲メ俗ニ所謂癩氣ノ發作ヲ呈ス則チ先ツ胸部心窩ニ苦悶ヲ呈シ呼吸困難ヲ來タシ自ラ繩ヲ以テ腰部ヲ絞擗シ固體ヲ以テ胃部ヲ壓迫シ他人ニ背部ヲ強壓セシム時トスレハ三四人ノ壓迫モ尙ホ足ラサル」アリ發作中ハ四肢痙攣シ牙關緊急ヲ呈スレモ舌ヲ咬マス又口ヨリ泡出セス發作間ハ人事不省ニシテ三十分乃至一時間ニシテ止ム一ケ年三四回發作ス」酒ハ嗜マス梅毒ニ罹ラズ又タ腦病ヲ病マズ

血屬遺傳トシテハ母方ノ祖父ハ伶俐ニシテ算術ヲ好ミ地割役ヲ務メタレモ五十才ニシテ發狂シ亂暴ヲ極メ五ケ年ニシテ老衰シテ死ス」血統中痴呆及大酒家ナシ」二人ノ姉妹ハ「ヒステリ」性ナリ」○○ハ敢テ莫非ニ常習セズ

現在症候

明治廿八年三月二日午後四時半頃○○ナル者金澤病院ニ來タリ治療ヲ請フ當時ノ症候左ノ如シ
顔貌蒼白、無力性、脫力、嗜眠ノ狀ヲ呈シ脈搏細弱ニシテ一分時百四十至呼吸ハ淺表ニシテ十六チ

算ス瞳孔ハ帽針頭大ニ縮小シ光線ノ反應全ク欠亡シ視野朦朧トシテ物体ヲ充分ニ調節判明セズ頭痛、眩暈、嘔心アリ四肢ノ運動不如意ヲ呈シ便秘シ一時尿閉ス漸次全身ニ癢痒ヲ感ス右ノ症候ハ時ヲ經ルニ從ヒ漸々輕快セリ

〔自刃創傷〕前頸部ニ於テ甲狀及環狀軟骨ノ間ニ左胸鎖乳頭筋部ヨリ右同筋部ニ向フテ殆ソト地平ニ走レル長サ十cm幅二、五cmノ哆開創アリ周圍ニ血液附着シ創縁ハ銳利、創面ハ凝血ヲ以テ被ハル而ノ深サハ皮膚ノ全層、左右潤頸筋ノ一部、左胸骨舌骨部ノ一部等ノ切斷セラル、ヲ見ル

經過

入院后尿閉シ自ラ排尿スルコト能ハサルヲ以テ「カテ、ル」ニテ排尿スルコト前後二回ニシテ以后自ラ放尿ス日ヲ加フルニ從ヒ現症ノ條下ニ記述スル諸症ハ輕快セリ入院后第一、第二、第三回ノ尿ヲ取り化學的試験ニ由テ莫非ヲ証明セリ

第一 〇〇〇ヲ診察シタルキ〇〇ハ莫非ヲ服用シタル兆候アリシヤ、否、

右現症ノ汎發症候ハ莫非服用ニ由テ起ル急性中毒症候ト一致ス就中尿中莫非ヲ証明スルニ於テハ〇〇〇ノ莫非ヲ服用セシコト明ナリ

第二 若シ莫非ヲ服用シタリトセバ何程ノ量ヲ服シタル兆候アリヤ

此莫非服用量ヲ症候上ヨリ鑑定スルコト甚タ困難ナリ通常莫非中毒死量ノ最低量ハ平均中年ノ人ニ於テ〇、二—〇、四「グラム」トス然レモ莫非ハ年齢、体格、營養、腸胃内容ノ虛實、嘔吐ノ有無、莫非常習等ニ由テ甚タシキ差等ヲ有スル者ナリ故ニ右ノ症候ニ由テ其量ヲ定ムルコト能ハズ又タ

尿中ヨリモ算出スルコト能ハズ何トナレバ服用後已ニ一二回ノ嘔吐アリ其他諸分泌物、排泄物ヨリ幾分ヲ失ヒ又タ出血シタル血液中心モ其幾分ヲ含有スレバナリ」本人〇〇〇ノ陳述ニハ一壘全量ノ四分一殘留セシ者ノ半分ヲ頓服セリトイフ然ラハ一壘全量ヲ三、六五四「グラム」トスレバ〇〇〇ノ服用セシハ〇、四五六七五「グラム」ナル可シ是レ己ニ中毒死量ナリ然レモ嘔吐ノ際ニ何程吐出セシヤ知ル可ラズ又タ証人〇〇〇〇ノ陳述ニ由レハ〇〇〇ハ僅カニ指頭ニ附シテ舐メタリトイフ

以上約言スレハ其服用量及身體ニ攝取セシ量ハ鑑定スルコト能ハスト雖中毒死量以下ナル可シ

第三 莫比若干ヲ服用シタル者トセバ精神ノ錯亂ヲ來スヤ、否、

莫比ノ急性中毒症候タルヤ其量ニ由テ多少精神ノ亢奮スル者アレモ精神錯亂シテ亂暴セシコト大抵是アチズ其多量ヲ服スレハ却テ睡眠ノ状態ニ陥リ亂暴等ヲ爲ス能ハサル者ナリ之ニ反シ慢性莫比中毒ニハ精神病ヲ呈スルコト間々之アリ然レモ〇〇〇ハ莫比ニ常習セズ且ツ上記ノ症候ニ由テ急性中毒症候ナルコトヲ知ル

以上約言スレハ莫比急性中毒ニ由テ精神錯亂ヲ呈セサル者トス仍テ〇〇〇ノ亂暴ハ精神錯亂ト認メ難シ

第四 〇〇〇ハ本年三月二日午前十一時頃ヨリ十二時頃迄ノ間ニ莫比若干ヲ服用シタリトイフ就テハ同人ヲ初メテ診察シタルモ莫比服用ノ爲メ一時精神錯亂シタル者ト推知シ得可キ兆候アリタリヤ、否、

第一項ノ説明ニ依テ莫比服用ノ爲メ其中毒症候ヲ呈シタルヲ確定スレモ第三項ニ説明スルカ如ク精神錯亂ヲ呈セス又タ診察上精神錯亂ト推知シ得可キ症候ナシ

第五 此印貼附シタル爆ハ莫比劑ノ容器ナルヤ

瓶体ハ數個ニ破裂スレトモ精密ニ之ヲ檢スルキハ莫比容器ノ大ニシテ其「レツテル」封紙ノ一片ニハ鹽酸莫兒比涅ナルヲ記載セリ

第六 若シ莫比劑ノ容器ナリトセバ該劑ノ量ハ何程ナリヤ

此貼附シタル「レツテル」ニ鹽酸莫比一匁八分ノ一ト記セリ是ハ一「ダラクマ」ニシテ英國量目ナリ「グラム」ニ轉算セバ三、六五四ニシテ日本量一匁四厘ナリ依テ該爆子ハ莫比一匁四厘容ル可キ者トス

第七 前項莫比若干ノ内四分ノ一ヲ服用シタリトセバ精神ノ錯亂ヲ來タス者ナルヤ、否、

第二項ニ説明スルカ如ク莫比中毒死量ハ種々ノ場合ニ由テ異ナリト雖平均中毒死量ノ最低量ヲ〇、二一〇、四トス然ルヲ今莫比一爆ノ四分ノ一ヲ頓服シタリトスレバ〇、九一三五「グラム」ニシテ已ニ死量ヲ越ユルヲ遙カニ大ナリ而シテ〇〇〇ハ莫比ニ常習セルヲ以テ正ニ死セサル可ラズ若シ或特異性アリトスルモ運動系ハ麻痺スルカ或ハ減退シテ嗜眠昏睡ノ状態ニ陥ラザル可カラズ何ツ精神充奮シテ殺人的ノ暴行ヲ營ミ且ツ自殺的所行ヲ爲スヲ得ンヤ

斷案

右記載ノ諸項ニ就テ考案ヲ下スルハ〇〇〇ノ莫兒比涅服用ハ事實ナリ(第一項)然レモ其量ニ至リ

テハ鑑定ヲ下シ難シ(第二項)○○ノ殺人的行爲ハ莫比服用ニ由テ來タル症候の所行ニアラズ何トナレハ慢性莫比中毒ニハ種々ノ精神障害ヲ呈スルコトアレハ急性中毒症ニアリテハ甚クシク大量ナラサルキニ僅カニ精神亢奮スルコトアレハ精神錯亂ニ至ラズ大量ナレハ却テ直チニ麻睡ノ状態ニ陥リ暴行ヲ爲シ能ハサル者ナリ

右之通鑑定候也

明治二十八年 月 日

鑑定 人

石川縣金澤病院醫員

澤田 定信 印

同

敷波重次郎 印

◎實扶的里亞血清療法小實驗

會員 岡田 剛吉

今世醫學界ノ一大進歩トシテ我日本國ハ勿論歐米諸國ニ於テモ等シク賞揚喧傳シ醫事ニ關スル雜誌ニシテ每號記載セサルナキハ實扶的里亞血清療法ニ關スル諸件ナリトス予カ茲ニ載スル所ノ如キハ實ニ九牛ノ一毛ノミ殊ニ事學術的ニ關セス專ラ實地的ナルノミ然レハ卑近ナル小實驗談又時トシテ無益ナラサルコトナキニ非ス依テ本誌ノ一隅ヲ汚ストセリ果又此小實驗ハ金澤病院小兒科ニ於テ醫學士小川勝陳君ノ示導ノ下ニ加藤慶三、中村顯、岡本京太郎等ノ諸君ト共ニ