

●原著及實驗

者アリ之レ

磷酸石灰

(丙)生結石粉末ニ鹽酸ヲ滴加スルモ泡沫

ヲ生セス又タ己ニ燒タル粉末ニ於テ

モ均シク鹽酸ニ逢テ泡沫ヲ發セスシ

テ悉ク之ニ溶解シ其滲液ニ一定量ノ

安母尼亞水ヲ加フル時ハ多量ノ白色

沈澱ヲ生シ顯微鏡下ニ固有ノ結晶ヲ

現出セハ

トリベルフオスファト、

之ニ反シ鏡下ニ無形ノ顆粒ヲ認ムル

時ハ

磷酸石灰ナリ

(上記ノ法ニ據テ得タル成績ハ第二表ニ掲ク)

表中

第二表11号結石ハ其形狀甚タ奇異ニシテ宛然鴛鴦ノ交ルニ似タリ之ヲ破碎スルニ忍ヒスノ
遂ニ定性ヲナス能ハサルカ故ニ表中之ヲ欠ケリ

◎三省錄

會員 岡本京太郎述

(一)膀胱充溢ヲ卵巢嚢腫ト誤診セシ一例

兼令キク 齡二十三年三月 (婦人科ボリクリニツク)

右ハ明治二十九年九月二十九日本院内科部ヨリ送致セル者ニシテ密尿病ヲ惱ミ下腹部ニ大ナル腫瘍アルヲ以テ婦人科的診斷ノ必要アリト云フニアリ

患者ノ訴フル所ニ由レハ四五年前ヨリ下腹一沉ニ膨大シ或ハ硬ク或ハ軟ニシテ敢テ増大セサルカ如シ三年前ヨリ經閉シ本年五月ヨリ尿失禁(之レ壓迫性ノモノト速斷ノ訝ラサリキ 嗚呼 Ischuria paradoxa ナリシ!)スルモノ一回ノ隨意的排尿ハ多量ナリト十四才ノ夏月經初潮爾來少量ナルモ正ニシテ六乃至七日持長シ十九才ニシテ嫁ス

之ヲ診スルニ臍上二指橫經ニ達スル彈力性腫瘍アリ面平滑卵圓形ニシテ波動アリ腹中央ニ位ス硬ク緊張シ左右ニ移動シ易ク上下ニモ移動スルカ如シ(觸診不熟ノ罪)外陰部一汎ニ發育不全臆狹小ニシテ加答兒アリ(密尿病性)子宮ハ后上方ニ牽上セラレ僅ニ腔前壁壓出セラレ腫瘍ト癒着セル者ノ如シ「プラワツツ」氏注射器ヲ以テ試験的「プンクチオン」チナスニ帶黃透明稀薄液ヲ出セリ(化學的微顯鏡的檢査ヲナサ、リシハ今尙赧顔ノ至リ又「カテーテリスムス」チナサ、リシハ排尿直後ト自訴セシニ甘セシ不注意)余ハ輕粗ニモ單房性卵巢囊腫ト診斷セリ

十月二十三日小川恩師ノ診ヲ乞ヒシニ他ノ關係ノ爲メ精査セラレス從テ前斷定ニ否議モ容レサリキ其際腫瘍基底臍下二指經最大圍六十九仙迷(余尙疑ハス陰カニ腫瘍高低ノ差ヲ以テ膀胱直腸ノ關係ニ由ル者ト思ヘリ)然ルニ十月三十日同恩師「クリニツク」ノ際腫瘍底臍部ニ存セリ恩師大ニ怪ミ「カテーテリスムス」ヲナセシニ尿無量二千瓦ヲ出シ意外彼ノ腫瘍忽焉トシテ消失セリ

尿ハ透明水様帶黃色(前注射器内ノ者ト同シ)ニシテ酸性反應ヲ呈シ比重一〇一〇糖分非常ニ多量
 恩師常ニ戒ム「カテーテリスムス」ハ Vorbereitungノ主ト成書皆教ユ膀胱充滿ハ卵巢囊腫ト誤
 診スト

余茲ニ敢テ此過夫ヲ記シ以テ他日ノ戒トナス

抄 録

○實扶的里血清ノ中毒實例

衛生顧問 Dr. Kneemann 氏ハ「ベーりんぐ」血清ノ
 中毒症狀ヲ發セル場合ヲ自ラ實驗セシコトヲ報
 告セリ。其要ヲ摘記スルニ、氏ハ田舎旅行ノ際一
 患者ニ豫防注射ノ目的ヲ以テ、同血清ノ 1/20 ヲ
 注射シ、更ニ該瓶殘余ノ六分ヲ取り、自己ノ左前
 膊背側ノ中央部ヲ撰デ之レヲ注射セシニ、通常、
 血清注射後ニ見ル可キ小膨隆ニ代フルニ、少ク
 トモ長一〇、仙迷巾五仙迷ニ亘ル廣大ナル腫瘍
 ヲ發生セリ。三十分ヲ經テ頭皮ニ強烈ノ癢痒ヲ
 發シ背部ニ波及シ、茲ニ痒痛ノ感ヲ覺ヘタリ。更
 ニ半時ヲ經テ其家ニ歸ヘリシニ煩悶、眩暈、耳内
 騷鳴、眩暈、強度ノ衰弱ヲ感シ辛フシテ其寢臺ニ
 上ルヲ得シ程ナリキ、此際体温ヲ計測スルニ、三
 十九度ニ昇リ、前膊ノ腫起猶存シ、手指ヲ開伸シ
 得ザル特異ノ麻痺狀態ヲ呈セリ。一二時間ノ後
 強度ノ煩渴ト共ニ、足ヲ除キタル他ノ全身ニ劇
 甚ナル癢痒及痒痛ヲ感スルト同時ニ、密ニ水胞
 性發疹ヲ簇生シ、皮膚乾燥、脈膊不感、抑壓感覺、
 下腹充滿苦悶ノ感ヲ覺エ、其日ノ晝餐ニ食セシ
 食物ノ未ダ消化セザルモノヲ吐出シ且ツ通常ノ
 粥狀糞少許ヲ排出セリ。斯クテ數時間ニシテ強