

(第八圖ノ患者) 金澤市○○町 ○部○○ 女 一年四月 廿九年十月入院

患者生來強壯種痘ヲ過キ生後九ヶ月ニシテ始メテ乳齒發生シ言語步行等ニハ敢テ他兒ニ遅クル、トナク、胎生中母体ニ疾病ナク産后、分娩時ニモ異常ナカリシト云フ、患兒ハ生レ乍ラニシテ兩指趾ニ畸形ヲ有シ絞縊溝ヲ備フルアリ己ニ指趾尖端ノ脱落セルカ如キ觀ヲ呈シテ短縮シ尖端爪甲ヲ欠ク者アリ左手環小兩指間中央部ニ於テハ橋狀組織ニ由テ互ニ繋カル、處アリ、長スルニ從ヒ溝渥漸ク深サヲ増シ溝ノ末梢ニ位スル指尖端ハ初メヨリ球形ヲナスト雖其大サ漸ク加ハルト云フ、身体他部ニハ畸形ナク父ハ癌腫母ハ子宮病ニ罹リ生存シ同胞四人アリ畸形ナク遺傳ノ關係ナシ、現症ノ詳細ハ圖書ヲ掲ケタルカ故ニ省略セリ

◎眼球結膜ニ於ケル色素性肉腫ノ一實驗

會員 高安右人

色素性肉腫ハ視器中脈絡膜ニ發スルヲ比較的最モ多ク、次テ虹彩毛様体等ニ特發スルモ眼球結膜ヨリ原發スルヲ最モ稀ナリトス、余輩自己ノ經驗ニ徵スルニ大凡二萬以上ノ眼患者(新患者)中初メテ其一患者ヲ實驗セルヲ以テ觀ルモ本病ハ甚タ稀有ノ疾病ト見做サ、ルヲ得ス、況ンヤ新聞雜誌等ニ之カ報告ノ稀ナルニ於テオヤ(眼科寶函第八卷二二二頁、同第十一卷一九頁、同第十卷六二二頁、同第二拾卷五九頁、同第二十一卷三四四、同第二十三卷一一七、同第二十四卷五二、眼科中央雜誌千八百八十九年一〇一頁、同千八百九十一年二八〇頁)而シテ其性不良ニシテ之ヲ除去スルモ容易ニ再發シ或ハ他ノ貴重ナル器官ニ轉移シ死ニ至ラシムルヲ甚カラス、然レモ他ノ器官ヨリ發スル色素性肉腫ノ如ク果シテ最惡ノ者ナリヤ否ヤ未タ疑點ナキニシモ非スト雖モ總テ再發シ易キハ諸家ノ經驗ニヨリテ明了ナリ

形狀大小ハ甚タ不同ニシテ帽針頭大ノ僅ニ隆起スル斑點トナリテ現ハレ、或ハ豌豆大扁平ノ隆起ヲ生シ、或ハ胡桃大ノ腫瘍ヲ呈ス、其色澤ハ含有スル色素ノ多少若クハ血管ノ有無ニ依テ異ナリト雖モ多クハ炭黑色ニシテ、時トシテハ灰帶黑色若クハ黑帶褐色ナリ而シテ通例結膜輪ヨリ發生シ、就中母斑ノ如キ先天性色素異常ハ能ク其


●原著及實驗

發生ノ基礎タリ、而シテ漸々發育腫大スルモ初ヨリ深ク角膜ヲ侵スコトハ通例無之、今余カ實驗セシ患者ニ就テ略述スベシ

患者ハ六十三歳ノ僧侶ニシテ本年五月二十六日金澤病院ニ來リ余カ診ヲ乞ヘリ、體質稍年齢ニ相應シ父ハ七十歳ニシテ老衰ノ爲メニ逝キ、母ハ五十六歳ヲ以テ病死セシカ其死因ヲ詳ニセス、兄弟三人、皆健存シ、親戚ノ遺傳性疾病ノ關係明ナラス、妻ナク又子孫ナシ

患者生來強壯、茶及煙草ヲ嗜ムモ酒ヲ好マス、三十歳ニ至ル迄眼病ハ素ヨリ其他ノ身体疾病ノ如キモ絶テ記スベキ者ナク、唯毎月二三回ノ衄血アルヲ常癖トシ且ツ時々寒胃ニ罹リ、其際必ス咳嗽ヲ發スルヲ以テ自テ肺患ナキヤヲ疑フノミ、而シテ三十歳ノ頃偶々鏡面ニ對セシトキ左眼角膜ノ上縁ニ沿ヒ他ノ眼白部ト異ナル鼠色ノ斑紋アリ、其下縁ハ角膜ニ對シテ未ダ其縁ニ達セス、縦巾一分、横巾五分計ナリキ、更ニ自覺障害ナク又爾來依然トシテ發育ノ狀ナク、只昨年三月ニ至リテ縦巾一分計増加セシカ如キ觀アリシノ他舊態ヲ改メス、同年八月先ツ下驗、次テ上驗ニ小腫(麥粒腫カ)ヲ生セシモ三十四日ニシテ全治セリ、然ルニ本年一月ヨリ同眼球膨大ノ狀アリ、二月上旬ニ至リテ該斑隆起増大シテ色澤濃度ヲ増シ、角膜縁ニ接着セリ、爾來益成長シ高ク上眼瞼ヲ提起シ角膜ヲ覆ヒテ懸垂シ眼瞼閉閉ノ際疼痛ヲ覺ヘ分泌物ヲ出セリ、其間(三月上旬)眼鏡ニテ壓迫シ出血(腫瘍面カ)セシコトアリキ、三十日前ヨリ視力障害ヲ感セシカ十四五日前遂ニ全ク視力ヲ失ヒ、瞼裂間ニハ腫瘍ノ外全ク餘地ヲ認メサルニ至レリト云フ

現症 一見遠ク望メハ牛眼ノ狀ヲ呈シ、近ク觀察スレハ粟實大ノ黒帶褐色(脫出シタル虹彩ノ色澤濃厚ナル者ノ如シ)ノ腫瘍ノミニシテ、一小部ノ角膜ヲ露出セス、其形稍横卵形ニシテ側縁峻シク、強ク上眼瞼ヲ壓上シテ檢スルニ麓ニ溝狀ノ境界アルモ角膜上縁ヨリ少クモ一仙迷ハ球結膜ト腫瘍ノ底面ト癒着シ、腫瘍ヲ少ク壓上シテ檢スルニ少ク牽下シテ檢スルニ下部ハ角膜ノ三分ノ二ヲ被ヒ露呈スル所ハ僅ニ其三分一ニ過キス而シテ角膜面モ其上三分ノ一ハ腫瘍ノ基底ト癒着ス、其質柔軟表面稍滑澤深部少ク彈力性ノ抗抵アリ、其狀恰モ炭末ヲ吸入セシ肺ノ表面ヲ見ルカ如シ、遊離スル角膜面ハ平滑ナルモ少ク溷濁シ又腫瘍内方ノ基底ヨリ角膜下縁ニ沿ヒ幅ニ密迷ノ炭



黒色ノ斑アリ、其尖端ハ梢下縁ノ中央ヲ超ヘテ他側ニ跨ル、外側ヨリモ亦同様ノ突起ヲ出スモ尙腫瘍ノ爲メニ隠蔽セラレ腫瘍ヲ提起セサレハ見ル克ハス、眼球運動尙稍自在ニシテ眼瞼ハ滑轉シテ全ク閉鎖スルコトヲ得、虹彩瞳孔異常ナキモ内部ヲ檢スル克ハス、視力ハ腫瘍ヲ強ク提起スルモ眼前僅ニ指動ヲ辨スルノミ、

右ノ状態ナリシヲ以テ全ク色素性内腫ト斷定シ且ツ表在ト雖モ所々ニ突起ヲ出シ蔓延ノ徵候ヲ呈スルカ故ニ單ニ腫瘍ノミノ切除ハ大ニ再發ノ恐レヲ殘ス者ト遠慮シ六月二日斷然腫瘍ト共ニ眼球ヲ摘出セリ、同月二十日ニ至リ義眼ヲ裝ヒ三四日ヲ經テ患者甚タ満足ヲ表シテ辭シ去リヌ

鏡檢スルニ結膜輪ハ大ニ増殖肥厚シ角膜面ヲ被フコト通常ヨリモニ密迷許リ廣ク、此肥厚部分ニ於テハ腫瘍細胞甚タ僅少ニシテ殆ント皆結締織ノミヲ有シ、之ニ反シテ腫瘍自己ハ殆ント全ク色素顆粒ヲ夥シク含有スル圓形細胞ヨリ成リ、周圍ハ結締織膜ヲ以テ圍繞セラル、角膜面ハ肉眼上所々癒着スル所アリト雖モ鏡檢上至テ表面ニ止マリ而モ更ニ細胞浸潤ヲ認メス、然レモ上方ニ向フテハ此圓形有色素細胞、テノーン氏囊ヲ超ヘテ多少眼窠内ニ浸潤セリ、虹彩、毛様體、脈絡膜ハ尙異變ナカリキ、是ニ由テ之ヲ觀レハ本腫瘍ハ無論色素性肉腫ニシテ結膜輪ヨリ發生シ(特ニ患者ノ訴ニヨレハ先天性母斑ヨリ發生シ)、外部ニ於テハ未タ結膜ヲ穿孔セス、其下部ニ發育シ、換言スレハ外面ハ全ク結膜結締織ヲ以テ包裡セララル、モ、後方ニ於テハ將ニ眼窠内ニ蔓延セントスルノ徵ヲ現ハスモノトス

上記ノ如クナルヲ以テ眼球摘出ハ少シク早計ナリシヤモ計リ難シト雖モ鏡檢上腫瘍細胞ノ多少後部ニ蔓延スルヲ以テ觀レハ眼球ヲ摘出セシハ大ニ患者ノ幸福ナリシト信ス鏡檢的標本ノ製造ニ就テハ村上教授ニ深ク謝意ヲ表ス

◎鹿角精ニ就テ

櫻井小平太

私ガ只今御話シテセントスル所ノコトハ、或ル裁判事件ノ結果デ御座リマスルガ、其事柄ハ、所ハ金澤市デ御座リマスガ、或ル藥ヲ販賣スル家へ或人ガ鹿角精ト申ス藥ヲ買ニ參リマシタ者ガ御座リマシタ、所ガ生憎其家ニ鹿角精