

ノ如キハ其量突飛ニシテ一「グラム」ニ當レリ是レニ由テ之レヲ見レハ其價格ノ甚ダシク廉ナルモノハ需用者ニ對シテハ尤モ利益アルガ如クナレトモ之レ各位ノ日々實驗セラル、如ク假令比較的脂肪酸亞爾加里ノ量多キモ含有スル水分ノ爲メニ使用ノ際實際ニ用ユルノ外無益ニ潮解スルモノ多キカ故ニ決シテ其効ナキモノトス然レトモ余等思フニ遊離及ヒ炭酸亞爾加里等ノ如キモノヲ夾雜セサル石鹼ニシテ只水分ノミ多キモノナレハ之レヲ乾燥セシメテ使用用シタランニハ尤モ經濟ナランカ尙ホ茲ニ注意スヘキハ石鹼中含有スル脂肪酸ノ種類ニヨリテ之レヲ使用スルノ際大ニ其利害ニ關スルヲアリ即チ油酸ノ多キモノハ潮解シ易キカ如シ尙ホ石鹼ニ關スルヲハ余等今後モ益々研究ヲ遂ケ其得ル處ハ必スヤ其成績ヲ本誌ニ掲ケ以テ各位ノ教ヲ乞ハントス此試驗ヲ施行スルニハ櫻井教授ニ懇篤ナル教ヲ受ケタリ由テ全氏ニ其勞ヲ謝ス

## ◎歇私的里ノ一例

高橋剛吉

明治廿九年四月廿八日金澤市某町中橋某其女年紀十二ノモチノ負フテ金澤病院ニ來リ診テ乞フ

問診 本年三月廿日感冒、食機不進、時々腹痛、黃色視等ヲ訴ヘ四月上旬兩下肢諸關節ニ疼痛ヲ覺ヘ爾來堅立歩行不能トナレリ云々

望診 患者ハ稍貧血ノ狀ヲ呈シ顔貌少シク憂懼ノ色ヲ帶ブ

胸腹部ニ望、觸、打、聽診上更ニ異狀ヲ認メズ脊柱ニ壓痛ナク下肢關節ニ腫起、疼痛、運動障害等ナシ

試ニ患者ヲ抱テ堅立ノ位地ヲ取ラシメントスルニ兩下肢ハ恰モ小兒脊髓痲痺ニ於ケルカ如ク弛緩シテ下垂シ手ヲ放テハ直チニ仆レントス仍テ脊髓疾患ヲ疑ヒ患者ヲ床上ニ仰臥セシメ先ヅ諸種ノ下肢運動ヲ命セシニ命ニ應シテ完全ナル各運動ヲ行ヒ筋力、筋知覺、腱反射、皮膚知覺及反射ヲ檢セシニ皆完全ナリキ爰ニ於テ歇私的里性堅立歩行不能ト診斷シ患者ヲ慰諭スルニ電氣療法ヲ施サバ必ズ即治スベキヲ以テシ弱感傳電流ヲ五分間兩下肢ニ施セシニ患者ハ忽地堅立シ其母ニ掖レテ數十歩ヲ運ヒ得ルニ至レリ爾後毎日上記ノ所謂電氣療法(實ハ Induction)ヲ施スル數日ニシテ全治セリ内服ニハ稀鹽酸里母那垓ヲ投セシノミ

上記ノ「フアール」ハロイス氏著書歌私的里條下ノ一節ニ全ク符合スルヲ以テ左ニ之レヲ抄出ス

.....Die Laehnungen sind als hysterische im Gegensatz zu den von palpablen Veranderungen in Gehirn und Rückenmark abhängigen Laehnungen in der Fallen leicht zu erkennen, wo ihr Charakter sich als „Willenslaehnung“, „Funktionslaehnung“ dadurch ausspricht, „dass nur gewisse Bewegungen, Z.B. Gehen und Stehen I.), unmöglich sind, waehrend andere Leistungen von denselben Muskeln anstandslos vollzogen werden. ....

1) Diese Form der hysterischen Laehnung ist neudings mit dem Namen „Astasie“ und „Abasie“ bejagt worden. Die damit behafteten, Kranken sind schlechterdings nicht im Stande zu gehen oder zu stehen: sie kniecken bei jedem Versuche, sich aufrecht zu halten, widerstandslos zusammen. Im Liegen kann weder eine Abnahme der motorischen Kraft, noch eine Stoerung des Muskelfuehls oder der Coordination, noch eine Reflex — und Sensibilitaetsstoerung construiert werden. Wie andere hysterische Willenslaehnungen kann auch die Astasie und Abasie pleetziich entstehen und verschwinden. Zuweilen scheint sie das einzige hysterische Symptom zu sein, d. h. andere hysterischen Erscheinungen koennen daneben fehlen.

予ハ尙二三ノ稍興味アル歌私的里ノ實驗ヲナセリ他日本誌ノ餘白ヲ借テ報導スルコトアラン

## 抄 録

### ○室内ノ濕氣の有無を知る一便法

本問題は乃圭家の屢々遭遇する所にして之れが確答は容易に爲し難し爰ニ簡易ある一試験法あり即ち可檢室内に新鮮なる水酸化石灰一千瓦精密に秤定すべしを置き牖戸を密閉し廿四時經て更に之れを秤るべし重量の増加十瓦

以上即ち一%なるときは該室は濕氣を帶ヒ衛生に害ありと爲すべし

○「クロノホルム」の分解を防ぐ法

少量の沈降硫黄をヲ加へたる(重量千に付き一の比例)

○護謨製物品貯藏法

全品の之れを3%石炭酸%水中ニ貯藏するを最も良しと