

# ハルリンドウの一畸型

メタデータ	言語: Japanese 出版者: 公開日: 2022-03-23 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: 豊国, 秀夫, Toyokuni, H. メールアドレス: 所属:
URL	<a href="http://hdl.handle.net/2297/00065637">http://hdl.handle.net/2297/00065637</a>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International License.




Tashiro (fr.); Isl. Nakanoshima, Y. Tshiro?, No. 96, Aug. 1910 (type of *Rh. indicum* var. *ericarpum* Hay.)

2) *Rhododendron sataense* Nakai in Bull. Nat. Sci. Tokyo 27 (Oct. 1949) 33

*Rh. austrokiusianum* Hatusima in Asahina's Journ. Jap. Bot. 24 (Dec. 1949) 81, syn. nov.

Hab. Southern Kyusyu.



1. Blühender Stengel  
2. Ein Teil der aufgerollten Krone

### ○ 豊国秀夫 ハルリンドウの一畸型

H. Toyokuni: Eine monströse Form von *Gentiana Thunbergii*

1957年7月初旬、秋山先生及び舟橋、榎本両氏が北大理学部植物学教室の学生をつれて石狩美唄泥炭地に採集に行かれた際、畸型のハルリンドウを数本採集され筆者に恵与された。

このハルリンドウは数個の花が一緒になつてしまい(図1)、更に各々一個ずつの花に当る部分も花冠裂片が下迄裂けてしまつて(図2)、一見キク科植物の花の様であり、キクザキハルリンドウとでも名付けたい位である。

放射能雨のせいでもあるまいが、過去何年かずつと美唄で学生の植物分類学野外実習を行つて来たのに、今度始めて見出された事は全く無関係とは云い切れない様な気がする。

(北大理学部植物学教室)

### ○ 井波一雄 タイキンギク紀北に産す K. Inami: A New Locality of *Senecio scandens* Buch.—Ham.

台湾以南では山地植物である本種が北上するにつれて沿海性のものとなり、筆者がこれまで突見した高知県や和歌山県のものはずべてやはり潮の香のする海岸であつた。九州に産しないことは不思議であるが既知の北限は紀勢半島における日ノ御崎から那智に至る間即ちその南西面に限られて熊野川を越えないものと承知していたが、筆者は昭和32年11月23日三重県側紀北の地、北牟婁郡尾鷲市に属する九鬼崎の尖端近き疎林地に(ヒノキ植林下)これの満開を見たので本半島東南側における北限としてここに報ずる。北緯34° 01'で我国最大の温湿環境地域として知られたところである。